

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018						
Protographium (Neographium) marcellus marcellus (Cramer, 1777)		= <i>Papilio</i> <i>ajax</i> f. <i>carolinianus</i> = <i>Iphicledes</i> <i>marcellus</i> f. <i>lecontei</i> tr.f. <i>pricei</i> = <i>Iphicledes</i> <i>marcellus</i> f. <i>lecontei</i> tr.f. <i>nigrosuffusa</i> = <i>Iphicledes</i> <i>ajax</i> <i>marcellus</i> = <i>Iphicledes</i> <i>ajax</i> = <i>Iphicledes</i> <i>ajax</i> <i>relamonides</i> = <i>Graphium</i> <i>marcellus</i> = <i>Neographium</i> <i>marcellus</i> <i>marcellus</i>	(Cramer, 1777)	Pnc: <i>Asimina triloba</i> , <i>A. parviflora</i> , <i>A. speciosa</i> , <i>A. pygmaea</i> , <i>A. angustifolia</i> , <i>A. obovata</i> , <i>A. reticulata</i>	IV-V et VI-VIII	Très variable	Maine, Géorgie, Massachusetts, Wisconsin, Illinois, Kansas, Texas USA , Sud de l'Ontario Canada
Protographium (Neographium) philolaus philolaus (Boisduval, 1836)	philolaus	philolaus = <i>Papilio</i> <i>philolaus</i> = <i>Eurytides</i> <i>philolaus</i> = <i>Graphium</i> <i>philolaus</i> = <i>Papilio</i> <i>philolaus</i> <i>ajax</i> = <i>Papilio</i> <i>philolaus</i> ab. <i>nigrescens</i> = <i>Papilio</i> <i>philolaus</i> ab. <i>niger</i> = <i>Papilio</i> <i>philolaus</i> ab. <i>felcicis</i> = <i>Eurytides</i> <i>philolaus</i> f. <i>vazquezae</i> = <i>Papilio</i> <i>oberthueri</i> = <i>Eurytides</i> <i>oberthueri</i> = <i>Neographium</i> <i>oberthueri</i> = <i>Neographium</i> <i>philolaus</i> <i>philolaus</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Sapranthus</i>		commun	Floride, Sud du Texas USA , San Martin, Tuxtla, Veracruz, Chiapas, Yaxchilan Est du Mexique , Belize , Guatemala , Honduras , El Salvador , Nicaragua , Costa Rica
Protographium (Neographium) philolaus xanthicles (Bates, 1863)		xanthicles = <i>Papilio</i> <i>xanthicles</i> = <i>Papilio</i> <i>plaesiolaus</i> = <i>Papilio</i> <i>xanthicles</i> f. <i>scheba</i> = <i>Papilio</i> <i>xanthicles</i> var. <i>philenora</i> = <i>Eurytides</i> <i>xanthicles</i> = <i>Neographium</i> <i>philolaus</i> <i>xanthicles</i>	(Bates, 1863)				Panama , Santha Martha Nord de la Colombie , Nord du Venezuela
Protographium (Neographium) zonaria (Butler, 1869)	zonaria = <i>Papilio</i> <i>zonaria</i> = <i>Eurytides</i> <i>zonaria</i> = <i>Neographium</i> <i>zonaria</i>	(Butler, 1869)				rare	Haiti , République dominicaine
	Groupe des	epidaus					
Protographium (Neographium) epidaus epidaus (Doubleday, 1846)	epidaus	epidaus = <i>Papilio</i> <i>epidaus</i> = <i>Eurytides</i> <i>epidaus</i> = <i>Neographium</i> <i>epidaus</i> = <i>Eurytides</i> <i>epidaus</i> <i>epidaus</i>	(Doubleday, 1846)	Pnc: <i>Annona reticulata</i> , <i>Rollinia</i>		commun	Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatan, Quintana Roo, Nord d'Oaxaca, Nord de Chiapas Sud-est du Mexique , Belize , Guatemala , El Salvador , Honduras , Nicaragua , Nord-ouest du Costa Rica
Protographium (Neographium) epidaus fenochionis (Salvin & Godman, 1868)		fenochionis = <i>Papilio</i> <i>fenochionis</i> = <i>Eurytides</i> <i>epidaus</i> <i>fenochionis</i> f. <i>obscurator</i> = <i>Neographium</i> <i>epidaus</i> <i>fenochionis</i>	(Salvin & Godman, 1868)				Michoacan, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sud de Veracruz, Chiapas Sud-ouest du Mexique
Protographium (Neographium) epidaus tepicus (Rothschild & Jordan, 1906)		tepicus = <i>Papilio</i> <i>epidaus</i> <i>tepicus</i> = <i>Neographium</i> <i>epidaus</i> <i>tepicus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)				Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima Ouest du Mexique
	Groupe des	agesilaus					
Protographium (Neographium) agesilaus autosilaus (Bates, 1861)	agesilaus	autosilaus = <i>Papilio</i> <i>agesilaus</i> <i>autosilaus</i> = <i>Papilio</i> <i>autosilaus</i> var. <i>multesilaus</i> = <i>Protesilaus</i> <i>glaucolaus</i> <i>sztolcmani</i> = <i>Protographium</i> <i>agesilaus</i> <i>tenebricosus</i>	(Bates, 1861)				Venezuela , Amazonie , Rondonia, Goiás Brésil , Est des Andes(Colombie , Equateur , Pérou , Bolivie), Guyane française
Protographium (Neographium) agesilaus agesilaus (Guérin-Méneville & Percheron, 1835)		agesilaus = <i>Papilio</i> <i>agesilaus</i> = <i>Eurytides</i> <i>agesilaus</i> = <i>Papilio</i> <i>conon</i> = <i>Papilio</i> <i>arnapes</i> = <i>Papilio</i> <i>agesilaus</i> <i>agesilaus</i> ab. <i>septemlineatus</i> = <i>Papilio</i> <i>agesilaus</i> <i>agesilaus</i> ab. <i>fermata</i>	(Guérin-Méneville & Percheron, 1835)	Pnc: <i>Rollinia emarginata</i>		commun	Muzo, Rio Magdalena Colombie , Nord du Venezuela
Protographium (Neographium) agesilaus eimeri (Rothschild & Jordan, 1906)		eimeri = <i>Papilio</i> <i>agesilaus</i> <i>eimeri</i> = <i>Eurytides</i> <i>agesilaus</i> <i>eimeri</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)				Panama , Rio Dagua, Cauca Valley Ouest de la Colombie
Protographium (Neographium) agesilaus fortis (Rothschild & Jordan, 1906)		fortis = <i>Papilio</i> <i>agesilaus</i> <i>fortis</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)				Jalisco, Colima, Guerrero à Oaxaca Ouest du Mexique
Protographium (Neographium) agesilaus neosilaus (Hopffer, 1865)		neosilaus = <i>Papilio</i> <i>neosilaus</i> = <i>Papilio</i> <i>oberthueri</i>	(Hopffer, 1865)				Est du Mexique à Costa Rica
Protographium (Neographium) agesilaus montanum (Küppers, 1974)		montanum = <i>Graphium</i> <i>agesilaus</i> <i>montanum</i>	(Küppers, 1974)				Nord du Pérou
Protographium (Neographium) agesilaus viridis (Röber, 1926)		viridis = <i>Papilio</i> <i>agesilaus</i> <i>viridis</i> = <i>Graphium</i> <i>autosilaus</i> <i>viridis</i>	(Röber, 1926)				Nord de la Bolivie , Goiás, São Paulo Brésil , Paraguay
	Sous-genre :	Asiographium	Möhn, 2002				
Protographium (Asiographium) asius (Fabricius, 1781)	asius = <i>Papilio</i> <i>asius</i> = <i>Papilio</i> <i>astyagas</i> = <i>Papilio</i> <i>manlius</i> = <i>Papilio</i> <i>asius</i> var. <i>albofasciatus</i> = <i>Papilio</i> <i>asius</i> f. <i>albofasciatus</i> = <i>Eurytides</i> <i>asius</i> = <i>Neographium</i> <i>asius</i> = <i>Asiographium</i> <i>asius</i>	(Fabricius, 1781)	Pnc: <i>Annona cacans</i>			commun	Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Sud-est du Brésil , Paraguay
	Sous-genre :	Eurygraphium	Möhn, 2002				
	Groupe des	thyastes					
Protographium (Eurygraphium) calliste calliste (Bates, 1864)	calliste	calliste = <i>Papilio</i> <i>calliste</i> = <i>Eurytides</i> <i>calliste</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>calliste</i> = <i>Papilio</i> <i>lorzae</i> = <i>Eurytides</i> <i>calliste</i> <i>calliste</i> f. <i>albida</i> = <i>Eurytides</i> <i>calliste</i> <i>calliste</i>	(Bates, 1864)	Pnc: <i>Magnolia dealbata</i>		assez rare et très localisé	Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas Sud-est du Mexique , Belize , Vera Paz Guatemala , El Salvador , Honduras
Protographium (Eurygraphium) calliste olbius (Rothschild & Jordan, 1906)		olbius = <i>Papilio</i> <i>calliste</i> <i>olbius</i> = <i>Eurytides</i> <i>calliste</i> <i>olbius</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>calliste</i> <i>olbius</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)				Costa Rica à Chiriqui Ouest du Panama
Protographium (Eurygraphium) thyastes marchandii (Boisduval, 1836)	thyastes	marchandii = <i>Papilio</i> <i>marchandii</i> = <i>Papilio</i> <i>marchandi</i> = <i>Eurytides</i> <i>marchandii</i> <i>marchandii</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>marchandii</i> <i>marchandii</i> = <i>Eurytides</i> <i>marchandi</i> = <i>Eurytides</i> <i>marchandii</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>marchandii</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Magnoliacées</i>			Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas Est du Mexique , Belize , Guatemala , Honduras
Protographium (Eurygraphium) thyastes occidentalis Maza, 1982		occidentalis = <i>Eurytides</i> <i>thyastes</i> <i>occidentalis</i> = <i>Eurytides</i> <i>marchandii</i> <i>occidentalis</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>marchandii</i> <i>occidentalis</i>	Maza, 1982				Guerrero, El Faisanal, Nueva Delhi Sud-ouest du Mexique
Protographium (Eurygraphium) thyastes panamensis (Oberthür, 1880)		panamensis = <i>Papilio</i> <i>panamensis</i> = <i>Eurytides</i> <i>marchandi</i> <i>panamensis</i> = <i>Eurytides</i> <i>marchandii</i> var. <i>panamensis</i>	(Oberthür, 1880)				Costa Rica , Panama , Ouest de la Colombie , Nord-ouest de l' Equateur
Protographium (Eurygraphium) thyastes thyastes (Drury, 1782)		thyastes = <i>Papilio</i> <i>thyastes</i> = <i>Eurytides</i> <i>thyastes</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>thyastes</i> = <i>Iphicledes</i> <i>diaphorus</i> = <i>Eurytides</i> <i>thyastes</i> <i>thyastes</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>thyastes</i> <i>thyastes</i>	(Drury, 1782)	Pnc: <i>Talauma ovata</i>			Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Sud-est du Brésil , Nord-est du Paraguay
Protographium (Eurygraphium) thyastes thyastinus (Oberthür, 1879)		thyastinus = <i>Papilio</i> <i>thyastes</i> <i>thyastinus</i> = <i>Papilio</i> <i>thyastes</i> <i>zoros</i> = <i>Eurytides</i> <i>thyastes</i> <i>zoros</i> = <i>Eurytides</i> <i>thyastes</i> <i>thyastinus</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>thyastes</i> <i>thyastinus</i>	(Oberthür, 1879)				Est des Andes (Sud-est de l' Equateur , Sud-est de la Colombie), Pérou , Nord de la Bolivie , Amazonas Brésil
	Groupe des	leucaspis					
Protographium (Eurygraphium) dioxippus diores (Rothschild & Jordan, 1906)	dioxippus	diores = <i>Papilio</i> <i>lacandones</i> <i>diores</i> = <i>Eurytides</i> <i>lacandones</i> <i>diores</i> = <i>Eurytides</i> <i>dioxippus</i> <i>diores</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>dioxippus</i> <i>diores</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)			Très foncé	Colombie , Napo Equateur , Pérou , Mapiri Bolivie
Protographium (Eurygraphium) dioxippus marae (Racheli, Bollino & Sala, 1990)		marae = <i>Eurytides</i> <i>dioxippus</i> <i>marae</i> = <i>Eurygraphium</i> <i>dioxippus</i> <i>marae</i>	(Racheli, Bollino & Sala, 1990)				Tachira, Barinas Sud-ouest du Vénézuëla

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
Protographium (Eurygraphium) dioxippus dioxippus (Hewitson, [1856])	dioxippus = Papilio dioxippus = Eurytides dioxippus = Eurygraphium dioxippus = Papilio dioxippus ab. drueti = Cosmodermus dioxippus ab. drueti = Eurytides dioxippus dioxippus = Eurygraphium dioxippus dioxippus	(Hewitson, [1856])	assez rare et localisé	Centre du Panama à Colombie	
Protographium (Eurygraphium) dioxippus lacandonae (Bates, 1864)	lacandonae = Papilio lacandonae = Eurytides lacandonae = Eurytides lacandonae lacandonae = Eurytides dioxippus lacandonae = Eurygraphium dioxippus lacandonae	(Bates, 1864)		Veracruz, Est de Chiapas Sud-ouest du Mexique à Ouest du Panama	
Protographium (Eurygraphium) leucaspis lamidis (Brown & Lamas, 1994)	leucaspis lamidis = Papilio leucaspis lamis = Eurytides leucaspis lamidis = Eurygraphium leucaspis lamidis	(Brown & Lamas, 1994)	rare	Tachira Ouest du Venezuela, Colombie	
Protographium (Eurygraphium) leucaspis leucaspis (Godart, 1819)	leucaspis = Papilio leucaspis = Eurytides leucaspis = Eurygraphium leucaspis = Eurytides leucaspis leucaspis = Eurygraphium leucaspis leucaspis	(Godart, 1819)	peu commun	Nord de la Colombie, Est de l'Equateur, Bolivie, Nord du Pérou	
Eurytides Hübner, [1821]	Eurytides = Bellerographium	Hübner, [1821]			
	Sous-genre : Bellerographium	Möhn, 2002			
Eurytides (Bellerographium) bellerophon (Dalman, 1823)	bellerophon = Papilio bellerophon = Papilio coresilaus = Protesilaus swainsonius = Papilio bellerophon ab. confluens = Bellerographium bellerophon	(Dalman, 1823) Pnc: Guatteria nigrescens	commun	Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso Sud-est du Brésil, Pando, Mapiri Bolivie, Misiones Nord-est de l'Argentine	
	Sous-genre : Eurytides	Hübner, [1821]			
	Groupe des salvini				
Eurytides (Eurytides) salvini (Bates, 1864)	salvini = Papilio salvini = Papilio eacus = Eurytides salvini f. ochracea	(Bates, 1864)	rare	Sud de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas Sud-est du Mexique, Belize, Vera Paz Guatemala, Honduras	
	Groupe des orabilis				
Eurytides (Eurytides) columbus (Kollar, 1850)	columbus = Papilio columbus = Papilio hippodamus = Papilio burtoni = Papilio hippodamus var. fulva = Eurytides serville columbus	(Kollar, 1850)		Muzo, Bogota, Cali, Rio Calima, Rio Bravo Colombie, Rio Lita, Rio Llorimagua, Rio Mira Nord-ouest de l'Equateur	
Eurytides (Eurytides) orabilis isocharis (Rothschild & Jordan, 1906)	orabilis isocharis = Papilio orabilis isocharis	(Rothschild & Jordan, 1906)		Ouest de la Colombie, Ouest de l'Equateur	
Eurytides (Eurytides) orabilis orabilis (Butler, 1872)	orabilis = Papilio orabilis	(Butler, 1872) Pnc: Guatteria tonduzi		Chiriqui Panama, Cartago Costa Rica, Guatemala	
Eurytides (Eurytides) serville acritus (Rothschild & Jordan, 1906)	serville acritus = Papilio serville acritus	(Rothschild & Jordan, 1906)		Tachira, Merida Nord-ouest du Venezuela, Est de la Cordillière Colombie	
Eurytides (Eurytides) serville serville (Godart, [1824])	serville = Papilio serville = Papilio servillei = Papilio boliviana = Papilio serville boliviana = Papilio serville serville ab. xanthocells	(Godart, [1824]) Pnc: Nectandra membranacea, Guatteria	commun	Sud de la Colombie, Rio Napo, Loja Equateur, Pérou, Bolivie	
	Groupe des dolicaon				
Eurytides (Eurytides) callias (Rothschild & Jordan, 1906)	callias = Papilio callias	(Rothschild & Jordan, 1906)	rare	Guyane française, Amazonas Brésil, Yavita, Rio Ocamo, Rio Cunucunuma Sud du Venezuela, Napo Est de l'Equateur, Pérou	
Eurytides (Eurytides) dolicaon cauraensis Möhn, 2002	dolicaon cauraensis	Möhn, 2002		Rio Caura Sud-est du Venezuela	
Eurytides (Eurytides) dolicaon deicoon (C. & R. Felder, 1864)	deicoon = Papilio deicoon = Papilio dolicaon draconarius f. frustulum = Eurytides dolicaon deicoon	(C. & R. Felder, 1864)		Paralibo, Minas Gerais, Espirito Santo, São Paulo, Mato grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul Sud-est du Brésil, Paraguay	
Eurytides (Eurytides) dolicaon deileon (C. & R. Felder, 1865)	deileon = Papilio deileon = Papilio dolicaon draconarius = Papilio dolicaon anemos = Papilio dolicaon xanthophilus	(C. & R. Felder, 1865)		Est de la Colombie, Rio napo Est de l'Equateur, Pérou, Bolivie, Rondonia, Mato Grosso, Goias, Amazonas Brésil	
Eurytides (Eurytides) dolicaon dolicaon (Cramer, 1775)	dolicaon = Papilio dolicaon	(Cramer, 1775) Pnc: Guatteria, Ocotea, Nectandra membranacea	commun	Est du Venezuela, Guyana, Surinam, Guyane française	
Eurytides (Eurytides) dolicaon hebreus Brown & Lamas, 1994	hebreus = Papilio dolicaon hebrus	Brown & Lamas, 1994	rare	Bogota, Nord-ouest de la Colombie	
Eurytides (Eurytides) dolicaon septentrionalis Brown, 1994	septentrionalis	Brown, 1994	rare	Centre du Panama	
Eurytides (Eurytides) dolicaon troles (Rothschild & Jordan, 1906)	troles = Papilio dolicaon troles	(Rothschild & Jordan, 1906)		Nord de la Colombie, Nord-ouest du Venezuela	
Eurytides (Eurytides) iphitas Hübner, [1821]	iphitas = Papilio iphitas = Papilio iphitas f. enervulata	Hübner, [1821]	E T considéré comme disparu	Espirito Santo, Rio de Janeiro, Bôca do Mato Sud-est du Brésil	
Protesilaus Swainson, [1832]	Protesilaus = Cosmodesmus	Swainson, [1832]			
Protesilaus aguairi (d'Almeida, 1937)	aguairi = Iphiclides aguairi = Papilio aristosilaus = Eurytides aguairi	(d'Almeida, 1937)	commun	Guyane française, Pará, Amazonas Brésil	
Protesilaus earis (Rothschild & Jordan, 1906)	earis = Papilio earis = Graphium earis = Eurytides earis	(Rothschild & Jordan, 1906)	Fond rosâtre	Zamora Equateur	
Protesilaus glaucolaus glaucolaus (Bates, 1864)	glaucolaus glaucolaus = Papilio glaucolaus = Eurytides glaucolaus	(Bates, 1864)	commun	Costa Rica, Panama à Centre de la Colombie, Venezuela	
Protesilaus glaucolaus leucas (Rothschild & Jordan, 1906)	leucas = Papilio glaucolaus leucas	(Rothschild & Jordan, 1906)		Venezuela, Pérou, Guyane française, Brésil	
Protesilaus glaucolaus melaenus (Rothschild & Jordan, 1906)	melaenus = Papilio glaucolaus melaenus	(Rothschild & Jordan, 1906)		Ouest de la Colombie	
Protesilaus helios (Rothschild & Jordan, 1906)	helios = Papilio helios = Papilio helios f. sexfasciatus = Papilio jordan = Papilio rothschildianus = Iphiclides fuscicornis = Papilio guaterius = Graphium helios = Eurytides helios	(Rothschild & Jordan, 1906)	commun	Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro Sud du Brésil, Paraguay, Argentine	
Protesilaus leucosilaus (Zikán, 1937)	leucosilaus = Papilio leucosilaus = Eurytides leucosilaus	(Zikán, 1937)		Guyane française, Amazonas Brésil	
Protesilaus macrosilaus leucones (Rothschild & Jordan, 1906)	macrosilaus leucones = Papilio protesilaus leucones = Eurytides protesilaus leucones	(Rothschild & Jordan, 1906)		Nord de la Colombie, Venezuela	
Protesilaus macrosilaus macrosilaus (Gray, [1853])	macrosilaus = Papilio macrosilaus = Eurytides macrosilaus = Papilio duodecimus = Eurytides protesilaus macrosilaus	(Gray, [1853])	pas commun	Honduras, Nicaragua, Costa Rica	
Protesilaus macrosilaus penthesilaus (C. & R. Felder, 1865)	penthesilaus = Papilio penthesilaus = Eurytides macrosilaus penthesilaus	(C. & R. Felder, 1865)		Sud-est du Mexique, Belize, Guatemala, El Salvador	
Protesilaus molops hetaerius (Rothschild & Jordan, 1906)	molops hetaerius = Papilio molops hetaerius	(Rothschild & Jordan, 1906)		Guyana, Guyane française, Pérou, Colombie, Suriname, Equateur, Bolivie, Brésil	
Protesilaus molops megalurus (Rothschild & Jordan, 1906)	megalurus = Papilio molops megalurus	(Rothschild & Jordan, 1906)	rare	Minas Gerais Brésil	

Auteur: Dominiek PRUVOT	août 2018		
<i>Protesilaus molops molops</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	molops = <i>Papilio molops</i> = <i>Eurytides molops</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	pas commun	Rio Cayapas Nor-ouest de l'Equateur, Colombie
<i>Protesilaus orthosilaus</i> (Weymer, 1899)	orthosilaus = <i>Papilio orthosilaus</i> = <i>Papilio amplornatus</i> = <i>Eurytides orthosilaus</i> (Weymer, 1899)	Rare	Mato Grosso Brésil, Paraguay
<i>Protesilaus protesilaus archesilaus</i> (C. & R. Felder, 1865)	protesilaus archesilaus = <i>Papilio archesilaus</i> = <i>Papilio protesilaus</i> var. <i>archesilaus</i> = <i>Papilio protesilaus</i> ab. <i>rubrocinctus</i> = <i>Papilio pumilus</i> = <i>Papilio protesilaus archesilaus</i> ab. <i>reducta</i> = <i>Cosmodesmus protesilaus archesilaus</i> ab. <i>reducta</i> (C. & R. Felder, 1865)		Ouest de la Colombie, Equateur, Nord du Pérou
<i>Protesilaus protesilaus dariensis</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	dariensis = <i>Papilio protesilaus dariensis</i> = <i>Papilio diotimus</i> = <i>Eurytides protesilaus dariensis</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Annona</i>	Costa Rica, Panama, Nord du Venezuela
<i>Protesilaus protesilaus nigricornis</i> (Staudinger, 1884)	nigricornis = <i>Papilio protesilaus</i> var. <i>nigricornis</i> (Staudinger, 1884)		Paraguay, São Paulo,... Sud du Brésil, Nord de l'Argentine
<i>Protesilaus protesilaus protesilaus</i> (Linnaeus, 1758)	protesilaus = <i>Papilio protesilaus</i> = <i>Eurytides protesilaus</i> = <i>Papilio leilus</i> = <i>Papilio theogenus</i> = <i>Papilio nigrifrons</i> = <i>Papilio pseudosilaus</i> = <i>Papilio agathosilaus</i> = <i>Ipchicles travassosi</i> = <i>Graphium protesilaus protesilaus</i> = <i>Eurytides travassosi</i> = <i>Ipchicles embrikstrandii</i> = <i>Papilio embrikstrandii</i> = <i>Eurytides embrikstrandii</i> (Linnaeus, 1758)	commun	Venezuela, Bolivie, Guyane française, Pérou, São Paulo, Rio de Janeiro,... Brésil
<i>Protesilaus stenodesmus</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	stenodesmus = <i>Papilio stenodesmus</i> = <i>Eurytides stenodesmus</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	pas rare mais localisé	Sud-est du Brésil, Sapucay Paraguay, Argentine
<i>Protesilaus telesilaus dolius</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	telesilaus dolius = <i>Papilio telesilaus dolius</i> = <i>Papilio protesilaus</i> var. <i>macrosilaus</i> (Rothschild & Jordan, 1906)		Centre du Panama, Colombie, Nord-ouest de l'Equateur, Trinidad
<i>Protesilaus telesilaus salobrensis</i> (d'Almeida, 1941)	salobrensis = <i>Ipchicles telesilaus salobrensis</i> (d'Almeida, 1941)		Mato Grosso,... Brésil, Paraguay
<i>Protesilaus telesilaus telesilaus</i> (C. & R. Felder, 1864)	telesilaus = <i>Papilio telesilaus</i> = <i>Eurytides telesilaus</i> = <i>Protesilaus protesilaus domitor</i> (C. & R. Felder, 1864)	commun	Colombie, Venezuela, Guyane française, Amazonas, Espirito Santo, Rio de Janeiro Brésil, Pérou
<i>Protesilaus telesilaus vitellus</i> (Fruhstorfer, 1907)	vitellus = <i>Papilio telesilaus domitor</i> f. <i>vitellus</i> = <i>Papilio telesilaus</i> f. <i>sexfasciatus</i> = <i>Papilio telesilaus</i> f. <i>crocatus</i> (Fruhstorfer, 1907)		Satipo Pérou, Paranà, Santa Catarina,... Brésil
Mimoides Brown, 1991	Mimoides Brown, 1991		
	Groupe des lysithous		
<i>Mimoides ariarathes arianus</i> (Staudinger, 1884)	ariarathes arianus = <i>Papilio cyamon arianus</i> = <i>Papilio ariarathes gayi</i> f. <i>anargus</i> = <i>Papilio ariarathes</i> var. <i>romani</i> (Staudinger, 1884)		Amazonas Brésil, Pérou
<i>Mimoides ariarathes ariarathes</i> (Esper, 1788)	ariarathes = <i>Papilio ariarathes</i> = <i>Eurytides ariarathes</i> = <i>Papilio aceses</i> = <i>Papilio ariarathes</i> f. <i>eumelea</i> = <i>Papilio ariarathes</i> f.f. <i>androtypa</i> = <i>Papilio ariarathes gayi</i> f. <i>androtypa</i> (Esper, 1788)	commun	Guyanes, Suriname, Parà Brésil
<i>Mimoides ariarathes demerana</i> Brown & Lamas, 1994	demerana = <i>Papilio ariarathes menes</i> Brown & Lamas, 1994		Guyana
<i>Mimoides ariarathes evagorides</i> Brown & Lamas, 1994	evagorides = <i>Papilio evagoras</i> = <i>Papilio ariarathes evagorides</i> Brown & Lamas, 1994		Venezuela
<i>Mimoides ariarathes gayi</i> (Lucas, 1852)	gayi = <i>Papilio gayi</i> = <i>Papilio cyamon</i> = <i>Papilio ariarathes gaesatus</i> = <i>Papilio ariarathes curupira</i> = <i>Papilio ariarathes muscae</i> = <i>Graphium trapeza huanucana</i> = <i>Mimoides ariarathes cyamon</i> = <i>Eurytides huanucana</i> = <i>Papilio aristagoras</i> = <i>Papilio charoba</i> = <i>Papilio hernando</i> (Lucas, 1852)		Colombie, Bolivie, Pérou, Pastazza Equateur, Amazonas, Mato Grosso Brésil
<i>Mimoides ariarathes illuminatus</i> (Niepelt, 1928)	illuminatus = <i>Papilio illuminatus</i> = <i>Papilio ariarathes gayi</i> f. <i>albicans</i> (Niepelt, 1928)		Mocoa Sud de la Colombie
<i>Mimoides ariarathes leuctra</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	leuctra = <i>Papilio ariarathes leuctra</i> (Rothschild & Jordan, 1906)		Goiás,...Brésil
<i>Mimoides ariarathes metagenes</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	metagenes = <i>Papilio ariarathes metagenes</i> (Rothschild & Jordan, 1906)		Parà Brésil
<i>Mimoides euryleon anatmus</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	euryleon anatmus = <i>Papilio euryleon anatmus</i> = <i>Papilio punctatus</i> = <i>Papilio euryleon anatmus</i> f. <i>punctata</i> = <i>Papilio euryleon</i> var. <i>insidiosa</i> (Rothschild & Jordan, 1906)		Sud de la Colombie, Jibaria Centre de l'Equateur, Nord du Pérou
<i>Mimoides euryleon clusoculis</i> (Butler, 1872)	clusoculis = <i>Papilio clusoculis</i> = <i>Eurytides euryleon clusoculis</i> (Butler, 1872)	Pnc: <i>Annona glabra</i> , <i>Guatteria oliviformis</i>	Cartago Costa Rica, Panama
<i>Mimoides euryleon euryleon</i> (Hewitson, [1856])	euryleon = <i>Papilio euryleon</i> = <i>Eurytides euryleon</i> = <i>Protesilaus euryleon</i> = <i>Papilio euryleon abadiae</i> (Hewitson, [1856])	commun	Colombie, Equateur
<i>Mimoides euryleon haenschi</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	haenschi = <i>Papilio euryleon haenschi</i> (Rothschild & Jordan, 1906)		Ouest de l'Equateur
<i>Mimoides euryleon pithonius</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	pithonius = <i>Papilio euryleon pithonius</i> = <i>Protesilaus euryleon pleiades</i> (Rothschild & Jordan, 1906)		Sud-ouest de Buga, Cauca Valley, Ouest de la Colombie
<i>Mimoides euryleon rodriguezi</i> Le Crom, Constantino & Salazar, 2002	rodriguezi Le Crom, Constantino & Salazar, 2002		Colombie
<i>Mimoides ilus branchus</i> (Doubleday, 1846)	ilus branchus = <i>Papilio branchus</i> = <i>Papilio belesis</i> = <i>Papilio hephaestion</i> = <i>Papilio belephantes</i> = <i>Papilio branchus</i> ab. <i>pallidior</i> = <i>Eurytides belesis</i> = <i>Protesilaus belesis</i> = <i>Eurytides branchus</i> = <i>Protesilaus branchus</i> (Doubleday, 1846)	Pnc: <i>Annotata reticulata</i>	Est du Mexique, Honduras, Belize, Vallées centrales du Guatémalà, El Salvador, Nicaragua, Nord du Costa Rica
<i>Mimoides ilus ilus</i> (Fabricius, 1793)	ilus = <i>Papilio ilus</i> = <i>Eurytides ilus</i> = <i>Papilio hostilius</i> = <i>Papilio guaco</i> (Fabricius, 1793)	rappelle <i>belesis</i>	Chiriqui Panama, Merida Centre du Venezuela, Nord de la Colombie
<i>Mimoides ilus occiduus</i> (Vásquez, 1957)	occiduus = <i>Graphium belesis occiduus</i> = <i>Graphium ilus occiduus</i> (Vásquez, 1957)		Ouest du Mexique
<i>Mimoides lysithous eupatorion</i> (Lucas, [1859])	lysithous eupatorion = <i>Papilio lysithous eupatorion</i> = <i>Papilio patrona</i> = <i>Papilio pomponius</i> = <i>Papilio lysithous</i> f. <i>plaumanni</i> = <i>Papilio kumbachi</i> = <i>Eurytides kumbachi</i> (Lucas, [1859])		Mexique ?, Salto Grande, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Brésil à Nord de l'Argentine
<i>Mimoides lysithous harrisianus</i> (Swainson, 1822)	harrisianus = <i>Papilio harrisianus</i> = <i>Papilio claudius</i> = <i>Papilio athous</i> = <i>Papilio lysithous</i> f. <i>platydesma</i> (Swainson, 1822)		Rio de Janeiro, ...Brésil

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
Mimoides lysithous lysithous (Hübner, 1821)		lysithous (Hübner, 1821) = <i>Papilio lysithous</i> = <i>Hectorides lysithous</i> = <i>Graphium lysithous</i> = <i>Eurytides lysithous</i> = <i>Papilio lysithous</i> var. <i>brevifasciatus</i> = <i>Papilio extendatus</i> = <i>Papilio lysithous f. lucius</i>	commun		Rio Grande do Sul, Santa Catarina Brésil
Mimoides lysithous rurik (Erscholtz, 1821)		rurik (Erscholtz, 1821) = <i>Papilio lysithous rurik</i> = <i>Papilio laius</i>			Paraguay, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ... Brésil
Mimoides lysithous sebastianus (Oberthür, 1879)		sebastianus (Oberthür, 1879) = <i>Papilio lysithous sebastianus</i> = <i>Papilio oedipus</i> = <i>Papilio oedippus</i>			Bahia , Espírito Santo à Rio de Janeiro Brésil
Mimoides microdamas (Burmeister, 1878)		microdamas (Burmeister, 1878) = <i>Papilio microdamas</i> = <i>Eurytides microdamas</i> = <i>Protesilaus microdamas</i>	Très rare. Copie <i>Battus polydamas</i>		Paraguay, Argentine, Sud du Brésil
Mimoides pausanias cleombrotus (Strecker, 1885)		pausanias cleombrotus (Strecker, 1885) = <i>Papilio pausanias cleombratus</i> = <i>Eurytides pausanias cleombrotus</i>			Est du Panama, Centre et Nord de la Colombie, Côte du Nord de l'Equateur
Mimoides pausanias hermolaus (Guenée, 1872)		hermolaus (Guenée, 1872) = <i>Papilio hermolaus</i> = <i>Papilio pausanias hermolaus</i>			Nord de la Colombie, Venezuela
Mimoides pausanias pausanias (Hewitson, 1852)		pausanias (Hewitson, 1852) = <i>Papilio pausanias</i> = <i>Eurytides pausanias</i> = <i>Eurytides pausanis</i> = <i>Protesilaus pausanias</i> = <i>Papilio pausanias pausanias f. eburneomaculatus</i> = <i>Papilio pausanias f. celulata</i> = <i>Eurytides pausanis pausanis</i>	Commun. Copie certains <i>Heliconius</i>		Guyane française, Pérou, Est de la Colombie, Bolivie, Equateur, Suriname, Amazonas, Parà Brésil
Mimoides pausanias prasinus (Rothschild & Jordan, 1906)		prasinus (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio prasinus</i> = <i>Papilio pausanias prasinus</i> = <i>Eurytides pausanias prasinus</i>	rare		Costa Rica, Ouest du Panama
Mimoides pausanias tabaquita (Kaye, 1925)		tabaquita (Kaye, 1925) = <i>Papilio pausanias tabaquita</i> = <i>Eurytides pausanias tabaquita</i>			Trinidad
Mimoides phaon phaon (Boisduval, 1836)		phaon phaon (Boisduval, 1836) = <i>Papilio phaon</i> = <i>Eurytides phaon</i> = <i>Papilio ulopos</i> = <i>Papilio xenarchus</i> = <i>Papilio eridamas</i> = <i>Papilio metaphaon</i> = <i>Papilio phaon</i> var. <i>immarginatus</i> = <i>Papilio pharax</i> = <i>Papilio ulopus</i> var. <i>praxenus</i>			Sud du Texas USA , Nord-est du Mexique à Panama
Mimoides phaon therodamas (C. & R. Felder, 1865)		therodamas (C. & R. Felder, 1865) = <i>Papilio phaon therodamas</i> = <i>Papilio hipparchus</i> = <i>Eurytides hipparchus</i> = <i>Papilio pharnobazus</i> = <i>Papilio pyrholochus</i> = <i>Papilio phaon thero</i> = <i>Mimoides phaon thero</i>			Cauca Valley Colombie, Venezuela, Est de l'Equateur
Mimoides protodamas (Godart, 1819)		protodamas (Godart, 1819) = <i>Papilio protodamas</i> = <i>Ithobalus hyperion</i> = <i>Papilio hyperion</i> = <i>Papilio zonaras</i> = <i>Papilio chloridamas</i> = <i>Eurytides protodamas</i>			Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro Brésil , Misiones Argentine
Mimoides thymbraeus aconophos (Gray, [1853])		thymbraeus aconophos (Gray, [1853]) = <i>Papilio aconophos</i>	Copie <i>Parides alopius</i>		Centre et Ouest du Mexique
Mimoides thymbraeus thymbraeus (Boisduval, 1836)		thymbraeus (Boisduval, 1836) = <i>Papilio thymbraeus</i> = <i>Eurytides thymbraeus</i> = <i>Protesilaus thymbraeus</i> = <i>Papilio thymbraeus</i> ab. <i>pallida</i> = <i>Graphium thymbraeus thymbraeus f. aconopheus</i>	commun. Copie <i>Parides photinus</i>		Sud-est du Mexique, Belize, Guatémalà, Honduras, El Salvador
Mimoides xeniades halex (Rothschild & Jordan, 1906)		xeniades halex (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio harmodius halex</i> = <i>Eurytides chibcha</i> = <i>Papilio ziegleri</i> = <i>Eurytides chibcha</i> = <i>Eurytides harmodius halex</i>			Rio Negro, Est des Andes Colombie
Mimoides xeniades imaus (Rothschild & Jordan, 1906)		imaus (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio harmodius imaus</i> = <i>Papilio harmodius vittalis</i> = <i>Eurytides harmodius imaus</i>			Pérou
Mimoides xeniades isus (Oberthür, 1879)		isus (Oberthür, 1879) = <i>Papilio xeniades</i> var. <i>isus</i> = <i>Papilio aristogiton</i> = <i>Eurytides harmodius isus</i>	rare		Vallées de l'Ouest des Andes Colombie
Mimoides xeniades signatus (Tyler, Brown & Wilson, 1994)		signatus (Tyler, Brown & Wilson, 1994) = <i>Papilio harmodius</i> = <i>Papilio xeniades</i> signatus = <i>Papilio harmodius</i> ab. <i>signatus</i>			Centre du Pérou à Bolivie
Mimoides xeniades tabaconas (Joicey & Talbot, 1918)		tabaconas (Joicey & Talbot, 1918) = <i>Papilio harmodius tabaconas</i>			Nord du Pérou, Sud de l'Equateur
Mimoides xeniades xeniades (Hewitson, 1867)		xeniades (Hewitson, 1867) = <i>Papilio xeniades</i> = <i>Papilio virginia</i> = <i>Papilio harmodius xeniades f. jarbas</i> = <i>Papilio morrisi</i> = <i>Eurytides xeniades</i>			Est de l'Equateur
Mimoides xynias trapeza (Rothschild & Jordan, 1906)		xynias trapeza (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio trapeza</i> = <i>Papilio harmodius xeniades f. androna</i> = <i>Mimoides trapeza</i> = <i>Papilio xisuthrus</i> = <i>Papilio trapeza concoloratus</i> = <i>Eurytides xisuthrus</i>			Nord du Pérou?, Pastazza Equateur
Mimoides xynias xynias (Hewitson, 1875)		xynias (Hewitson, 1875) = <i>Papilio xynias</i> = <i>Eurytides xynias</i> = <i>Protesilaus xynias</i> = <i>Papilio trapeza f. trapezoides</i>	commun		Pérou, Bolivie
Iphiclides Hübner, [1819]		Iphiclides = <i>Podalirius</i> Hübner, [1819]			
Iphiclides feisthameli (Duponchel, 1832)		feisthameli (Duponchel, 1832) = <i>Papilio feisthameli</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>latteri</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>lotteri</i> = <i>Papilio podalirius f. interjecta</i> = <i>Papilio feisthameli f. maura</i> = <i>Papilio podalirius maura</i> ab. <i>symetrica</i> = <i>Papilio podalirius feisthameli</i> = <i>Papilio podalirius feisthameli</i> ab. gen. aest. <i>latteri</i> = <i>Iphiclides podalirius feisthameli</i> = <i>Iphiclides feisthameli f. mieglii</i>	Pnc: <i>Prunus amygdalus</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus insita</i> , <i>Prunus longipipes</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Malus domesticus</i> , <i>Crataegus oxyacantha</i>	Le Voillier blanc	Maroc, Algérie, Espagne, Sud de la France
Iphiclides podalirinus (Oberthür, 1890)		podalirinus (Oberthür, 1890) = <i>Papilio podalirinus</i> = <i>Papilio podalirius podalirinus</i> = <i>Iphiclides podalirius podalirinus</i>	rare		Tibet, Yunnan Ouest de la Chine
Iphiclides podalirius persica Verity, 1911		podalirius persica Verity, 1911			Arménie, Talysch Azerbaïdjan, Kopet-Dagh Iran, Turkménistan
Iphiclides podalirius podalirius (Linnaeus, 1758)		podalirius (Linnaeus, 1758) = <i>Papilio podalirius</i> = <i>Papilio sinon</i> = <i>Papilio flammeus</i> = <i>Podalirius europaeus</i> = <i>Papilio podalirius</i> var. <i>diluta</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>nigrescens</i>	Pnc: <i>Prunus spinosa</i> , <i>Ptunus cerasifera</i> , <i>Amygdalus</i> , <i>Cerasus</i> , <i>Sorbus</i>	Le Flambé V-VI et VII-IX	E T commun Europe centrale et méridionale

Auteur: Dominiek PRUVOT		août 2018	
<i>Iphiclidides podalirius podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	= <i>Papilio podalirius undecimlineatus</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>novemlineatus</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>decemlineatus</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>miegii</i> = <i>Papilio podalirius</i> var. <i>zanclaeus</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>undecimlineatus</i> = <i>Papilio podalirius</i> ab. <i>gen. aest. zanclaeus</i>		
<i>Iphiclidides podalirius virgatus</i> (Butler, 1865)	virgatus = <i>Papilio virgatus</i> = <i>Papilio podalirius smyrnensis</i> = <i>Papilio podalirius virgatus</i> ab. <i>smyrnensis</i> = <i>Papilio podalirius virgatus</i>	(Butler, 1865)	Damascus Syrie , Smyrne Turquie
<i>Iphiclidides podalirius xinyuanensis</i> Huang & Murayama, 1992	xinyuanensis Huang & Murayama, 1992		Dzhungarsky Alatau, Saur, Tarbagatai Mts.Dzhungarsky Alatau, Saur, Tarbagatai Mts. Kazakhstan , Xinyuan, Xinjiang Chine
Graphium Scopoli, 1777	Graphium = Zelima = Arisbe = Idaides = Zetides = Ailus Scopoli, 1777 = Chlorisses = Semicudati = Pathysa = Dalchina = Paranticopsis = Pazala = Deoris = Klinzigia = Klinzigiana = Eurypyleana = Macfarlaneana = Munroana = Wallaceana		
	Sous-genre : Graphium = Idaides Scopoli, 1777		
	Groupe des codrus		
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus auratus</i> (Rothschild, 1898)	codrus auratus (Rothschild, 1898)		Ile Manus Îles de l'Amirauté
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus celebensis</i> (Wallace, 1865)	= <i>Papilio codrus auratus</i> celebensis (Wallace, 1865) = <i>Papilio codrus celebensis</i>		Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus christobalus</i> Jordan, 1909	christobalus Jordan, 1909		Sulawesi, Buton, Kabaena island, Peleng Îles Banggai Indonésie San Christobal Îles Salomon
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus codrus</i> (Cramer, [1777])	codrus (Cramer, [1777]) = <i>Papilio codrus</i> = <i>Papilio codrus codrus</i>	Pnc: <i>Hernandia avigera</i> , <i>Hernandia peltata</i>	Buru, Ambon, Ceram Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus gabriellae</i> Racheli, 1979	gabriellae Racheli, 1979 = <i>Papilio solon</i>		Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée , Îles Shortland, Choiseul, Île Floride, Guadalcanal Îles Salomon
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus gilolensis</i> (Wallace, 1865)	gilolensis (Wallace, 1865)		Bachan, Ternate, Halmahera Moluques Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus medon</i> (C. & R. Felder, 1864)	medon (C. & R. Felder, 1864) = <i>Papilio medon</i> = <i>Papilio codrus medon</i> = <i>Papilio codrus papuensis</i> = <i>Papilio codrus</i> var. <i>papuensis</i> = <i>Papilio codrus</i> var. <i>medon</i>		Anu, Wapoga Yapen, Waigeu, Wayom River Salawati, Moor islands, Podena island, Ambubaki, Ampas, Andai, Fakfak, Jayapura, Kobakma, Kwerba, Mieï (Wandammen), Nabire, Pim, Senopi Nouvelle-Guinée Indonésie , Papouasie-Nouvelle-Guinée, Île Fergusson, D'Entrecasteaux, Île Woodlark, Île Rossel Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus melanthus</i> (C. & R. Felder, 1862)	melanthus (C. & R. Felder, 1862) = <i>Papilio melanthus</i> = <i>Papilio codrus melanthus</i>		Bohol, Dinagat, Leyte, Luzon, Marinduque, Masbate, Mindoro, Mindanao, Negros, Panay, Romblon, Samar, Sibuyan Philippines
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus noeli</i> Page & Treadaway, 2003	noeli Page & Treadaway, 2003		Mt. Halcon Mindoro Philippines
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus pisidice</i> (Godman & Salvin, 1888)	pisidice (Godman & Salvin, 1888) = <i>Papilio pisidice</i> = <i>Papilio codrus pisidice</i>		Malaita Îles Salomon
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus segonax</i> (Godman & Salvin, 1878)	segonax (Godman & Salvin, 1878) = <i>Papilio segonax</i>		Nouvelle Bretagne. Nouvelle Irlande. Nouveau Hanovre, Duke of York Group Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus schoutensis</i> (Talbot & Joicey, 1916)	schoutensis (Talbot & Joicey, 1916) = <i>Papilio codrus schoutensis</i>		Korem Biak, Korido Supiori, Namber Numfor Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus striris</i> Jordan, 1909	striris Jordan, 1909		Sanana Îles Sula Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus taloranus</i> Jordan, 1909	taloranus Jordan, 1909		Îles Talaud Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus tenebrionis</i> (Rothschild, 1895)	tenebrionis (Rothschild, 1895) = <i>Papilio segonax tenebrionis</i>		New Georgia Group, Rendova Îles Salomon
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus toealensis</i> (Rothschild, 1896)	toealensis = <i>Papilio codrus toealensis</i> (Rothschild, 1896)		Île Kai Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>codrus yayoee</i> Nihira & Kawamura, 1986	yayoee Nihira & Kawamura, 1986		Sanga Sanga, Sibutu, Tawitawi Philippines
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>empedovana</i> (Corbet, 1941)	empedovana (Corbet, 1941) = <i>Papilio empedovana</i> = <i>Graphium payeni empedovana</i> = <i>Papilio empedocles</i>	Pnc: <i>Hernandia peltata</i> commun	Phuket Sud de la Thaïlande , Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie , Java, Sumatra, Borneo, Batu, Banka, Gaya Indonésie , Balabac, Busuanga, Calamian, Palawan Philippines
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>gelon</i> (Boisduval, 1859)	gelon (Boisduval, 1859) = <i>Papilio gelon</i> = <i>Papilio megasthenes</i> = <i>Papilio gelon</i> ab. <i>megasthenes</i>	peu commun	Grande Terre, Lifu Îles Loyauté Nouvelle-Calédonie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>kosii kosii</i> Müller & Tennent, 1999	kosii kosii Müller & Tennent, 1999		Lak District, Hans Meyer Range, Sud de la Nouvelle Irlande Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>kosii gigantor</i> Müller, Willis & Petrie, 2008	gigantor Müller, Willis & Petrie, 2008		Whiteman Range, Ouest de la Nouvelle Bretagne Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>macleayanus insulana</i> (Waterhouse, 1920)	macleayanus insulana (Waterhouse, 1920) = <i>Papilio macleayanus insulana</i> = <i>Graphium macleayanum insulanum</i>		Île Lord Howe, Norfolk island Australie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>macleayanus macleayanus</i> (Leach, 1814)	macleayanus (Leach, 1814) = <i>Papilio macleayanus</i> = <i>Papilio scottianus</i> = <i>Graphium mendana malaitae</i> = <i>Graphium macleayanum wilsoni</i> = <i>Graphium macleayanum macleayanum</i>	Pnc: <i>Geifera salicifolia</i> , <i>Doryphora aromatica</i> , <i>D. sassafras</i> , <i>Atherosperma moschatum</i> , <i>Tasmannia lanceolata</i> , <i>T. xerophila</i> , <i>Daphnandra micrantha</i> , <i>D. repandula</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Cryptocarya hypospodia</i> , <i>Endiandra pubens</i> commun	Kuranda à Tasmanie Australie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>macleayanus moggana</i> Couchman, 1965	moggana Couchman, 1965 = <i>Graphium moggana</i> = <i>Graphium macleayanum moggana</i>		Tasmanie Australie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>mendana acous</i> (Ribbe, 1898)	mendana acous (Ribbe, 1898) = <i>Papilio mendana var. acous</i>		Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>mendana aureofasciatum</i> Racheli, 1979	aureofasciatum Racheli, 1979 = <i>Graphium mendana malaitae</i>	Rare	Dala Nord-ouest de Malaita Îles Salomons
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>mendana mendana</i> (Godman & Salvin, 1888)	mendana (Godman & Salvin, 1888) = <i>Papilio mendana</i>	rare et localisé	Guadalcanal Îles Salomons
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>mendana neyra</i> (Rothschild, 1895)	neyra (Rothschild, 1895) = <i>Papilio mendana neyra</i>		New Georgia Group Îles Salomons
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>stresemani</i> (Rothschild, 1916)	stresemani (Rothschild, 1916) = <i>Papilio weiskei stresemani</i>	rare	Ceram Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>batjanensis batjanensis</i> Okano, 1984	batjanensis batjanensis Okano, 1984 = <i>Graphium weiskei batjanensis</i> = <i>Graphium stresemani batjanensis</i>		Maluku, Pulau Batjan, Kepulauan Halmahera Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>batjanensis bambai</i> Yagishita, 2007	bambai Yagishita, 2007		Mt. Baineikel, centre d'Halmahera Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>batjanensis wayabulaensis</i> Hanafusa, 1998	wayabulaensis Hanafusa, 1998		Morotai island, Moluques Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>weiskei weiskei</i> (Ribbe, 1900)	<i>weiskei weiskei</i> = <i>Papilio weiskei</i> = <i>Papilio weiskei</i> f. f. <i>euprasina</i>	(Ribbe, 1900)	commun	Île Kei, Abmisibil, Arfak Mts., Batimban, Borne, Carstensz Peak (Mt. Jaya), Cyclops Mts., Daela, Dagum, Enarotali, Habbema Lake, Hattam Mts., Ilaga, Irai, Jila, Jiwika, Kamilai, Kanggime, Mt. Kunupi (Menoo Valley), Kuruagi, Kuyawagi, Langda, Makki, Manunggal, Mapia, Meja Reserve (Manokwari), Modio, Oktanglap, Pass Valley, Rime Telyi, Sabin, Sinak, Subyo, Tembagapura, Timeepa, Tiom, Tübeya, Tuguwai, Utakwa, Walmak (Nipsan), Waghi, Welesi Nouvelle-Guinée Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>weiskei goodenovi</i> (Rothschild, 1916)	<i>goodenovi</i>	(Rothschild, 1916)		Île Goodenough Papouasie-Nouvelle-Guinée
	Groupe des <i>sarpedon</i>			
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis adonarensis</i> (Rothschild, 1896)	<i>adonarensis adonarensis</i> = <i>Papilio sarpedon adonarensis</i> = <i>Graphium sarpedon adonarensis</i>	(Rothschild, 1896)		Sumbawa, Flores, Adonara Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis rufofervidus</i> (Fruhstorfer, 1897)	<i>rufofervidus</i> = <i>Papilio sarpedon rufofervidus</i> = <i>Graphium sarpedon rufofervidus</i> = <i>Graphium sarpedon rufofervidum</i>	(Fruhstorfer, 1897)		Nias Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis rufocellularis</i> (Fruhstorfer, 1905)	<i>rufocellularis</i> = <i>Papilio sarpedon rufocellularis</i> = <i>Graphium sarpedon rufocellularis</i>	(Fruhstorfer, 1905)		Bawean Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis phyris</i> (Jordan, 1937)	<i>phyris</i> = <i>Papilio sarpedon phyris</i> = <i>Graphium sarpedon phyris</i> = <i>Graphium sphyrus</i>	(Jordan, 1937)		Sipora, Pagai Mentawai Islands Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis lycianus</i> (Toxopeus, 1951)	<i>lycianus</i> = <i>Papilio sarpedon lycianus</i> = <i>Graphium sarpedon lycianus</i>	(Toxopeus, 1951)		Java Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis hundertmarki</i> Page & Treadaway, 2013	<i>hundertmarki</i>	Page & Treadaway, 2013		Bali Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis agusyantoei</i> Page & Treadaway, 2013	<i>agusyantoei</i>	Page & Treadaway, 2013		Sumatra Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis phyrisoides</i> Page & Treadaway, 2013	<i>phyrisoides</i>	Page & Treadaway, 2013		Beltung, Bangka Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis toxopei</i> Page & Treadaway, 2013	<i>toxopei</i>	Page & Treadaway, 2013		Lombok Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>adonarensis septentrionicolus</i> Page & Treadaway, 2013	<i>septentrionicolus</i>	Page & Treadaway, 2013		Assam, Meghalaya Inde, Fujian, Hubei Chine
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>anthoned anthoned</i> (C. & R. Felder, 1864)	<i>anthoned anthoned</i> = <i>Papilio anthoned</i> = <i>Papilio sarpedon</i> var. <i>moluccensis</i> = <i>Papilio sarpedon anthoned</i> ab. <i>aurifer</i> = <i>Papilio sarpedon anthoned</i> ab. <i>aureifer</i> = <i>Papilio sarpedon anthoned</i> ab. <i>citricinctus</i> = <i>Papilio sarpedon anthoned</i> = <i>Graphium sarpedon anthoned</i>	(C. & R. Felder, 1864)		Kelang, Ambon, Ceram Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>anthoned dodingensis</i> (Rothschild, 1896)	<i>dodingensis</i> = <i>Papilio sarpedon dodingensis</i> = <i>Grahium sarpedon dodingensis</i>	(Rothschild, 1896)		Bacan, Ternate, Halmahera, Morotai Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>anthoned monticolus</i> (Fruhstorfer, 1896)	<i>monticolus</i> = <i>Papilio sarpedon monticolus</i> = <i>Graphium monticulum</i> = <i>Graphium sarpedon tetric</i> = <i>Graphium monticolus tetric</i> = <i>Graphium sarpedon monticolus</i> ab. <i>longilinea</i> = <i>Graphium longilineatus</i>	(Fruhstorfer, 1896)		Sud et centre du Sulawesi Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>anthoned crudus</i> (Rothschild, 1898)	<i>crudus</i> = <i>Papilio sarpedon crudus</i> = <i>Graphum sarpedon crudus</i>	(Rothschild, 1898)		Obi Indonésie
	<i>halesus</i> = <i>Papilio sarpedon halesus</i> = <i>Graphium sarpedon halesus</i>	(Fruhstorfer, 1907)		Buru Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>choredon</i> (C. & R. Felder, 1864)	<i>choredon</i> = <i>Papilio choredon</i> = <i>Papilio sarpedon choredon</i> = <i>Graphium sareedon choredon</i> = <i>Chlorisses helena</i> = <i>Semicaudati choredon</i> = <i>Graphium sarpedon parsedon</i> = <i>Papilio parsedon</i> = <i>Papilio sarpedon parsedon</i>	(C. & R. Felder, 1864)		Queensland à Nouvelles Galles du Sud côte est de l' Australie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>cloanthus cloanthus</i> (Westwood, 1845)	<i>cloanthus cloanthus</i> = <i>Papilio cloanthus</i> = <i>Zetides cloanthus</i> = <i>Papilio cloanthus</i> f. <i>cloanthulus</i>	(Westwood, 1845)	Pnc: <i>Machilus odoratissima</i>	Népal , Cachemire, Sikkim, Assam Inde, Nord du Myanmar, Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Nan, tak Nord de la Thaïlande, Laos, Vietnam
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>cloanthus clymenus</i> (Leech, 1893)	<i>clymenus</i> = <i>Papilio cloanthus</i> var. <i>clymenus</i> = <i>Papilio cloanthus clymenus</i> = <i>Graphium cloanthus nygmata</i> = <i>Papilio cloanthus</i> gen. vern. <i>clymenoides</i> = <i>Graphium cloanthus clymenoides</i>	(Leech, 1893)		Sud du Yunnan Sud-ouest de la Chine
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>cloanthus kuge</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>kuge</i>	(Fruhstorfer, 1908)		Taiwan
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>cloanthus sumatranum</i> (Hagen, 1894)	<i>sumatranum</i> = <i>Papilio cloanthus</i> var. <i>sumatranus</i> = <i>Graphium cloanthus sumatrana</i>	(Hagen, 1894)		Kalo Hill region Nord de Sumatra Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>isander isander</i> (Godman & Salvin, 1888)	<i>isander isander</i> = <i>Papilio isander</i> = <i>Papilio impar shortlandica</i>	(Godman & Salvin, 1888)		Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée , Île Shortland, Santa Isabel, Guadalcanal, Île Floride, Malaita, Russell, Choiseul Îles Salomons
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>isander impar</i> (Rothschild, 1895)	<i>impar</i> = <i>Papilio sarpedon impar</i>	(Rothschild, 1895)		New Georgia, Kulambangra, Ghizo, Vella La Vella, Rendova, Rubiana Îles Salomons
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>isander imparilis</i> (Rothschild, 1895)	<i>imparilis</i> = <i>Papilio sarpedon imparilis</i> = <i>Graphium sarpedon imparilis</i> = <i>Papilio sarpedon messogis</i> = <i>Graphium sarpedon messogis</i> = <i>Papilio sarpedon temnus</i> = <i>Graphium sarpedon temnus</i> = <i>Papilio sarpedon corycus</i> = <i>Graphium sarpedon corycus</i>	(Rothschild, 1895)		Key, Aru, Sansundi Biak, Waigeu, Salawati, Misool, Aramsolki, Dafonsoro, East Tami, Fakfak, Jayapura, Kloofbivak, Kobakma, Manokwari, Miei (Wandammen), Mokwam, Nabire, Pim, Sabang, Senopi, Sinimburu, Sorong, Van Weelskamp Nouvelle Guinée indonésienne Indonésie , Milne-Bai, Hattam, Kapaur, Dorey, Wilhelms-Hafen, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Nouveau-Hanovre, Duke of York group, Nusa Archipel Bismarck, D'Entrecasteaux island, Woodlark, Louisiades, Vulcan island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>jugans jugans</i> (Rothschild, 1896)	<i>jugans jugans</i> = <i>Papilio sarpedon jugans</i> = <i>Graphium sarpedon jugans</i>	(Rothschild, 1896)		Sumba Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>jugans wetterensis</i> Okano, 1993	<i>wetterensis</i> = <i>Graphium sarpedon wetterensis</i>	Okano, 1993		Wetar Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>jugans kawaimitsuoi</i> Fujioka, 1997	<i>kawaimitsuoi</i> = <i>Papilio sarpedon timorensis</i> = <i>Graphium sarpedon timorensis</i> = <i>Graphium sarpedon cesa</i>	Fujioka, 1997		Timor Indonésie
<i>Graphium</i> (<i>Graphium</i>) <i>milon milon</i> (C. & R. Felder, 1865)	<i>milon milon</i> = <i>Papilio milon</i> = <i>Papilio miletus</i> = <i>Papilio sarpedon</i> var. <i>milon</i> ab. <i>milonides</i> = <i>Papilio sarpedon milon</i> ab. <i>milonides</i> = <i>Papilio sarpedon milon</i> = <i>Graphium milon</i> = <i>Graphium sarpedon milon</i>	(C. & R. Felder, 1865)		Sulawesi, Buton island, Kabaena island, Muna island, Îles Talaud, Peleng Îles Banggai Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018	
Graphium (Graphium) milon sulaensis (Lathy, 1899)	sulaensis (Lathy, 1899) = Papilio srpedon sulaensis = Papilio sarpedon coelius = Graphium anthedon coelius = Graphium sarpedon coelius	Mangole, Sanana, Taliabu Îles Sula Indonésie
Graphium (Graphium) sandawanum joreli Nuyda, 1994	sandawanum joreli Nuyda, 1994	Mt. Kitanlad, Nord de Mindanao Philippines
Graphium (Graphium) sandawanum sandawanum Yamamoto, 1977	sandawanum Yamamoto, 1977	localement commun Mt. Apo, Sud-est de Mindanao Philippines
Graphium (Graphium) sarpedon sarpedon (Linnaeus, 1758)	sarpedon sarpedon (Linnaeus, 1758) = Papilio sarpedon = Zetides sarpedon = Papilio protensor = Papilio demophon = Papilio sarpedon sarpedon f. indiv. m. cellamaculosa = Papilio sarpedon sarpedon f. indiv. m. punctatus = Papilio semifasciatus = Papilio sarpedon var. semifasciatus = Graphium sarpedon semifasciatum = Graphium sarpedon sarpedon f. semifasciatus	Pnc: Cinnamomum camphora, C. oliveri, C. parthenoxylon, Cryptocarya triplinervis, C. cinnamomifolia, C. hypospodia, C. mackinnoniania, C. murrayi, Neolitsea dealbata, N. australiensis, Doryphora aromatica, Tristania laurina, Planchonella laurifolia, Litsea cubeba, L. glutinosa, L. ferruginosa, L. lefeana, L. reticulata, L. rotundifolia var. oblongifolia, Macaranga, Geijera salicifolia, Daphnandra aromatica, Persea gratissima, P. odoratissima, P. thunbergii, Annona reticulata, Melodorum leichharti, Beilschmiedia obtusifolia, Endiandra impressicosta, Planchonella laurifolia, Clerodendrum, Macaranga, Alsodadadns E T commun Centre et sud de la Chine (sauf Hainan et sud du Yunnan)
Graphium (Graphium) sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1908)	connectens (Fruhstorfer, 1908) = Papilio sarpedon connectens = Papilio sarpedon surusami = Graphium sarpedon connectens f. surusumi = Graphium sarpedon connectens gen. vern. latifasciata = Graphium sarpedon connectens gen. aest. connectens	Taiwan
Graphium (Graphium) sarpedon luctatus (Fruhstorfer, 1907)	luctatus (Fruhstorfer, 1907) = Papilio sarpedon luctatus = Papilio sarpedon melas = Papilio sarpedon corbeti = Graphium corbeti = Graphium sarpedon corbeti f. melas = Graphium sarpedon corbeti f. gemmatus = Papilio sarpdon f. melas = Papilio sarpedon sarpedon f. aest. melas	Cambodge, Sud du Guangdong, Guangxi, Hainan Chine , Kalimantan, Natuna, Karimata Indonésie , Brunei, Laos, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam
Graphium (Graphium) sarpedon nipponus (Fruhstorfer, 1903)	nipponus (Fruhstorfer, 1903) = Papilio sarpedon nipponus = Graphium sarpedon nipponus = Graphium sarpedon nipponum gen. aest. nipponum = Graphium sarpedon nipponum = Papilio sarpedon morius = Papilio sarpedon sarpedonides = Papilio sarpedon f. sarpedonides = Graphium sarpedon nipponum gen. vern. sarpedonides = Papilio sarpedon intermedium = Papilio sarpedon hachioinsulanum	Corée, Honshu, Kyushu, Shikoku, Hachijo, Liu Kiu islands Japon
Graphium (Graphium) sarpedon colus (Fruhstorfer, 1907)	colus (Fruhstorfer, 1907)	Balabac, Palawan Philippines
Graphium (Graphium) sarpedon pagus (Fruhstorfer, 1907)	pagus (Fruhstorfer, 1907)	Philippines (sauf Balabac, Palawan)
Graphium (Graphium) sarpedon morius (Fruhstorfer, 1908)	morius (Fruhstorfer, 1908)	Iriomotejima, Ishigakijima Yaeyama islands Japon
Graphium (Graphium) sarpedon sirkari Page & Treadaway, 2013	sirkari Page & Treadaway, 2013 = Papilio sarpedon corbeti f. gemmatus	Donggan, Mengallan, Dongchuan Sud-ouest du Yunnan Chine , Khasi Hills Assam, Meghalaya Nord de l'Inde, Chudu Razi Hills, Kachin state Myanmar
Graphium (Graphium) tereдон (C. & R. Felder, 1865)	tereдон (C. & R. Felder, 1865) = Delchima thermodusa = Papilio sarpedon tereдон ab. thermodusa = Papilio sarpedon tereдон	Kerala Sud de l'Inde, Sri Lanka
	Groupe des eurypylus	
Graphium agamemnon agamemnon (Linnaeus, 1758)	agamemnon agamemnon (Linnaeus, 1758) = Papilio agamemnon = Papilio atreus = Papilio mynion = Zetides agamemnon = Macfarlaneana agamemnon = Papilio aegisthus = Papilio dorylas = Papilio agamemnon var. anoura = Papilio agamemnon var. rufescens = Papilio agamemnon ab. aegisthus = Macfarlaneana agamemnon agamemnon	Pnc: Michelia champaca, Ancana stenopetala, Annona cheromoya, A. cherimola, A. glabra, A. muricata, A. reticulata, A. squamosa, Artabotrys hexapetalus, Cyatostemma micranthum, Desmos chinensis, D. goezeanus, Fitzalanina heteropetala, Friesodielsia, Goniothalamus, australis, Haplostichanthus johnsoni, Melodorum uhrii, Micelia alba, M. champaca, M. figo, Milusa brahei, M. traceyi, Mitrephora froggattii, Oncodostigma, Polyalthia michaeli, P. nitidissima, P. longifolia, Pseuduvaria froggattii, P. hylandii, P. mulgraveana, P. villosa, Rauwenhoffia leichhardtii, Rollinia deliciosa, Saccopetalum, Uvaria goezeanus, U. membranacea, U. rufa, U. microcarpa, Xylopia maccreai très commun Népal, Nord de l'Inde, Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie , Singapour, Hainan, Sud du Yunnan Chine , Taiwan, Tioman, Sumatra, Java, Bali, Borneo Indonésie , Philippines
Graphium (Graphium) agamemnon admiralis (Rothschild, 1915)	admiralis (Rothschild, 1915)	Manus Îles de l'Amirauté Îles Salomon
Graphium (Graphium) agamemnon andamana (Lathy, 1907)	andamana (Lathy, 1907) = Papilio agamemnon andamana = Graphium agamemnon andamanum	Andaman islands Inde
Graphium (Graphium) agamemnon argynnus (Druce, 1888)	argynnus (Druce, 1888) = Papilio argynnus = Papilio agamemnon argynnus	Île Kai Indonésie
Graphium (Graphium) agamemnon atropictus (Fruhstorfer, 1903)	atropictus (Fruhstorfer, 1903)	Île d'Enggano Indonésie
Graphium (Graphium) agamemnon baweana (Hagen, 1896)	baweana (Hagen, 1896) = Papilio agamemnon var. baweana = Graphium agamemnon baweanum = Papilio agamemnon aelius	Bawean Indonésie
Graphium (Graphium) agamemnon comodus (Fruhstorfer, 1903)	comodus (Fruhstorfer, 1903) = Papilio agamemnon comodus = Papilio agamemnon var. celebensis = Papilio agamemnon celebensis	Sulawesi, Buton, Kabaena, Muna, Wowoni, Tukangbesi islands Indonésie
Graphium (Graphium) agamemnon decoratus (Rothschild, 1895)	decoratus (Rothschild, 1895) = Papilio agamemnon decoratus = Graphium agamemnon decoratum	Nicobar Inde
Graphium (Graphium) agamemnon exilis (Rothschild, 1895)	exilis (Rothschild, 1895)	Wetar, Damar, Leti, Babar, Tanimbar, Timor Indonésie
Graphium (Graphium) agamemnon guttatus (Rothschild, 1895)	guttatus (Rothschild, 1895) = Papilio agamemnon guttatus = Papilio agamemnon kineas = Papilio agmemnon appius	Morotai, Halmahera, Ternate, Bachan, Obi Indonésie
Graphium (Graphium) agamemnon lasius Van Eecke, 1918	lasius (Van Eecke, 1918)	Simeulue island Indonésie
Graphium (Graphium) agamemnon ligatus (Rothschild, 1895)	ligatus (Rothschild, 1895) = Papilio agamemnon ligatus = Graphium agamemnon ligathus = Papilio agamemnon mynion = Papilio agamemnon atreus	Aru, Misool, Salawati, Waigeu, Wairey, Waringkabom Batanta, Namber Numfor, Sansundi Biak, Korido Supiori, Wapoga Yapen, Roon, Moor islands, Mambor island, Podena Island, Ampas, Andai, Beaufort Bivak, Boepoel (Bupul), Dabra, Jayapura, Kloofbivak, Kobakma, Kokas, Kwerba, Manokwari, Marina Valen, Meja Reserve, Miel, Nabire, Sorong, Tamrau Mts., Timika, Waena, Windesi Nouvelle Guinée Indonésie , D'Entrecasteaux, Torres Strait Island Papouasie-Nouvelle-Guinée , Queensland Nord-est de l' Australie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Graphium (Graphium) agamemnon menides</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>menides</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Papilio agamemnon menides</i>			Sud de l'Inde, Sri Lanka
<i>Graphium (Graphium) agamemnon meton</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>meton</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Papilio agamemnon meton</i>			Lombok, Sumba, Sumbawa Indonésie
<i>Graphium (Graphium) agamemnon neopommerania</i> (Honrath, 1888)	<i>neopommerania</i> (Honrath, 1888) = <i>Papilio agamemnon var. neopommerania</i> = <i>Papilio agamemnon neopommeranius</i>			Nouvelle Bretagne, Nouvelle Irlande, Duke of York group, Nouveau Hanovre Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium (Graphium) agamemnon obliteratus</i> (Lathy, 1899)	<i>obliteratus</i> (Lathy, 1899) = <i>Papilio obliteratus</i>			Rossel Island, Archipel Louisiades Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium (Graphium) agamemnon pedius</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>pedius</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Papilio agamemnon pedius</i>			Dammer Indonésie
<i>Graphium (Graphium) agamemnon perecopus</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>perecopus</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Papilio agmemnon perecopus</i>			Babber Indonésie
<i>Graphium (Graphium) agamemnon plisthenes</i> (C. & R. Felder, 1864)	<i>plisthenes</i> (C. & R. Felder, 1864) = <i>Papilio plisthenes</i> = <i>Papilio agamemnon plisthenes</i>			Buru, Ambon, Ceram, Goram Indonésie
<i>Graphium (Graphium) agamemnon pulo</i> (Evans, 1932)	<i>pulo</i> (Evans, 1932) = <i>Zetides agamemnon pulo</i>			Sud de Nicobar Inde
<i>Graphium (Graphium) agamemnon rufoplenus</i> (Fruhstorfer, 1898)	<i>rufoplenus</i> (Fruhstorfer, 1898) = <i>Papilio agamemnon rufoplenus</i>			Nias Indonésie
<i>Graphium (Graphium) agamemnon salomonis</i> (Rothschild, 1895)	<i>salomonis</i> (Rothschild, 1895) = <i>Papilio agamemnon salomonis</i>			Îles Salomon
<i>Graphium (Graphium) agamemnon ugiensis</i> (Jordan, 1909)	<i>ugiensis</i> (Jordan, 1909) = <i>Papilio agamemnon ugiensis</i>			Île Ugi Îles Salomon
<i>Graphium (Graphium) albociliatus</i> (Fruhstorfer, 1901)	<i>albociliatus</i> (Fruhstorfer, 1901) = <i>Papilio evemon albociliatus</i> = <i>Papilio evemon albociliatis</i>			Assam, Meghalaya Inde, Myanmar, Lak Sao Nord du Laos, Vinh Phu, Ha Tuyen, Mt. Braian Nord du Vietnam, Yunnan Chine
<i>Graphium (Graphium) arycles arycles</i> (Boisduval, 1836)	<i>arycles arycles</i> (Boisduval, 1836) = <i>Papilio arycles</i> = <i>Zetides arycles</i> = <i>Arisbe arycles</i> = <i>Eurypleana arycles</i> = <i>Papilio arycles ab. incertus</i> = <i>Papilio arycles sphinx</i> = <i>Graphium arycles sphinx</i> = <i>Graphium arycles masal</i>	rare		Est de la Thaïlande, Est du Cambodge, Centre-sud du Laos, Centre et Sud du Vietnam
<i>Graphium (Graphium) arycles occidentalis</i> (Page & Treadaway, 2014)	<i>occidentalis</i> Page & Treadaway, 2014			Midzoram Manipur Nord-est de l'Inde, Sud du Myanmar, Chiang Mai Nord-ouest de la Thaïlande
<i>Graphium (Graphium) arycles perinthus</i> (Fruhstorfer, 1915)	<i>perinthus</i> (Fruhstorfer, 1915) = <i>Papilio arycles perinthus</i> = <i>Arisbe arycles perinthus</i> = <i>Eurypleana arycles perinthus</i>			Balabac, Busuanga, Palawan Philippines
<i>Graphium (Graphium) arycles rama</i> (C. & R. Felder, 1860)	<i>rama</i> (C. & R. Felder, 1860) = <i>Papilio rama</i>			Phetchaburi, Ranong, Yala Sud de la Thaïlande, Langkawi island, Perak, Selangor, Sabah Malaisie, Singapour, Java, Kalimantan Indonésie
<i>Graphium (Graphium) arycles arycleoides</i> (Fruhstorfer, 1902)	<i>arycleoides</i> (Fruhstorfer, 1902) = <i>Papilio arycles arycleoides</i>			Muak Lek, Pak Phili, Chonburi, Chanthaburi, Saraburi, Wan Nam Khiewo, Khao Khiewo, Khlong Tariew districts Sud-est de la Thaïlande
<i>Graphium (Graphium) bathycles bathycles</i> (Zinken, 1831)	<i>bathycles bathycles</i> (Zinken, 1831) = <i>Papilio bathycles</i> = <i>Zetides bathycles</i> = <i>Arisbe bathycles</i> = <i>Eurypleana bathycles</i>	assez commun		Java Indonésie
<i>Graphium (Graphium) bathycles bathycloides</i> (Honrath, 1884)	<i>bathycloides</i> (Honrath, 1884) = <i>Papilio bathycles var. bathycloides</i> = <i>Papilio bathycles bathycloides</i> = <i>Arisbe bathycles bathycloides</i> = <i>Eurypleana bathycles bathycloides</i> = <i>Papilio bathycles manlius</i> = <i>Graphium bathycles capitulinus</i>			Ranong, Yala Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise, Sarawak, Sabah Malaisie, Brunei, Sumatra, Kalimantan Indonésie, Palawan, Balabac, Busuanga Philippines
<i>Graphium (Graphium) bathycles manlius</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>manlius</i> (Fruhstorfer, 1908) = <i>Papilio bathycles manlius</i>			Palawan Philippines
<i>Graphium (Graphium) chironides chironides</i> (Honrath, [1884])	<i>chironides chironides</i> (Honrath, [1884]) = <i>Papilio chiron var. chironides</i> = <i>Papilio chiron</i> = <i>Papilio bathycles chiron</i> = <i>Papilio bathycles chiron ab. chironides</i> = <i>Graphium bathycles chiron</i> = <i>Graphium clanis chironicum</i> = <i>Papilio bathycles chiron f.vern. ligyra</i>			Darjeeling Sikkim, Meghalaya, Assam, Manipur, Nagaland Inde, Népal, Bhoutan, Shanxi, Shaanxi, Sichuan, Yunnan Chine
<i>Graphium (Graphium) chironides clanis</i> (Jordan, 1909)	<i>clanis</i> (Jordan, 1909) = <i>Papilio clanis</i>			Fujian, Guangxi Chine
<i>Graphium (Graphium) chironides malayanum</i> Eliot, 1982	<i>malayanum</i> Eliot, 1982 = <i>Graphium clanis malayanum</i>			Sud de la Thaïlande, Ouest de la Malaisie
<i>Graphium (Graphium) chironides punctatus</i> Page & Treadaway, 2014	<i>punctatus</i> Page & Treadaway, 2014			Centre du Myanmar, Phrae, Tak Province, Chiang Mai, Chantaburi Nord de la Thaïlande, Mt. Phupien Kaxieng, Danchung district, Xekong Prefecture Nord du Laos, Tam Dao, Vinh Phu, Dak Lak Province Nord du Vietnam, Cambodge
<i>Graphium (Graphium) chironides tereus</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>tereus</i> (Fruhstorfer, 1908) = <i>Papilio bathycles tereus</i> = <i>Graphium bathycles tereus</i>			Hainan Chine
<i>Graphium (Graphium) doson actor</i> (Fruhstorfer, 1907)	<i>doson actor</i> (Fruhstorfer, 1907) = <i>Papilio jason actor</i> = <i>Papilio jason nanus</i> = <i>Papilio jason praestabilis</i> = <i>Papilio jason f. praestabilis</i> = <i>Papilio doson axion f. aest. praestabilis</i>			Guangdong, Hainan Sud de la Chine, Phrae Est de la Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam,
<i>Graphium (Graphium) doson albidus</i> (Nakahara, 1930)	<i>albidus</i> (Nakahara, 1930) = <i>Papilio doson albidus</i> = <i>Papilio mikado</i> = <i>Papilio eurypylus mikado</i> = <i>Graphium doson albidum</i> = <i>Graphium doson tsushmanus</i> = <i>Graphium doson aykut</i>			Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima Island Japon
<i>Graphium (Graphium) doson axionides</i> Page & Treadaway, 2014	<i>axionides</i> Page & Treadaway, 2014 = <i>Papilio axion</i> = <i>Papilio eurypylus axion</i> = <i>Papilio jason axion gen. vern. nivepictus</i>			Pakistan, Népal, Assam, Arunchal Pradesh, Maghalaya, Sikkim Nord de l'Inde, Bangladesh, Myanmar, Nord-ouest de la Thaïlande, Ha Giang Province Nord-ouest du Vietnam, Hong-Kong, Yunnan Chine
<i>Graphium (Graphium) doson doson</i> (C. & R. Felder, 1864)	<i>doson</i> (C. & R. Felder, 1864) = <i>Papilio doson</i> = <i>Papilio jason</i> = <i>Papilio telephus</i> = <i>Papilio eurypylus doson</i> = <i>Zetides doson</i> = <i>Arisbe doson</i> = <i>Eurypleana doson</i>	Pnc: <i>Desmos chinensis</i> , <i>Uvaria microcarpa</i> , <i>Michella alba</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Polyalthia</i> , <i>Rauvenhoffia</i> , <i>Mitrephora</i> , <i>Diploglottis</i> , <i>Cinnamomum</i> , <i>Magnolia</i>	commun	Sri Lanka
<i>Graphium (Graphium) doson eleius</i> (Fruhstorfer, 1907)	<i>eleius</i> (Fruhstorfer, 1907) = <i>Papilio jason eleius</i>			Kerala, Tamil Nadu, Malabar, Karwar Sud de l'Inde
<i>Graphium (Graphium) doson eurypylides</i> (Staudinger, 1895)	<i>eurypylides</i> (Staudinger, 1895) = <i>Papilio jason var. eurypylides</i> = <i>Papilio eurypylus eurypylides</i> = <i>Papilio jason ampyx</i> = <i>Graphium doson ampyx</i>			Lombok, Sumbawa Indonésie
<i>Graphium (Graphium) doson evemonides</i> (Honrath, [1884])	<i>evemonides</i> (Honrath, [1884]) = <i>Papilio jason var. evemonides</i> = <i>Papilio jason appulejus</i> = <i>Papilio jason autronicus</i> = <i>Papilio heurni</i> = <i>Arisbe doson evemonides</i> = <i>Eurypleana doson evemonides</i>	Pnc: <i>Cinnamomum</i> , <i>Polyalthia</i>		Sud de la Thaïlande, Malaisie, Brunei, Bellitung, Kalimantan, Bangka, Natuna, Sumatra, Tahnamasa, Simeulue Indonésie, Bongao, Balabac, Mapun, Sanga Sanga, Sibutu, Tawi-tawi Philippines
<i>Graphium (Graphium) doson gelap</i> Page & Treadaway, 2011	<i>gelap</i> Page & Treadaway, 2011			Île Karimata Indonésie
<i>Graphium (Graphium) doson gyndes</i> (Fruhstorfer, 1907)	<i>gyndes</i> (Fruhstorfer, 1907) = <i>Papilio jason gyndes</i> = <i>Arisbe doson gyndes</i> = <i>Eurypleana doson gyndes</i>			Calamian, Palawan, Busuanga, Dumaran Philippines

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018	
Graphium (Graphium) doson kajanga (Corbet, 1937)	kajanga (Corbet, 1937) = Papilio kajanga	île Tioman Malaisie
Graphium (Graphium) doson kangeanus Page & Treadaway, 2014	kangeanus Page & Treadaway, 2014	Kangean Indonésie
Graphium (Graphium) doson nauta (Tsukada & Nishiyama, 1980)	nauta Tsukada & Nishiyama, 1980 = <i>Arisbe</i> doson nauta = <i>Eurypleana</i> doson nauta	Basilan, Bohol, Catanduanes, Cebu, Dinagat, Homonhon, Jolo, Leyte, Luzon, Marinduque, Masbate, Mindoro, Mindanao, Negros, Panay, Panaon, Polillo, Samar, Siargao, Sibutu, Siquijor, Tablas, Ticao Philippines
Graphium (Graphium) doson okibi Tsukada & Nishiyama, 1980	okibi Tsukada & Nishiyama, 1980	Siberut, Sipora Indonésie
Graphium (Graphium) doson perillus (Fruhstorfer, 1908)	perillus (Fruhstorfer, 1908) = Papilio jason perillus	Irimotejima island, Ishigakijima island Yaeyama islands Japon
Graphium (Graphium) doson postianus (Fruhstorfer, 1902)	postianus (Fruhstorfer, 1902) = Papilio doson postianus = <i>Papilio</i> doson jostianus = <i>Graphium</i> doson postianum = <i>Arisbe</i> doson postianus = <i>Eurypleana</i> doson postianus	Pnc: <i>Magnolia grandiflora</i> , <i>Michelia alba</i> , <i>M. compressa</i> , <i>Annona squamosa</i> Taiwan , Batanes Philippines
Graphium (Graphium) doson rubroplaga (Rothschild, 1895)	rubroplaga (Rothschild, 1895) = Papilio eurypylus rubroplaga	Nias Indonésie
Graphium (Graphium) doson sangeanus (Kalis, 1941)	sangeanus (Kalis, 1941)	Balli, Nus Barong Indonésie
Graphium (Graphium) doson sankapura (Fruhstorfer, 1904)	sankapura (Fruhstorfer, 1904) = Papilio doson sankapura = <i>Graphium</i> sankapaur = <i>Graphium</i> doson sankapurum	Bawean Indonésie
Graphium (Graphium) doson sarpedonoides Abang & Page, 2006	sarpedonoides Abang & Page, 2006	Balambangan island, Banggai island Sabah Malaisie
Graphium (Graphium) doson vulso (Fruhstorfer, 1907)	vulso (Fruhstorfer, 1907) = Papilio jason vulso	Java Indonésie
Graphium (Graphium) doson yamazakii Page & Treadaway, 2014	yamazakii Page & Treadaway, 2014	Redang island Malaisie
Graphium (Graphium) evemon evemon (Boisduval, 1836)	evemon evemon (Boisduval, 1836) = Papilio evemon = <i>Zetides</i> evemon = <i>Arisbe</i> evemon = <i>Eurypleana</i> evemon	assez commun Java Indonésie
Graphium (Graphium) evemon eventus (Frustorfer, 1908)	eventus (Frustorfer, 1908) = Papilio evemon eventus	Brunei , Sarawak, Sabah Malaisie , Bangka, Belitung, Kalimantan, Natuna, Singkep, Sumatra, Tanahmasa Indonésie , Mapun Philippines
Graphium (Graphium) evemon igneolus (Fruhstorfer, 1901)	igneolus (Fruhstorfer, 1901)	Nias Indonésie
Graphium (Graphium) evemon heurni (van Eecke, 1913)	heurni (van Eecke, 1913) = Papilio eurypylus heurni	Simeulue Indonésie
Graphium (Graphium) evemon hetaerias (Jordan, 1937)	hetaerias (Jordan, 1937)	Mentawai island, Siberut Indonésie
Graphium (Graphium) evemon lebar Page & Treadaway, 2011	lebar Page & Treadaway, 2011	île Karimata Indonésie
Graphium (Graphium) evemon orithia (Jordan, 1909)	orithia (Jordan, 1909) = Papilio orithia = <i>Arisbe</i> evemon orithia = <i>Eurypleana</i> evemon orithia	Sud du Myanmar , Ranong, Phuket, Yala Sud de la Thaïlande , Langkawi island, Perak, Pahang, Selangor Ouest de la Malaisie , Singapour
Graphium (Graphium) eurypylus acheron (Moore, 1885)	eurypylus acheron (Moore, 1885) = <i>Zetides</i> acheron = <i>Papilio</i> eurypylus juba = <i>Papilio</i> acheron = <i>Papilio</i> eurypylus axion ab. acheron = <i>Papilio</i> doson axion f. vern. acheron = <i>Graphium</i> eurypylus cheronus = <i>Papilio</i> eurypylus acheron f. cheronus = <i>Papilio</i> eurypylus juba = <i>Papilio</i> eurypylus cheronus f.vern. petina = <i>Graphium</i> eurypylus chemus	Guangdong, Hainan, Yunnan China , Assam, Sikkim, Meghalaya India , Myanmar , Thaïlande , Laos, Cambodge, Vietnam
Graphium (Graphium) eurypylus artofasciatus (Lathy, 1899)	artofasciatus (Lathy, 1899) = Papilio arctofasciatus = <i>Graphium</i> euryplius arctofasciatum	Sanana îles Sula Indonésie
Graphium (Graphim) eurypilus daton (Fruhstorfer, 1908)	daton (Fruhstorfer, 1908) = Papilio eurypylus daton	Java Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus extensus (Rothschild, 1895)	extensus (Rothschild, 1895) = Papilio eurypylus extensus = <i>Papilio</i> eurypylus var. praetorianus = <i>Graphium</i> eurypylus extensus f. praetorianus = <i>Papilio</i> eurypylus var. talboti = <i>Graphium</i> eurypylus extensus f. talboti	Nouvelle Bretagne, Nouvelle Irlande, Duke of York Group, Nouveau Hanovre Archipel Bismarck Papouasie-Nouvelle-Guinée
Graphium (Graphium) eurypylus eurypylus (Linnaeus, 1758)	eurypylus (Linnaeus, 1758) = Papilio eurypylus = <i>Graphium</i> euryplius = <i>Chlorisses</i> harrietta = <i>Semicaudati</i> kochianus = <i>Zetides</i> euryplis = <i>Graphium</i> eurypelus = <i>Arisbe</i> aurypylus = <i>Eurypleana</i> eurypylus	Pnc: <i>Michelia champaca</i> , <i>Annona cherimola</i> , <i>A. glabra</i> , <i>A. muricata</i> , <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>Artabotrys</i> , <i>Desmos</i> , <i>Melodorum</i> , <i>Milusa traceyi</i> , <i>Mitrephora frogga</i> , <i>Polyalthia australis</i> , <i>P. nitidissima</i> , <i>Rauwenhoffia leichhardtii</i> , <i>Saccopetalum bidwillii</i> , <i>Uvaria goezeana</i> , <i>U. membranacea</i> , <i>U. rufa</i> , <i>Diploglottis australis</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> commun Buru, Ambon, Ceram Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus fumikoe Detani, 1983	fumikoe Detani, 1983	Peleng îles Banggai Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus gordon (C. & R. Felder, 1865)	gordon (C. & R. Felder, 1865) = Papilio gordon = <i>Papilio</i> eurypylus gordon = <i>Arisbe</i> eurypylus gordon = <i>Eurypleana</i> eurypylus gordon	Basilan, Bohol, Catanduanes, Cebu, Homonhon, Lubang, Leyte, Luzon, Marinduque, Masbate, Mindanao, Mindoro, Negros, Panaon, Panay, Polillo, Samyr, Sibuyan, Siquijor Philippines , îles Talaud Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus isaribi Tsukada & Nishiyama, 1981	isaribi Tsukada & Nishiyama, 1981	Mentawai island, Siberut Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus kaicola (Koçak, 1983)	kaicola (Koçak, 1983) = <i>Papilio</i> eurypylus melampus = <i>Papilio</i> eurypylus melampus ab. rufinus = <i>Graphium</i> eurypylus melampus	île Kai Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus lutorius (Fruhstorfer, 1907)	lutorius (Fruhstorfer, 1907) = Papilio eurypylus lutorius = <i>Papilio</i> eurypylus georgius = <i>Papilio</i> eurypylus eutorius = <i>Graphium</i> eurypylus georgius	Bachan, Halmahera, Morotai, Obi, Ternate Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus lycaon (C. & R. Felder, 1865)	lycaon (C. & R. Felder, 1865) = Papilio lycaon = <i>Papilio</i> eurypylus lycaon = <i>Graphium</i> eurypylus subhi	Queensland à Nouvelles Galles du Sud Est de l' Australie
Graphium (Graphium) eurypylus lycaonides (Rothschild, 1895)	lycaonides (Rothschild, 1895) = Papilio eurypylus lycaonides = <i>Papilio</i> eurypylus priscus = <i>Papilio</i> eurypylus priscus f. aurifer	Aru, Waigeu, Jobi, Namber Numfor, Yapen, Korido Supiori, Ampas, Ati-Ati-Onin, Batimban, Beaufort, Biak, Borne, Dabra, Dafensero, Dojo, East Tami, Jayapura, Jila, Juruf, Karubaga, Kloofbivak, Kobakma, Kwerba, Lereh, Mie, Modio, Nabire, Prafi, Sabang, Senopi, Sentani, Sorong, Tamrau Mts., Uapa, Utrub, Werba, Wolong River Nouvelle Guinée Indonésie , Papouasie Nouvelle-Guinée, îles D'Entrecasteaux Papouasie-Nouvelle-Guinée
Graphium (Graphium) eurypylus macronius Jordan, 1909	macronius Jordan, 1909	Andamans, Nicobars Inde
Graphium (Graphium) eurypylus madrmii Hanafusa, 1993	madrmii Hanafusa, 1993	Kangean Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus nyctimus (Waterhouse & Lyell, 1914)	nyctimus (Waterhouse & Lyell, 1914) = Papilio nyctimus	Territoire du Nord, île Groote Eylandt Australie

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018	
Graphium (Graphium) eurypylus mecisteus (Distant, 1885)	mecisteus = Papilio mecisteus = Papilio eurypylus daton = Papilio eurypylus axion ab. mecisteus = Arisbe eurypulus mecisteus = Eurypleana eurypylus mecisteus	(Distant, 1885)	Ranong, Phangnga Phuket, Yala Sud de la Thaïlande , Langkawi island, Péninsule malaise, Sarawak, Sabah Malaisie , Brunei , Beltung, Kalimantan, Karimata, Sumatra Indonésie , Palawan, Balabac, Busuanga Philippines
Graphium (Graphium) eurypylus pamphylius (Fruhstorfer, 1902)	pamphylius = Papilio pamphylius = Papilio eurypylus pamphylius = Papilio telephus = Graphium eurypylus telephus = Papilio sangira = Papilio eurypylus sangira = Graphium eurypylus sangira	(C. & R. Felder, 1865)	Sanghir,Sulawesi, Kabaena island Indonésie
Graphium (Graphium) eurypylus pauli Page & Treadaway, 2014	pauli	Page & Treadaway, 2014	Buton, Muna Indonésie
Graphium (Graphium) leechi (Rothschild, 1895)	leechi = Papilio leechi = Graphium leechi leechi = Papilio leechi gen. vern. aprilis = Graphium leechi yunnana	(Rothschild, 1895)	peu commun
Graphium (Graphium) meyeri extremum 'Tsukada & Nishiyama, 1980)	meyeri extremum	(Tsukada & Nishiyama, 1980)	Sanana Îles Sula Indonésie
Graphium (Graphium) meyeri meyeri (Hopffer, 1874)	meyeri = Papilio meyeri	(Hopffer, 1874)	commun
Graphium (Graphium) procles (Grose-Smith, 1887)	procles = Papilio procles	(Grose-Smith, 1887)	localisé et peu commun
Graphium (Graphium) sallastius sallastius (Staudinger, 1895)	sallastius sallastius = Papilio sallastius = Papilio eurypylus sallastius = Papilio eurypylus sallastinus = Papilio eurypylus abricus = Papilio eurypulus gabinus	(Staudinger, 1895)	
Graphium (Graphium) sallastius insularius (Rothschild, 1896)	insularius = Papilio euryplius insularius = Papilio eurypylus insularis = Graphium eurypylus insularis	(Rothschild, 1896)	
Graphium (Graphium) sallastius lucius (Fruhstorfer, 1903)	lucius = Papilio jason lucius	(Fruhstorfer, 1903)	
Graphium (Graphium) sallastius crispus (Fruhstorfer, 1903)	crispus	(Fruhstorfer, 1903)	
Graphium (Graphium) sallastius neolepidus Page & Treadaway, 2014	neolepidus = Papilio eurypylus lepidus	Page & Treadaway, 2014	
	Groupe des ?		
Graphium (Graphium) macfarlanei cestius (Fruhstorfer, 1903)	macfarlanei cestius = Papilio macfarlanei cestius	(Fruhstorfer, 1903)	
Graphium (Graphium) macfarlanei macfarlanei (Butler, 1877)	macfarlanei = Papilio macfarlanei	(Butler, 1877)	Pnc: <i>Annona mercuriata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. muricata</i> , <i>A. reticulata</i>
Graphium (Graphium) macfarlanei seminigra (Butler, 1882)	seminigra = Zetides seminigra = Papilio macfarlanei seminiger = Papilio aegistus var. aegistiades	(Butler, 1882)	
Graphium (Graphium) meeki meeki (Rothschild, 1901)	meeki = Papilio meeki	(Rothschild, 1901)	
Graphium (Graphium) meeki inexpectatum Miller & Miller, 1981	inexpectatum	Miller & Miller, 1981	
	Groupe des wallacei		
Graphium (Graphium) browni (Godman & Salvin, 1879)	browni = Papilio browni	(Godman & Salvin, 1879)	Pnc: <i>Annona mercuriana</i>
Graphium (Graphium) hicetaon (Mathew, 1886)	hicetaon = Papilio hicetaon = Papilio hecetaon	(Mathew, 1886)	
Graphium (Graphium) wallacei rubrosignatus (Rothschild, 1895)	wallacei = Papilio wallacei rubrosignatus	(Rothschild, 1895)	
Graphium (Graphium) wallacei wallacei (Hewitson, [1858])	wallacei = Papilio wallacei	(Hewitson, [1858])	Pnc: <i>Annona muricata</i>
	Sous-genre : Arisbe = Zellma = Ailus	Hübner, [1819]	
	Groupe des antheus		
Graphium (Arisbe) antheus (Cramer, 1779)	antheus = Papilio antheus = Papilio antharis = Papilio nyassae = Papilio lurinus = Papilio antheus evombaroides = Papilio utuba = Papilio mercutius = Papilio hollandi = Papilio antheus ab. scheffleri = Papilio antheus latepictulus = Papilio antheus ab. combinata = Papilio antheus f. microvombaroides = Papilio antheus ab. misanus = Papilio antheus ab.hoesemanni = Papilio antheus ab.rubrimacula = Papilio antheus ab. comma = Papilio antheus antheus ab mathieui = Cosmodesmus antheus antheus ab. mathieui = Papilio antheus antheus ab. paradoxa = Cosmodesmus antheus antheus ab. paradoxa = Papilio antheus f.atrantheus = Papilio anthaeus = Arisbe antheus	(Cramer, 1779)	Pnc: <i>Uvaria calfra</i> , <i>U. kirkii</i> , <i>Arbotrys monteiroae</i> , <i>A. brachypetalus</i> , <i>Annona reticulata</i> , <i>A. senegalensis</i> , <i>Cleistochlamys kirkii</i> , <i>Hexabobus monopetalus</i> , <i>Landolphia ugandensis</i> , <i>Monanthotaxis calfra</i> , <i>Monodora jundi</i>
Graphium (Arisbe) evombar evombar (Boisduval, 1836)	evombar evombar = Papilio evombar = Arisbe evombar = Arisbe evombar evombar	(Boisduval, 1836)	
Graphium (Arisbe) evombar viossati Collins, 1997	viossati = Arisbe evombar viossati	Collins, 1997	
	Groupe des policenes		
Graphium (Arisbe) biokoensis Gauthier, 1984	biokoensis = Papilio polcenes biokoensis = Papilio nigrescens ab. intermedia = Arisbe biokoensis	Gauthier, 1984	
Graphium (Arisbe) junodi (Trimen, 1893)	junodi = Papilio junodi = Arisbe junodi	(Trimen, 1893)	

Auteur: Dominick PRUVOT août 2018				
Graphium (Arisbe) liponesco (Suffert, 1904)	liponesco (Suffert, 1904) = Papilio polícenes liponesco = Papilio boolae = Arisbe liponesco		pas rare	Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Ouest du Nigeria, Gabon, Cameroun
Graphium (Arisbe) polícenoides (Holland, 1892)	polícenoides (Holland, 1892) = Papilio polícenoides = Papilio polícines nigrescens = Graphium nigrescens = Arisbe polícenoides		Rare	Cameroun, Gabon, République du Congo, Bas-Fleuve, Equateur République démocratique du Congo
Graphium (Arisbe) polistratus (Grose-Smith, 1889)	polistratus (Grose-Smith, 1889) Pnc: Annona senegalensis = Papilio polistratus = Papilio sisenna = Papilio richelmanni = Arisbe polistratus		peu commun	Nigeria, Côte de la République démocratique du Congo à Kenya, Tanzanie, Nord du Malawi, Mozambique, Afrique du Sud
Graphium (Arisbe) polícenes laurentia (Le Cerf, 1924)	polícenes laurentia (Le Cerf, 1924) Pnc: Uvaria caffra, Artabotrys monteiroae = Papilio polícenes laurentia			Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Transkei Afrique du Sud
Graphium (Arisbe) polícenes polícenes (Cramer, 1775)	polícenes (Cramer, 1775) Pnc: Uvaria caffra, U. bukobensis, U. chamae, Artabotrys monteiroae, Landolphia buchanani, L. ugandensis, Polyalthia, Annona reticulata, A. senegalensis, A. squamosa, Monanthotaxis caffra = Papilio polícenes = Arisbe polícenes = Papilio pompilius = Papilio agapenor = Papilio scipio = Papilio polícenus = Papilio polícenes var. sudanicus = Papilio polícenes polícenes f. guineensis = Cosmodesmus polícenes polícenes f. guineensis = Graphium polícenes f. coussementi = Arisbe polícenes polícenes		commun	Afrique (au sud du sahara)
Graphium (Arisbe) polícenes telloi Hecq, 1999	telloi Hecq, 1999 = Arisbe polícenes telloi			Nigeria, Babungo Nord du Cameroun, Brendja Nord de la République centrafricaine, Sud du Soudan
	Groupe des porthaon			
Graphium (Arisbe) porthaon mackiei Collins & Larsen, 1974	porthaon mackiei Collins & Larsen, 1974 = Arisbe porthaon mackiei			Meru Forest Kenya
Graphium (Arisbe) porthaon porthaon (Hewitson, 1865)	porthaon (Hewitson, 1865) Pnc: Artabotrys monteiroae, Annona, Uvaria caffra, U. kirkii, Friesodielsia obovata, Cleistochlamys kirkii, Monodora junodii, Monanthotaxis caffra = Papilio porthaon = Arisbe porthaon = Papilio porthaon ab. adjectus = Papilio porthaon vernayi = Arisbe porthaon porthaon		peu commun	Côte du Kenya, Tanzanie, Angola, Malawi, Zambie, Mozambique, Natal, Zimbabwe, Nord du Botswana, Namibie, Est à Sud du Zaïre
Graphium (Arisbe) porthaon tanganyikae Kielland, 1978	tanganyikae Kielland, 1978 = Arisbe porthaon tanganyikae			Tanzanie
	Groupe des colonna			
Graphium (Arisbe) colonna (Ward, 1873)	colonna (Ward, 1873) Pnc: Artabotrys monteiroae, Uvaria caffra, Annona = Papilio colonna = Papilio tragicus = Papilio colonna loncona = Arisbe colonna		peu commun	Liberia, Sierra Leone, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Soudan, Sud-ouest de l’Ethiopie, Sud de la Somalie, Ouganda, Côte du Kenya, Cameroun, Tanzanie, Mozambique, Est du Zimbabwe, Zululand, Swaziland Afrique du Sud
	Groupe des illyris			
Graphium (Arisbe) gudenusi (Rebel, 1911)	gudenusi (Rebel, 1911) = Papilio gudenusi = Papilio babaulti = Arisbe gudenusi		rare et localisé	Kivu République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sud-ouest de l’Ouganda
Graphium (Arisbe) illyris flavisparsus (Fruhstorfer, 1903)	illyris flavisparsus (Fruhstorfer, 1903) = Papilio illyris flavisparsus = Arisbe illyris flavisparsus		rare	Fernando Po, Bioko Guinée équatoriale
Graphium (Arisbe) illyris girardeaui Guilbot & Plantrou, 1978	girardeaui Guilbot & Plantrou, 1978 = Arisbe illyris girardeaui			République centrafricaine
Graphium (Arisbe) illyris hamatus (Joicey & Talbot, 1918)	hamatus (Joicey & Talbot, 1918) = Papilio illyris hamatus = Arisbe illyris hamatus			Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo, Tanzanie
Graphium (Arisbe) illyris illyris (Hewitson, 1872)	illyris (Hewitson, 1872) = Papilio illyris = Arisbe illyris = Papilio illyris f. stictica = Papilio illyris ab. addenda = Cosmodesmus illyris ab. addenda = Arisbe illyris illyris		pas rare	Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Centre du Ghana
Graphium (Arisbe) kirbyi (Hewitson, 1872)	kirbyi (Hewitson, 1872) Pnc: Annona senegalensis = Papilio kirbyi = Papilio kirbyi var. ottonis = Arisbe kirbyi			Côte de la Tanzanie, Kenya
	Groupe des angolanus			
Graphium (Arisbe) angolanus angolanus (Goeze, 1779)	angolanus angolanus (Goeze, 1779) Pnc: Annona senegalensis, Spheclamnocarpu s pruriens, Uvaria , Landolphia buchanani, L. ugandensis = Papilio angolanus = Graphium pylades = Arisbe angolanus = Papilio pylades lapydes = Graphium angolanus howelli = Papilio anthemenes = Papilio corineus = Papilio pylades angolanus ab. kitungulua = Papilio pylades-angolanus ab. hypochroa = Papilio angolanus ab. spoliatus = Papilio pylades angolanus ab. dawanti = Cosmodesmus pylades angolanus ab. dawanti = Papilio pylades angolanus ab. wansoni = Cosmodesmus pylades angolanus ab. wansoni = Papilio pylades angolanus ab. jotrandi = Cosmodesmus pylades angolanus ab. jotrandi = Papilio pylades angolanus ab. deficiens = Cosmodesmus pylades angolanus ab. deficiens = Papilio pylades angolanus ab. blariauxi = Cosmodesmus pylades angolanus ab. blariauxi = Papilio pylades angolanus ab. addenda = Cosmodesmus pylades angolanus ab. addenda = Graphium angolanus howelli f. jozani = Papilio corineus = Arisbe angolanus angolanus		commun	Angola, Sud de la République démocratique du Congo, Côte du Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, Nord du Botswana, Nord de la Namibie, Transvaal, Natal, Swaziland Afrique du Sud, Comores
Graphium (Arisbe) angolanus baronis (Ungemach, 1932)	baronis (Ungemach, 1932) = Papilio angolanus pylades = Papilio pylades = Graphium calabar = Papilio pylades pylades ab. houzeau = Cosmodesmus pylades pylades ab. houzeau = Graphium angolanus pylades = Arisbe angolanus baronis			Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Niger, Nigeria, SãoTomé-et-Principe, Cameroun, République du Congo, République centrafricaine, Oubangui, Mongala, Uele, Ituri Nord de la République démocratique du Congo, Tchad, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Ouest du Kenya, Tanzanie
Graphium (Arisbe) endochus (Boisduval, 1836)	endochus (Boisduval, 1836) = Papilio endochus = Arisbe endochus		commun	Madagascar
Graphium (Arisbe) morania (Angas, 1849)	morania (Angas, 1849) Pnc: Uvaria caffra, Artabotrys brachypetalus, A. monteiroae, Annona senegalensis, Hexalobus monopetalus = Papilio morania = Graphium morania f. vansonia = Graphium morania var. holoplaga = Arisbe morania		commun et localisé	Natal, Zululand, Swaziland, Transvaal Afrique du Sud, Sud du Mozambique, Sud-est du Zimbabwe, Est du Botswana

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
<i>Graphium (Arisbe) ridleyanus</i> (White, 1843)	<i>ridleyanus</i> = <i>Papilio ridleyanus</i> = <i>Papilio ridleyanus</i> ab. <i>infuscatus</i> = <i>Papilio ridleyanus</i> var. <i>fumatus</i> = <i>Papilio ridleyanus</i> var. <i>fumosus</i> = <i>Papilio ridleyanus</i> f. <i>rosa</i> = <i>Papilio ridleyanus</i> njami = <i>Papilio ridleyanus</i> ab. <i>semivitreus</i> = <i>Papilio ridleyanus</i> ab. <i>hecqueti</i> = <i>Cosmodesmus ridleyanus</i> ab. <i>hecqueti</i> = <i>Arisbe ridleyanus</i>	(White, 1843)	Pnc: <i>Popowia congoensis</i>	Commun. Copie un <i>Acraea</i>	Est du Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, Angola, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Tchad, Sud du Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Ouest de la Tanzanie, Zambie
<i>Graphium (Arisbe) schaffgotschi</i> (Niepelt, 1927)	<i>schaffgotschi</i> = <i>Papilio schaffgotschi</i> = <i>Graphium taboranus</i> <i>schaffgotschi</i> = <i>Arisbe schaffgotschi</i>	(Niepelt, 1927)			Namibie, Angola, Sud de la République démocratique du Congo, Nord-ouest de la Zambie
<i>Graphium (Arisbe) taboranus</i> (Oberthür, 1886)	<i>taboranus</i> = <i>Papilio taboranus</i> = <i>Papilio nivinox</i> = <i>Arisbe taboranus</i> = <i>Graphium taboranus</i> <i>taboranus</i>	(Oberthür, 1886)	Pnc: <i>Annona</i>	pas rare	Angola, Shaba République démocratique du Congo, Tabora Tanzanie, Malawi, Nord de la Zambie
	Groupe des <i>leonidas</i>				
<i>Graphium (Arisbe) cyrnus</i> (Boisduval, 1936)	<i>cyrnus</i> = <i>Papilio cyrnus</i> = <i>Graphium cyrnus</i> <i>nuscyrus</i> = <i>Papilio cyrnus</i> <i>nuscyrus</i> = <i>Graphium cyrnus</i> f. <i>similis</i> = <i>Graphium cyrnus</i> f. <i>adlecta</i> = <i>Arisbe cyrnus</i> = <i>Arisbe cyrnus</i> <i>nuscyrus</i>	(Boisduval, 1936)		commun	Madagascar
<i>Graphium (Arisbe) leonidas leonidas</i> (Fabricius, 1793)	<i>leonidas leonidas</i> = <i>Papilio leonidas</i> = <i>Arisbe leonidas</i> = <i>Papilio similis</i> = <i>Papilio brasidas</i> = <i>Papilio leonidas</i> <i>anthemenes</i> = <i>Papilio leonidas</i> ab. <i>interniplaga</i> = <i>Papilio onidale</i> = <i>Papilio similis</i> <i>umanus</i> = <i>Papilio leonidas leonidas</i> f. <i>plagifera</i> = <i>Papilio leonidas brasidas</i> f. <i>melusina</i> = <i>Papilio leonidas</i> f. <i>petiveranoides</i> = <i>Papilio leonidas leonidas</i> ab. <i>obliterata</i> = <i>Cosmodesmus leonidas leonidas</i> ab. <i>obliterata</i> = <i>Papilio leonidas leonidas</i> ab. <i>subobliterata</i> = <i>Cosmodesmus leonidas leonidas</i> ab. <i>subobliterata</i> = <i>Papilio leonidas leonidas</i> ab. <i>vreuricki</i> = <i>Cosmodesmus leonidas leonidas</i> ab. <i>vreuricki</i> = <i>Papilio leonidas leonidas</i> ab. <i>mathieui</i> = <i>Cosmodesmus leonidas leonidas</i> ab. <i>mathieui</i> = <i>Graphium leonidas leonidas</i> ab. <i>vrydaghi</i> = <i>Graphium leonidas leonidas</i> ab. <i>leucosina</i> = <i>Graphium leonidas leonidas</i> ab. <i>djema</i> = <i>Graphium leonidas</i> ab. <i>cymoides</i> = <i>Arisbe leonidas leonidas</i>	(Fabricius, 1793)	Pnc: <i>Popowia caffra</i> , <i>Annona senegalensis</i> , <i>Monanthotaxis caffra</i> , <i>Uvaria leptocladen</i> , <i>U. caffra</i> , <i>U. kirkii</i> , <i>U. acuminata</i> , <i>Landolphia ugandensis</i> , <i>L. buchannani</i> , <i>Annickia chlorantha</i> , <i>Friesodielsia obovata</i> , <i>Artabotrys cinerea</i> , <i>A. brachypetalus</i>	commun	Afrique (au sud du Sahara)
<i>Graphium (Arisbe) leonidas guilboti</i> (Fabricius, 1793)	<i>guilboti</i> (Fabricius, 1793)				Fernando Po, Bioko Guinée équatoriale
<i>Graphium (Arisbe) leonidas pelopidas</i> (Oberthür, 1879)	<i>pelopidas</i> = <i>Papilio leonidas</i> var. <i>pelopidas</i> = <i>Graphium leonidas</i> <i>zanzibarcus</i> = <i>Arisbe leonidas pelopidas</i>	(Oberthür, 1879)	Pnc: <i>Popowia caffra</i> , <i>Annona senegalensis</i> , <i>Monanthotaxis caffra</i> , <i>Landolphia ugandensis</i> , <i>L. buchannani</i> , <i>Annickia chlorantha</i> .		Île Pemba, Île Zanzibar Tanzanie
<i>Graphium (Arisbe) leonidas santamarthae</i> (Joicey & Talbot, 1927)	<i>santamarthae</i> = <i>Papilio leonidas</i> <i>santa-marthae</i> = <i>Arisbe leonidas santamarthae</i>	(Joicey & Talbot, 1927)			Île Principe São Tomé-et-Principe
<i>Graphium (Arisbe) leonidas thomasius</i> (Le Cerf, 1924)	<i>thomasius</i> = <i>Papilio leonidas thomasius</i> = <i>Arisbe leonidas thomasius</i>	(Le Cerf, 1924)			Île São Tomé São Tomé-et-Principe
<i>Graphium (Arisbe) levassori</i> (Oberthür, 1890)	<i>levassori</i> = <i>Papilio levassori</i> = <i>Arisbe levassori</i>	(Oberthür, 1890)		extrêmement rare	Grand Comore Îles Comores
	Groupe des <i>tynderaeus</i>				
<i>Graphium (Arisbe) latreillianus latreillianus</i> (Godart, 1819)	<i>latreillianus latreillianus</i> = <i>Papilio latreillianus</i> = <i>Arisbe latreillianus</i> = <i>Arisbe latreillianus</i> <i>latreillianus</i>	(Godart, 1819)		commun	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana
<i>Graphium (Arisbe) latreillianus theorini</i> (Aurivillius, 1881)	<i>theorini</i> = <i>Papilio latreillianus</i> var. <i>theorini</i> = <i>Papilio potamonianus</i> = <i>Papilio latreillianus</i> <i>theorini</i> ab. <i>infrapicta</i> = <i>Papilio aurivillianus</i> = <i>Graphium tynderaeus</i> <i>theorini</i> f. <i>xerophila</i> = <i>Papilio latreillianus</i> <i>theorini</i> ab. <i>lutea</i> = <i>Arisbe latreillianus theorini</i>	(Aurivillius, 1881)			Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Angola, Tchad, Ouest de l'Ouganda, Tanzanie
<i>Graphium (Arisbe) tynderaeus</i> (Fabricius, 1793)	<i>tynderaeus</i> = <i>Papilio tynderaeus</i> = <i>Papilio nausinous</i> = <i>Papilio tynderaeus</i> avr. <i>ochrea</i> = <i>Papilio tynderaeus</i> ab. <i>fraudatus</i> = <i>Papilio tynderaeus</i> ab. <i>incompleta</i> = <i>Graphium tynderaeus</i> ab. <i>confluens</i> = <i>Graphium tynderaeus</i> = <i>Arisbe tynderaeus</i>	(Fabricius, 1793)		pas rare	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, Angola, République centrafricaine, Ituri Forest, Nord de Shaba République démocratique du Congo, Ouest de la Tanzanie
	Groupe des <i>philonoe</i>				
<i>Graphium (Arisbe) philonoe philonoe</i> (Ward, 1873)	<i>philonoe philonoe</i> = <i>Papilio philonoe</i> = <i>Arisbe philonoe</i> = <i>Papilio philonoe</i> f. <i>dulcinea</i> = <i>Arisbe philonoe philonoe</i>	(Ward, 1873)	Pnc: <i>Uvaria leptocladen</i> , <i>U. chamae</i> , <i>Annona</i>	commun	Côte de la République démocratique du Congo à Kenya, Est de la Tanzanie, Malawi, Mozambique
<i>Graphium (Arisbe) philonoe whalleyi</i> (Talbot, 1929)	<i>whalleyi</i> = <i>Papilio philonoe whalleyi</i> = <i>Arisbe philonoe whalleyi</i>	(Talbot, 1929)			Riverine Forest Sud du Soudan, Sud-ouest de l'Ethiopie, Nord de l'Ouganda, Nord-ouest du Kenya
	Groupe des <i>adamastor</i>				
<i>Graphium (Arisbe) abri</i> Smith & Vane-Wright, 2001	<i>abri</i> = <i>Arisbe abri</i>	Smith & Vane-Wright, 2001			Zongo, Bangui République centrafricaine
<i>Graphium (Arisbe) adamastor</i> (Boisduval, 1836)	<i>adamastor</i> = <i>Papilio adamastor</i> = <i>Papilio charcedonius</i> ab. <i>guineensis</i> = <i>Cosmodesmus charcedonius</i> ab. <i>guineensis</i> = <i>Papilio charcedonius</i> ab. <i>houzeaudi</i> = <i>Cosmodesmus charcedonius</i> ab. <i>houzeaudi</i> = <i>Graphium adamastor</i> <i>dimbroko</i> = <i>Graphium adamastor</i> <i>zongo</i> = <i>Graphium adamastor</i> <i>adamastor</i> = <i>Arisbe adamastor</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Annonaceae</i>	peu commun	Guinée, Sierra Leone, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République du Congo, République centrafricaine, Ubangi, Mongala République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) agamedes</i> (Westwood, 1842)	<i>agamedes</i> = <i>Papilio agamedes</i> = <i>Papilio agamedes</i> <i>medesaga</i> = <i>Arisbe agamedes</i>	(Westwood, 1842)		rare et localisé.	Côte d'Ivoire, Ghana , Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Mogala, Uele République démocratique du Congo, République centrafricaine
<i>Graphium (Arisbe) almansor almansor</i> Honrath, 1884	<i>almansor almansor</i> = <i>Papilio almansor</i> = <i>Arisbe almansor</i> = <i>Graphium almansor almansor</i> f. <i>albescens</i> = <i>Graphium almansor almansor</i> f. <i>depuncta</i> = <i>Arisbe almansor almansor</i>	Honrath, 1884	Pnc: <i>Pseudospondias microcarpa</i>		Angola, Lualaba, Lomani, Kasai, Sankuru Tanganika, République démocratique du Congo, Nord de la Namibie
<i>Graphium (Arisbe) almansor birbiri</i> (Ungemach, 1932)	<i>birbiri</i> = <i>Papilio charcedonius birbiri</i> = <i>Arisbe almansor birbiri</i>	(Ungemach, 1932)			Sud-ouest de l'Ethiopie
<i>Graphium (Arisbe) almansor carchedonius</i> (Karsch, 1895)	<i>carchedonius</i> = <i>Papilio carchedonius</i> = <i>Arisbe almansor carchedonius</i>	(Karsch, 1895)			Guinée, Ghana, Togo, République centrafricaine
<i>Graphium (Arisbe) almansor escherichi</i> (Gaede, 1915)	<i>escherichi</i> = <i>Papilio escherichi</i> = <i>Graphium almansor snowi</i> = <i>Arisbe almansor escherichi</i>	(Gaede, 1915)			Est du Nigeria, Cameroun, République du Congo, République centrafricaine, Mongala, Uele République démocratique du Congo, Sud du Soudan, Ouganda

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018		
<i>Graphium (Arisbe) almansor uganda</i> (Lathy, 1906)	uganda = <i>Papilio uganda</i> = <i>Papilio graueri</i> = <i>Arisbe almansor uganda</i> (Lathy, 1906)	Rare et localisé. Mime de <i>Amauris niavius</i> et <i>Amauris tartarea</i>	Kivu République démocratique du Congo, Ouganda, Sud-ouest du Kenya, Nord-ouest de la Tanzanie, Rwanda?, Burundi?
<i>Graphium (Arisbe) auriger</i> (Butler, 1876)	auriger = <i>Papilio auriger</i> = <i>Papilio harpagon</i> = <i>Arisbe auriger</i> (Butler, 1876)	pas rare	Sénégal, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) aurivilliusi</i> (Seeldrayers, 1896)	aurivilliusi = <i>Papilio aurivilliusi</i> = <i>Graphium auriger aurivilliusi</i> = <i>Arisbe aurivilliusi</i> (Seeldrayers, 1896)		République démocratique du Congo, République du Congo?
<i>Graphium (Arisbe) deliae</i> Libert & Collins, 2007	deliae = <i>Arisbe deliae</i> Libert & Collins, 2007		Forêt de Chiwoma et de Mavunda, Sud de Mawinilunga, Nord-ouest de la Zambie
<i>Graphium (Arisbe) fulleri bouletti</i> (Le Cerf, 1912)	fulleri bouletti = <i>Papilio bouletti</i> = <i>Graphium ucelegonides beloni</i> = <i>Papilio weberi</i> = <i>Arisbe fulleri bouletti</i> (Le Cerf, 1912)		Sud du Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Nord de la République du Congo, Est de la République centrafricaine
<i>Graphium (Arisbe) fulleri fulleri</i> (Grose-Smith, 1883)	fulleri = <i>Papilio fulleri</i> = <i>Papilio bouletti</i> var. <i>transiens</i> = <i>Graphium ucelegonides ucelegonides f. gabrieli</i> = <i>Papilio foersterius</i> = <i>Papilio sanganus</i> = <i>Papilio sanganoïdes</i> = <i>Papilio sanganoïdes ab. divisimacula</i> = <i>Papilio stetteni</i> = <i>Arisbe fulleri</i> = <i>Arisbe fulleri fulleri</i> (Grose-Smith, 1883)	p.é.f. de <i>ucelegonides</i>	Nord-ouest du Cameroun, République du Congo
<i>Graphium (Arisbe) hachei hachei</i> (Dewitz, 1881)	hachei hachei = <i>Papilio hachei</i> = <i>Arisbe hachei</i> = <i>Graphium hachei-möbii camerunicus</i> = <i>Arisbe hachei hachei</i> (Dewitz, 1881)	rare	Sud du Cameroun, Gabon, République du Congo, Angola, Ouest de la République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) hachei moebii</i> (Suffert, 1904)	moebii = <i>Papilio moebii</i> = <i>Papilio martensi</i> = <i>Cosmodesmus martensi</i> = <i>Graphium mobii</i> = <i>Arisbe hachei moebii</i> (Suffert, 1904)		Sud du Cameroun, République du Congo, Nord de la République démocratique du Congo, République centrafricaine
<i>Graphium (Arisbe) kigoma</i> Carcasson, 1964	kigoma = <i>Graphium almansor kigoma</i> = <i>Graphium poggianus kigoma</i> = <i>Arisbe almansor kigoma</i> = <i>Graphium almansor wranghami</i> = <i>Arisbe kigoma</i> Carcasson, 1964		Kigoma, Ouest de la Tanzanie
<i>Graphium (Arisbe) olbrechtsi olbrechtsi</i> Berger, 1950	olbrechtsi olbrechtsi = <i>Arisbe olbrechtsi</i> = <i>Arisbe olbrechtsi olbrechtsi</i> Berger, 1950		Shaba, Kasai, République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) olbrechtsi tongoni</i> Berger, 1969	tongoni = <i>Arisbe olbrechtsi tongoni</i> Berger, 1969		Maniema, Est de la République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) poggianus</i> (Honrath, 1884)	poggianus = <i>Papilio poggianus</i> = <i>Arisbe poggianus</i> (Honrath, 1884)	peu commun	Nord de l'Angola, Sud de la République démocratique du Congo, Nord-ouest de la Zambie
<i>Graphium (Arisbe) rileyi</i> Berger, 1950	rileyi = <i>Graphium ucelegonides rileyi</i> = <i>Graphium fulleri rileyi</i> = <i>Arisbe rileyi</i> Berger, 1950		Côte d'Ivoire, Centre du Ghana
<i>Graphium (Arisbe) schubotzi schubotzi</i> (Schultze, 1913)	schubotzi schubotzi = <i>Papilio odin</i> var. <i>schubotzi</i> = <i>Papilio odin</i> = <i>Papilio odin eyeni</i> = <i>Graphium auriger eyeni</i> = <i>Papilio schoubotzi</i> = <i>Graphium odin</i> = <i>Graphium odin odin</i> = <i>Graphium odin eyeni</i> = <i>Graphium odin schoubotzi</i> = <i>Graphium auriger schubotzi</i> = <i>Arisbe auriger schubotzi</i> (Schultze, 1913)		Est du Cameroun, République Congo, République centrafricaine, Mongala, République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) schubotzi maculata</i> Libert, 2007	maculata Libert, 2007		Cameroun
<i>Graphium (Arisbe) simoni</i> (Aurivillius, 1898)	simoni = <i>Papilio ucalegon</i> var. <i>simoni</i> = <i>Arisbe simoni</i> (Aurivillius, 1898)	peu commun	Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo, République centrafricaine
<i>Graphium (Arisbe) ucalegon fonteinei</i> Berger, 1981	ucalegon fonteinei = <i>Graphium ucalegon schoutedeni f. fonteinei</i> = <i>Arisbe ucalegon fonteinei</i> Berger, 1981		Sankuri, Kanida, Lomami, Lualaba, République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) ucalegon schoutedeni</i> Berger, 1950	schoutedeni = <i>Arisbe ucalegon schoutedeni</i> Berger, 1950		Est de la République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Graphium (Arisbe) ucalegon ucalegon</i> (Hewitson, 1865)	ucalegon = <i>Papilio ucalegon</i> = <i>Arisbe ucalegon</i> = <i>Papilio ucelegon legonuca</i> = <i>Papilio ucalegon ab. superfluosa</i> = <i>Papilio ucalegon ab. addenda</i> = <i>Arisbe ucalegon ucalegon</i> (Hewitson, 1865)	pas rare	Ouest du Nigeria, Cameroun, Île de Bioko, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, Nord-ouest de l'Angola, République centrafricaine, Mayumbe, République démocratique du Congo
<i>Graphium (Arisbe) ucalegonides</i> (Staudinger, 1884)	ucalegonides = <i>Papilio ucalegonides</i> = <i>Graphium fulleri ucalegonides</i> = <i>Papilio phrynon</i> = <i>Papilio ucalegonides ab. cuvelieri</i> = <i>Cosmodesmus ucalegonides ab. cuvelieri</i> = <i>Graphium ucalegonides ucalegonides f. addenda</i> = <i>Graphium ucalegonides ucalegonides</i> = <i>Arisbe ucalegonides</i> (Staudinger, 1884)	pas rare	Sud-est du Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, Nord de l'Angola, République démocratique du Congo, Tchad
	Sous-genre : Pathysa		
	Groupe des antiphates		
<i>Graphium (Pathysa) agetes agetes</i> (Westwood, 1843)	agetes agetes = <i>Papilio agetes</i> = <i>Pathysa agetes</i> = <i>Pathysa agetes agetes</i> = <i>Papilio agetes tenuilineatus</i> = <i>Papilio agetes iponus</i> (Westwood, 1843)	commun	Sikkim, Inde, Myanmar, Thaïlande, Laos, Xom-Gom, Sud Annam, Vietnam, Ouest de la Malaisie, Hainan, Sud du Yunnan, Chine
<i>Graphium (Pathysa) agetes chinensis</i> (Chou & Li, 1994)	chinensis = <i>Pathysa agetes chinensis</i> (Chou & Li, 1994)		Mt. Dawei, Pingbian, Yunnan, Chine
<i>Graphium (Pathysa) agetes insularis</i> (Staudinger, 1895)	insularis = <i>Papilio agetes</i> var. <i>insularis</i> = <i>Papilio agetes insularis</i> = <i>Pathysa agetes insularis</i> (Staudinger, 1895)		Sumatra, Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) agetes kinabalensis</i> Tetens & Fruhstorfer, 1902	kinabalensis = <i>Pathysa agetes kinabalensis</i> Tetens & Fruhstorfer, 1902		Mont Kinabalu, Nord de Bornéo, Malaisie
<i>Graphium (Pathysa) androcles androcles</i> (Boisduval, 1836)	androcles androcles = <i>Papilio androcles</i> = <i>Papilio androcles latilinea</i> = <i>Pathysa androcles</i> (Boisduval, 1836)	commun	Sulawesi, Buton, Kabaena Island, Îles Sula, Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) androcles cleomenes</i> (Fruhstorfer, 1911)	cleomenes = <i>Papilio androcles cleomenes</i> = <i>Pathysa androcles cleomenes</i> (Fruhstorfer, 1911)		Sanana, Îles Sula, Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) androcles pelengensis</i> Detani, 1983	pelengensis Detani, 1983		Peleng, Îles Banggai, Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates albescens</i> Chou, Yuan & Wang, 2000	antiphates albescens = <i>Pathysa antiphates albescens</i> Chou, Yuan & Wang, 2000		Quanzhou, Fujian, Chine
<i>Graphium (Pathysa) antiphates alcibiades</i> (Fabricius, 1787)	alcibiades = <i>Papilio alcibiades</i> = <i>Papilio antiphates javanicus</i> = <i>Papilio antiphates alcibiades</i> = <i>Pathysa antiphates alcibiades</i> (Fabricius, 1787)		Java, Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
<i>Graphium (Pathysa) antiphates antiphates</i> (Cramer, 1775)	<i>antiphates</i> = <i>Papilio antiphates</i> = <i>Pathysa antiphates</i> = <i>Pathysa antiphates antiphates</i>	(Cramer, 1775)	Pnc: <i>Desmos cochinchinensis</i> , <i>Uvaria microcarpa</i> , <i>Annona</i> , <i>Goniothalamus</i> , <i>Milusa</i> , <i>Xylopia</i> , <i>Michelia</i>	commun	Vietnam, Sud-est de la Chine
<i>Graphium (Pathysa) antiphates antiphonus</i> (Fruhstorfer, 1902)	<i>antiphonus</i> = <i>Papilio antiphates antiphonus</i> = <i>Graphium antiphates antiphonus</i> = <i>Pathysa antiphates antiphonus</i>	(Fruhstorfer, 1902)			Nias Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates balius</i> Jordan,	<i>balius</i> = <i>Pathysa antiphates balius</i>	Jordan, 1909			Bali Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates ceylonicus</i> (Eimer, 1889)	<i>ceylonicus</i> = <i>Papilio antiphates ceylonicus</i> = <i>Papilio antiphates alcibiades</i> ab. <i>ceylonicus</i> = <i>Pathysa antiphates ceylonicus</i>	(Eimer, 1889)			Sri Lanka
<i>Graphium (Pathysa) antiphates kalaensis</i> Rothschild, 1896	<i>kalaensis</i> = <i>Pathysa antiphates kalaensis</i>	Rothschild, 1896			Tanahdjampea, Kalao, Sumbawa, Flores, Lombok, Alor Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates kurosawai</i> Igarashi, 1979	<i>kurosawai</i> Igarashi, 1979				Centre et Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates naira</i> Moore,	<i>naira</i> = <i>Pathysa antiphates naira</i>	Moore, 1903			Sud de l'Inde
<i>Graphium (Pathysa) antiphates paetus</i> Fruhstorfer, 1907	<i>paetus</i>	Fruhstorfer, 1907			Borneo Malaisie et Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates pompilius</i> (Fabricius, 1787)	<i>pompilius</i> = <i>Papilio pompilius</i> = <i>Papilio antiphates continentalis</i> = <i>Papilio antiphates itamputi</i> ab. <i>leucania</i> = <i>Papilio nebulosus</i> = <i>Papilio antiphates paetus</i> = <i>Papilio itamputi</i> = <i>Graphium antiphates itamputi</i> = <i>Papilio antiphates alcibiades</i> ab. <i>itamputi</i> = <i>Pathysa antiphates itamputi</i> = <i>Papilio antiphates linga</i> = <i>Papilio antiphates alcibiades</i> ab. <i>nebulosus</i> = <i>Papilio antiphates alcibiades</i> ab. <i>continentalis</i> = <i>Pathysa antiphates pompilius</i>	(Fabricius, 1787)			Népal, Sikkim, Bengale, Darjeeling Nord de l'Inde, Myanmar, Nord de la Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Langkawi island, Pénninsule malaise Malaisie, Singapour, Sumatra, Borneo, Natuna, Banggi Indonésie, Hainan, Sud du Yunnan Chine
<i>Graphium (Pathysa) antiphates pulauensis</i> (Eliot, 1983)	<i>pulauensis</i> = <i>Pathysa antiphates pulauensis</i> = <i>Pathysa antiphates insularis</i> = <i>Graphium antiphates tiomanus</i>	(Eliot, 1983)			Pulau Tioman Malaisie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates rhabdotus</i> Jordan, 1937	<i>rhabdotus</i> Jordan, 1937				Sipora Îles Mentawai Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates simpulensis</i> Abang & Page, 2006	<i>simpulensis</i> Abang & Page, 2006				Balambangan Malaisie
<i>Graphium (Pathysa) antiphates sinambugensis</i> Abang & Page, 2006	<i>sinambugensis</i> Abang & Page, 2006				Bukit Sinambung, Nord de Banggi Malaisie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus anticrates</i> (Doubleday, 1846)	<i>aristeus anticrates</i> = <i>Papilio anticrates</i> = <i>Papilio aristeus anticrates</i> = <i>Pathysa aristeus anticrates</i>	(Doubleday, 1846)			Sikkim, Assam Nord de l'Inde, Bangladesh, Népal
<i>Graphium (Pathysa) aristeus aristeus</i> (Stoll, 1780)]	<i>aristeus</i> = <i>Papilio aristeus</i> = <i>Papilio timocrates</i> = <i>Pathysa aristeus</i> = <i>Pathysa aristea</i> = <i>Ariste aristeus</i>	(Stoll, 1780)]	Pnc: <i>Milusa brahei</i> , <i>M. traceyi</i> , <i>Polyalthia nilidissima</i> , <i>Mitrephora froggattii</i>	commun	Buru, Bachan, Halmahera, Ambon, Serang, Île Kangean Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus arstinus</i> (Fruhstorfer, 1902)	<i>aristinus</i> = <i>Papilio aristeus arstinus</i>	(Fruhstorfer, 1902)			Kalao Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus erebos</i> Tsukada & Nishiyama, 1989	<i>erebos</i> Tsukada & Nishiyama, 1989				Sumbawa Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus hainanensis</i> (Chou & Gu, 1994)	<i>hainanensis</i> = <i>Pathysa aristea hainanensis</i>	(Chou & Gu, 1994)			Jianfengling Hainan Chine
<i>Graphium (Pathysa) aristeus hermocrates</i> (C. & R. Felder, [1865])	<i>hermocrates</i> = <i>Papilio hermocrates</i> = <i>Papilio aristeus</i> var. <i>nigricans</i> = <i>Papilio aristoides</i> = <i>Papilio aristeus pedo</i> = <i>Papilio aristeus hermocrates</i> ab. <i>aristeoides</i> = <i>Papilio aristeus hermocrates</i> ab. <i>nigricans</i> = <i>Papilio aristeus hermocrates</i> = <i>Pathysa aristeus hermocrates</i> = <i>Ariste aristeus hermocrates</i> = <i>Pathysa aristea hainanensis</i>	(C. & R. Felder, [1865])			Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, Langkawi island, Pénninsule malaise Malaisie, Borneo, Java, Timor, Wetar, DamarIndonésie, Balabac, Basilan, Bohol, Bongao, Busuanga, Cebu, Dinagar, Dumaran, Leyte, Luzon, Marinduque, Masbate, Mindanao, Mindoro, Negros, Palawan, Panaon, Panay, Samr, Sibuyan, Siquijor, Tawitawi Philippines, Hainan, Sud-est de la Chine
<i>Graphium (Pathysa) aristeus palasarinus</i> Kalis, 1941	<i>palasarinus</i> Kalis, 1941				Bali Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus parmatinus</i> (Fruhstorfer, 1907)	<i>parmatinus</i> = <i>Papilio aristeus parmatinus</i>	(Fruhstorfer, 1907)			Waigeu Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus parmatus</i> (Gray, [1853])	<i>parmatus</i> = <i>Papilio parmatus</i> = <i>Papilio parmatus guineensis</i> = <i>Papilio aristeus parmatus</i> = <i>Papilio pherecrates</i> = <i>Papilio timocrates</i> = <i>Papilio aristeus parmatinus</i>	(Gray, [1853])			Anu, Salawati Moutain Salawati, Wardo Biak, Waigeu, Akimuga (Kampong Baru & Fafafuku), Beaufortbivak, Dabra (Mamberamo), East Tami, Homasam (Kobakma), Kobakma, Kapi River (Timika), Kuala Kencana (Timika), Lerah, Miei, Nagramoria, Samabusa (Nabire), Sabang, Samri, Sorong, Tanah Merah, Ubrub (Keerom), Van Weels Camp, Web (Keerom), Wendesi, Werba (Fakfak) Nouvelle Guinée Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nord du Queensland Australie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus paron</i> (Godman & Salvin, 1879)	<i>paron</i> = <i>Papilio paron</i>	(Godman & Salvin, 1879)			Nouvelle Bretagne, Nouvelle Irlande, Manus Îles de l'Amirauté Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium (Pathysa) aristeus pedo</i> (Fruhstorfer, 1907)	<i>pedo</i> = <i>Papilio aristeus pedo</i>	(Fruhstorfer, 1907)			Sumba Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) aristeus puella</i> Tsukada & Nishiyama, 1980	<i>puella</i> Tsukada & Nishiyama, 1980				Sumatra Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) decolor atratus</i> (Rothschild, 1895)	<i>decolor atratus</i> = <i>Papilio antiphates euphrates</i> ab. <i>loc. atratus</i> = <i>Pathysa euphrates atratus</i> = <i>Pathysa decolor atratus</i> = <i>Ariste decolor atratus</i>	(Rothschild, 1895)			Mindoro Philippines
<i>Graphium (Pathysa) decolor decolor</i> (Staudinger, 1888)	<i>decolor</i> = <i>Papilio antiphates</i> var. <i>decolor</i> = <i>Papilio antiphates palawanicus</i> = <i>Papilio antiphates decolor</i> = <i>Pathysa euphrates decolor</i> = <i>Graphium euphrates decolor</i> = <i>Pathysa decolor decolor</i> = <i>Ariste decolor decolor</i>	(Staudinger, 1888)		assez rare et localisé	Balabac, Calamian, Palawan, Sibutu, Tawi-tawi Philippines
<i>Graphium (Pathysa) decolor jamesi</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>jamesi</i> = <i>Ariste decolor jamesi</i> = <i>Pathysa decolor jamesi</i>	(Page & Treadaway, 2003)			Cavan Cavan, Sibutu, Sanga Sanga Philippines
<i>Graphium (Pathysa) decolor neozebraica</i> Page, 1987	<i>neozebraica</i> = <i>Pathysa decolor neozebraica</i> = <i>Ariste decolor neozebraica</i>	Page, 1987			Bohol, Leyte, Nord de Luzon, Marinduque, Masbate, Negros, Panaon, Panay, Polillo, Samar, Siquijor, Ticao Philippines
<i>Graphium (Pathysa) decolor rebecca</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>rebecca</i> = <i>Ariste decolor rebecca</i> = <i>Pathysa decolor rebecca</i>	(Page & Treadaway, 2003)			Babuyanes, Camiguin de Luzon Philippines
<i>Graphium (Pathysa) decolor sibuyana</i> Page, 1987	<i>sibuyana</i> = <i>Pathysa decolor sibuyana</i> = <i>Ariste decolor sibuyana</i>	Page, 1987			Romblon, Mt. Sibuyan, Sibuyan islands Philippines
<i>Graphium (Pathysa) decolor tigris</i> (Semper, 1892)	<i>tigris</i> = <i>Papilio antiphates f. tigris</i> = <i>Papilio antiphates decolor</i> ab. <i>tigris</i> = <i>Pathysa decolor tigris</i> = <i>Ariste decolor tigris</i>	(Semper, 1892)			Dinagat, Est de Mindanao Philippines
<i>Graphium (Pathysa) dorcus dorcus</i> (de Haan, 1840)	<i>dorcus dorcus</i> = <i>Papilio dorcus</i> = <i>Pathysa dorcus</i> = <i>Graphium dorcus</i>	(de Haan, 1840)		rare et localisé	Doluduo Nord du Sulawesi Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Graphium (Pathysa) dorcus butungensis</i> Hanafusa, 1997	<i>butungensis</i>	Hanafusa, 1997		Buton, Kabaena island Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) dorcus ventus</i> Tsukada & Nishiyama, 1980	<i>ventus</i>	Tsukada & Nishiyama, 1980		Palopo centre du Sulawesi Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) epaminondas</i> (Oberthür, 1879)	<i>epaminondas</i> = <i>Papilio epaminondas</i> = <i>Graphium antiphates epaminondas</i> = <i>Papilio laestrygonum</i> = <i>Pathysa epaminondas</i>	(Oberthür, 1879)	Protégé	Andaman Islands Inde
<i>Graphium (Pathysa) euphrates bohollensis</i> Page, 1987	<i>euphrates bohollensis</i> = <i>Pathysa euphrates bohollensis</i> = <i>Arise euphrates bohollensis</i>	Page, 1987		Bilar, Bohol Philippines
<i>Graphium (Pathysa) euphrates buhisanus</i> Page, 1987	<i>buhisanus</i> = <i>Pathysa euphrates buhisanus</i> = <i>Arise euphrates buhisanus</i>	Page, 1987		Buhisan, Cebu Philippines
<i>Graphium (Pathysa) euphrates cuyoensis</i> Medicielo & Hanafusa, 1994	<i>cuyoensis</i>	Medicielo & Hanafusa, 1994		Cuyo Philippines
<i>Graphium (Pathysa) euphrates domaranus</i> (Fruhstorfer, 1903)	<i>domaranus</i> = <i>Papilio domaranus</i> = <i>Pathysa euphrates domaranus</i> = <i>Arise euphrates domaranus</i>	(Fruhstorfer, 1903)		Calamian, Palawan, Dumarán, Balabac Philippines
<i>Graphium (Pathysa) euphrates elegantia</i> Tsukada & Nishiyama, 1980	<i>elegantia</i>	Tsukada & Nishiyama, 1980		Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) euphrates euphrates</i> (C. & R. Felder, 1862)	<i>euphrates</i> = <i>Papilio euphrates</i> = <i>Papilio moorei</i> = <i>Papilio antiphates euphrates</i> = <i>Pathysa euphrates</i> = <i>Arise euphrates</i> = <i>Pathysa euphrates euphrates</i> = <i>Graphium euphrates cuyonensis</i> = <i>Arise euphrates euphrates</i>	(C. & R. Felder, 1862)	Pnc: <i>Annona</i> , <i>Desmos</i> , <i>Uvaria</i>	Busuanga, Homonhon, Leyte, Luzon, Marinduque, Mindoro, Mindanao, Samar Philippines
<i>Graphium (Pathysa) euphrates itim</i> Page & Treadaway, 2011	<i>itim</i>	Page & Treadaway, 2011		Lubang, Mindoro occidental Philippines
<i>Graphium (Pathysa) euphrates nesus</i> Jordan, 1909	<i>nesus</i> = <i>Pathysa euphrates nesus</i> = <i>Pathysa nesus f. zebraica</i>	Jordan, 1909		Nord de Luzon Philippines
<i>Graphium (Pathysa) euphrates ornatus</i> (Rothschild, 1895)	<i>ornatus</i> = <i>Papilio ornatus</i>	(Rothschild, 1895)		Obi, Halmahera, Temate?, Bachan? Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) euphratoides</i> (Eimer, 1889)	<i>euphratoides</i> = <i>Papilio antiphates euphratoides</i> = <i>Papilio antiphates decolor ab. euphratoides</i> = <i>Papilio euphrates euphratoides</i> = <i>Pathysa euphratoides</i> = <i>Arise euphratoides</i> = <i>Graphium decolor euphratoides</i>	(Eimer, 1889)		Luzon, Mindanao, Basilan Philippines
<i>Graphium (Pathysa) nomius nomius</i> (Esper, 1785)	<i>nomius nomius</i> = <i>Papilio nomius</i> = <i>Papilio orestes</i> = <i>Papilio heroicus meges</i> = <i>Papilio niamus</i> = <i>Pathysa nomius</i> = <i>Pathysa nomius nomius</i>	(Esper, 1785)	Pnc: <i>Polyalthia</i> , Légumineuses	commun
<i>Graphium (Pathysa) nomius swinhoei</i> (Moore, 1878)	<i>swinhoei</i> = <i>Papilio swinhoei</i> = <i>Papilio nomius f. temp. pernomius</i> = <i>Papilio nomius swinhoei</i> = <i>Pathysa nomius swinhoei</i> = <i>Pathysa nomius hainana</i>	(Moore, 1878)		Assam Inde , Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, Hainan Chine
<i>Graphium (Pathysa) rhesus parvimacula</i> (Joicey & Talbot, 1922)	<i>rhesus parvimacula</i> = <i>Papilio rhesus parvimacula</i> = <i>Pathysa rhesus parvimacula</i>	(Joicey & Talbot, 1922)		Sanana, Mangole Îles Sula Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) rhesus rhapsia</i> Jordan, 1908	<i>rhapsia</i> = <i>Pathysa rhesus rhapsia</i>	Jordan, 1908		Tanahdjampea, Îles Tukangbesi Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) rhesus rhesulus</i> (Fruhstorfer, 1902)	<i>rhesulus</i> = <i>Papilio rhesus rhesulus</i> = <i>Pathysa rhesus rhesulus</i>	(Fruhstorfer, 1902)		Sud du Sulawesi, Peleng Îles Banggai Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) rhesus rhesus</i> (Boisduval, 1836)	<i>rhesus</i> = <i>Papilio rhesus</i> = <i>Pathysa rhesus</i> = <i>Pathysa rhesus rhesus</i>	(Boisduval, 1836)	commun	Nord, Est et Sud-Est du Sulawesi, Buton island Indonésie
<i>Graphium (Pathysa) stratiotes</i> (Grose-Smith, 1887)	<i>stratiotes</i> = <i>Papilio stratiotes</i> = <i>Pathysa stratiotes</i>	(Grose-Smith, 1887)		Kina Balu Mtn., Nord de Bornéo Malaisie
	Sous-genre : <i>Paranticopsis</i> Wood-Mason & de Nicéville, 1887			
	Groupe des <i>macareus</i>			
<i>Graphium (Paranticopsis) delesserti delesserti</i> (Guérin-Ménéville, 1839)	<i>delesserti delesserti</i> = <i>Papilio delesserti</i> = <i>Paranticopsis delesserti</i> = <i>Graphium delesserti</i> = <i>Paranticopsis delesserti</i> = <i>Arise delesserti</i> = <i>Papilio catoris</i> = <i>Papilio ab. albinitica</i> = <i>Papilio laodocus</i> = <i>Papilio melanides</i> = <i>Papilio dehaani</i> = <i>Paranticopsis delesserti delesserti</i> = <i>Pathysa delesserti delesserti</i> = <i>Papilio delesserti sacerdotalis</i> = <i>Papilio delesserti labienus</i>	(Guérin-Ménéville, 1839)	commun	Yala Sud de la Thaïlande, Langkawi island, Péninsule malaise, Sabah Malaisie , Brunei, Sumatra, Java, Banka, Natuna, Kalimantan Borneo Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) delesserti furvus</i> Page & Treadaway, 2011	<i>furvus</i>	Page & Treadaway, 2011		Îles Karimata Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) delesserti hyalinus</i> (Fruhstorfer, 1901)	<i>hyalinus</i> = <i>Papilio delesserti hyalinus</i> = <i>Paranticopsis delesserti hyalinus</i>	(Fruhstorfer, 1901)		Nias Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) delesserti palawanus</i> (Staudinger 1889)	<i>palawanus</i> = <i>Papilio laodocus var. palawanus</i> = <i>Papilio laodocus var. palawanicus</i> = <i>Paranticopsis delesserti palawanus</i> = <i>Arise delesserti palawanus</i>	(Staudinger 1889)		Palawan, Balabac Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) delesserti verbigenus</i> (Fruhstorfer, 1911)	<i>verbigenus</i> = <i>Papilio delesserti verbigenus</i>	(Fruhstorfer, 1911)		Bangka Malaisie
<i>Graphium (Paranticopsis) deucalion deucalion</i> (Boisduval, 1836)	<i>deucalion deucalion</i> = <i>Papilio deucalion</i> = <i>Paranticopsis deucalion</i> = <i>Paranticopsis deucalion deucalion</i>	(Boisduval, 1836)	commun	Sulawesi, Buton island Indonésie , Ouest de la Nouvelle Guinée
<i>Graphium (Paranticopsis) deucalion leucadion</i> (Staudinger, 1884)	<i>leucadion</i> = <i>Papilio leucadion</i>	(Staudinger, 1884)		Ternate, Halmahera, Bachan Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) deucalion marabuntana</i> Detani, 1983	<i>marabuntana</i>	Detani, 1983		Peleng Îles Banggai Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) ebertorum</i> Koçak, 1983	<i>ebertorum</i>	Koçak, 1983		Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) encelades</i> (Boisduval, 1836)	<i>encelades</i> = <i>Papilio encelades</i> = <i>Paranticopsis encelades</i>	(Boisduval, 1836)		Sulawesi, Buton island, Peleng Îles Banggai Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) idaeoides idaeoides</i> (Hewitson, 1853)	<i>idaeoides idaeoides</i> = <i>Papilio idaeoides</i> = <i>Paranticopsis idaeoides</i> = <i>Arise idaeoides</i> = <i>Paranticopsis idaeoides idaeoides</i> = <i>Arise idaeoides idaeoides</i>	(Hewitson, 1853)	Rare et localisé. Copie un <i>Idea</i> géant	Sud de Luzon, Nord de Samar, Leyte, Centre et Est de Mindanao Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) idaeoides neergaardi</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>neergaardi</i> = <i>Arise idaeoides neergaardi</i> = <i>Paranticopsis idaeoides neergaardi</i>	(Page & Treadaway, 2003)		Sulong River, Sierra Madre Range, Quirino Province Nord-est de Luzon Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus albinovanus</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>macareus albinovanus</i> = <i>Papilio albinovanus</i> = <i>Graphium macareus albinovarum</i> = <i>Paranticopsis macareus albinovanus</i>	(Fruhstorfer, 1908)		Bali Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus burmensis</i> Moonen, 1984	<i>burmensis</i> = <i>Papilio macareus gyndes</i> = <i>Paranticopsis macareus gyndes</i>	Moonen, 1984		Myanmar, Mae Hong Son, Chiang Mai Nord de la Thaïlande
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus indicus</i> (Rothschild, 1895)	<i>indicus</i> = <i>Papilio macareus indicus</i> = <i>Paranticopsis macareus indicus</i>	(Rothschild, 1895)		Sikkim Inde

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus indochinensis</i> (Fruhstorfer, 1901)		<i>indochinensis</i> = <i>Papilio macareus indochinensis</i> = <i>Papilio macareus indochinensis</i> ab. <i>argentiferus</i> = <i>Papilio macareus</i> f. f. <i>serda</i> = <i>Papilio striatus</i> = <i>Paranticopsis macareus dawna</i> = <i>Paranticopsis macareus indochinensis</i>	(Fruhstorfer, 1901)	Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus lioneli</i> Fruhstorfer, 1902		<i>lioneli</i> = <i>Paranticopsis macareus lioneli</i>	Fruhstorfer, 1902	Assam Inde, Manipur, Ouest du Myanmar
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus macareus</i> (Godart, [1819])		<i>macareus</i> = <i>Papilio macareus</i> = <i>Papilio striatus</i> = <i>Papilio macareus</i> ab. <i>masformis</i> = <i>Papilio macareus</i> ab. <i>palanus</i> = <i>Paranticopsis macareus</i> = <i>Arisbe macareus</i> = <i>Paranticopsis macareus macareus</i>	(Godart, [1819]) Commun. Mime de <i>Parantica aglea</i>	Java Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus macaristus</i> (Grose-Smith, 1887)		<i>macaristus</i> = <i>Papilio macaristus</i> = <i>Papilio macareus</i> var. <i>borneensis</i> = <i>Papilio macareus macaristus</i> = <i>Paranticopsis macareus macaristus</i>	(Grose-Smith, 1887)	Brunei, Kina Balu Mtn., Sarawak Malaisie, Borneo, Pulau Tioman? Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus mitis</i> Jordan,		<i>mitis</i> = <i>Paranticopsis macareus mitis</i>	Jordan,	Hainan Chine
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus palawanicola</i> (Koçak, 1980)		<i>palawanicola</i> = <i>Papilio macareus palawanicola</i> = <i>Papilio maccabaeus</i> = <i>Papilio macareus maccabaeus</i> = <i>Paranticopsis macareus maccabaeus</i> = <i>Paranticopsis macareus palawanicola</i> = <i>Arisbe macareus palawanicola</i>	(Koçak, 1980)	Balabac, Palawan Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus perakensis</i> (Fruhstorfer, 1899)		<i>perakensis</i> = <i>Papilio macareus perakensis</i> = <i>Papilio astina</i> = <i>Paranticopsis macareus perakensis</i> = <i>Pathysa macareus perakensis</i> = <i>Pathysa macareus perakensis</i> f. <i>astina</i> = <i>Paranticopsis macareus perakensis</i> f. <i>astina</i>	(Fruhstorfer, 1899)	Sud du Myanmar, Ranong, Hat Yai, Yala Sud de la Thaïlande, Langkawi Island, Ipoh, Perak Péninsule malaise Malaisie
<i>Graphium (Paranticopsis) macareus xanthosoma</i> (Staudinger, 1889)		<i>xanthosoma</i> = <i>Papilio macareus</i> var. <i>xanthosoma</i> = <i>Paranticopsis macareus xanthosoma</i>	(Staudinger, 1889)	Sumatra Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) megaera</i> (Staudinger, 1888)		<i>megaera</i> = <i>Papilio megaera</i> = <i>Paranticopsis megaera</i> = <i>Arisbe megaera</i>	(Staudinger, 1888)	peu commun Palawan, Balabac, Busuanga Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus fleximacula</i> (Rothschild, 1895)		<i>megarus fleximacula</i> = <i>Papilio megarus fleximacula</i> = <i>Paranticopsis megarus fleximacula</i>	(Rothschild, 1895)	Mt. Banquey Banggi Island Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus marthae</i> Toxopeus,		<i>marthae</i> = <i>Paranticopsis megarus marthae</i>	Toxopeus,	Est de Java Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus megapenthes</i> (Fruhstorfer, 1902)		<i>megapenthes</i> = <i>Papilio megarus megapenthes</i> = <i>Papilio martinus</i> = <i>Papilio megarus mendicus</i> = <i>Papilio megarus martinus</i> = <i>Papilio similis</i> = <i>Paranticopsis megarus megapenthes</i> = <i>Pathysa megarus megapenthes</i>	(Fruhstorfer, 1902)	Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Thac Mai, Than-Moi, Xom-Gom Vietnam, Perak Péninsule malaise, Langkawi island Malaisie, Sumatra Indonésie, Hainan Chine
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus megarus</i> (Westwood, 1844)		<i>megarus</i> = <i>Papilio megarus</i> = <i>Paranticopsis megarus</i> = <i>Paranticopsis megarus megarus</i>	(Westwood, 1844)	Commun Assam, Nord de l'Inde
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus mendicus</i> (Fruhstorfer, 1902)		<i>mendicus</i> = <i>Papilio megarus mendicus</i>	(Fruhstorfer, 1902)	Muok-Lek, Kauburi Thaïlande
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus sagittiger</i> Fruhstorfer, 1901		<i>sagittiger</i> = <i>Paranticopsis megarus sagittiger</i>	Fruhstorfer, 1901	Sabah Nord de Borneo Malaisie, Brunei
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus senteinus</i> Kalis, 1941		<i>senteinus</i> = <i>Papilio megarus senteinus</i>	(Kalis, 1941)	Bali Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus tiomanensis</i> (Eliot, 1978)		<i>tiomanensis</i> = <i>Paranticopsis megarus tiomanensis</i> = <i>Pathysa megarus tiomanensis</i>	(Eliot, 1978)	Pulau Tioman Malaisie
<i>Graphium (Paranticopsis) megarus tistaensis</i> (Bang-Haas, 1937)		<i>tistaensis</i> = <i>Papilio megarus tistaensis</i>	(Bang-Haas, 1937)	Tistatal, Sud du Sikkim Inde
<i>Graphium (Paranticopsis) phidias</i> (Oberthür, 1896)		<i>phidias</i> = <i>Papilio phidias</i> = <i>Graphium phidias phidias</i> = <i>Graphium phidias akikoe</i> = <i>Paranticopsis phidias</i>	(Oberthür, 1896)	rare et localisé Nord du Vietnam, Xam Neua, Lak Sao, Annam Mts. Laos
<i>Graphium (Paranticopsis) ramaceus interjectus</i> (Honrath, 1893)		<i>ramaceus interjectus</i> = <i>Papilio leucothoe</i> var. <i>interjectus</i> = <i>Papilio leucothoe interjectus</i> = <i>Paranticopsis ramaceus interjectus</i>	(Honrath, 1893)	peu commun Palembang, Sud de Sumatra Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) ramaceus pendleburyi</i> (Corbet, 1941)		<i>pendleburyi</i> = <i>Papilio ramaceus pendleburyi</i> = <i>Papilio leucothoe</i> = <i>Papilio leucothoe</i> = <i>Papilio ramaceus dealbatus</i> = <i>Paranticopsis ramaceus pendleburyi</i> = <i>Pathysa ramaceus pendleburyi</i>	(Corbet, 1941)	peu commun Yala Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise, Langkawi island Malaisie, Singapour, Nord de Sumatra Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) ramaceus ramaceus</i> (Westwood, 1872)		<i>ramaceus</i> = <i>Papilio ramaceus</i> = <i>Paranticopsis ramaceus</i> = <i>Paranticopsis ramaceus ramaceus</i> = <i>Papilio leucothoe ramaceus</i> = <i>Papilio schoenbergianus</i> = <i>Papilio schönbergianus</i>	(Westwood, 1872)	rare Kalimantan Sud-est de Borneo Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) stratocles dodongi</i> (Page & Treadaway, 2003)		<i>stratocles dodongi</i> = <i>Arisbe stratocles dodongi</i> = <i>Paranticopsis stratocles dodongi</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Iwahig, Palawan Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) stratocles pingi</i> (Page & Treadaway, 2003)		<i>pingi</i> = <i>Arisbe stratocles pingi</i> = <i>Paranticopsis stratocles pingi</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Coron, Busuanga Island Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) stratocles senectus</i> Tsukada & Nishiyama, 1980		<i>senectus</i> = <i>Paranticopsis stratocles senectus</i> = <i>Arisbe stratocles senectus</i>	Tsukada & Nishiyama, 1980	Luzon, Marinduque Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) stratocles stratocles</i> (C. & R. Felder, 1861)		<i>stratocles</i> = <i>Papilio stratocles</i> = <i>Paranticopsis stratocles</i> = <i>Arisbe stratocles</i> = <i>Paranticopsis stratocles stratocles</i> = <i>Arisbe stratocles stratocles</i> = <i>Papilio magicus</i>	(C. & R. Felder, 1861)	pas rare Calamian, Palawan, Mindoro Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) stratocles stratonices</i> (Jordan, 1909)		<i>stratonices</i> = <i>Papilio stratocles stratonices</i> = <i>Paranticopsis stratocles stratonices</i> = <i>Arisbe stratocles stratonices</i>	(Jordan, 1909)	Bohol, Dinagat, Leyte, Mindanao, Panaon, Samar Philippines
<i>Graphium (Paranticopsis) thule</i> (Wallace, 1865)		<i>thule</i> = <i>Papilio thule</i> = <i>Papilio leuthe</i> = <i>Papilio goldiei</i> = <i>Papilio princeps</i> = <i>Papilio thule</i> f. <i>viridicans</i> = <i>Papilio thule alfredi</i> ab. <i>viridicans</i> = <i>Papilio thule alfredi</i> = <i>Papilio thule</i> f. <i>fumosa</i> = <i>Graphium thule</i> f. <i>princeps</i> = <i>Papilio thule</i> f. <i>goldiei</i> = <i>Papilio thule</i> f. <i>leuthe</i> = <i>Papilio thule</i> f. <i>thule</i> = <i>Graphium thule</i> f. <i>leuthe</i> = <i>Graphium thule</i> f. <i>thule</i>	(Wallace, 1865) Pnc: <i>Aquilolacene illex</i>	rare. Mime de <i>Ideopsis juvena</i> et <i>Tirumala hamata</i> Misool, Waigee, Base Camp (Wollaston exp.), Humboldt Bay, Manokwari, Miei, Nabire, Oost Tami, Timika Nouvelle Guinée Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Graphium (Paranticopsis) felixi</i> (Joicey & Noakes, 1915)		<i>felixi</i> = <i>Papilio felixi</i> = <i>Papilio thule</i> f. <i>felixi</i> = <i>Graphium thule</i> f. <i>felixi</i> = <i>Graphium deucalion felixi</i> = <i>Pathysa deucalion felixi</i> = <i>Pathysa felixi</i>	(Joicey & Noakes, 1915)	Bosniak Biak Indonésie
<i>Graphium (Paranticopsis) xenocles lindos</i> (Fruhstorfer, 1902)		<i>xenocles lindos</i> = <i>Papilio xenocles lindos</i> = <i>Paranticopsis xenocles lindos</i>	(Fruhstorfer, 1902)	Thaïlande, Laos, Cambodge, Sud du Vietnam

Auteur: Dominick PRUVOT août 2018				
<i>Graphium (Paranticopsis) xenocles kephisos</i> (Fruhstorfer, 1902) <i>Graphium (Paranticopsis) xenocles xenocles</i> (Doubleday, 1842) <i>Graphium (Paranticopsis) xenocles xenoclidides</i> (Fruhstorfer, 1902)		kephisos (Fruhstorfer, 1902) = <i>Papilio xenocles kephisos</i> = <i>Papilio xenocles f. temp. neronus</i> = <i>Paranticopsis xenocles kephisos</i> xenocles (Doubleday, 1842) = <i>Papilio xenocles</i> = <i>Paranticopsis xenocles</i> = <i>Paranticopsis xenocles xenocles</i> = <i>Papilio xenocles phrontis?</i> = <i>Papilio xenocles f. lunatus</i> xenoclidides (Fruhstorfer, 1902) = <i>Papilio xenocles xenoclidides</i> = <i>Paranticopsis xenocles xenoclidides</i>		Nord du Laos, Chiem-Hoa, Ha Giang, Hoang Lien Son Nord du Vietnam, Sichuan Sud de la Chine Sikkim, Assam Inde, Bhoutan Five Finger Mts. Hainan Chine
		Sous-genre : Pazala Moore, 1888		
		Groupe des europs		
<i>Graphium (Pazala) alebion</i> (Gray, [1853])		alebion (Gray, [1853]) = <i>Papilio alebion</i> = <i>Cosmodesmus alebion</i> = <i>Papilio mariesii</i> = <i>Pazala alebion mariesi</i> = <i>Pazala alebion</i>	pas rare	Nord de la Chine
<i>Graphium (Pazala) europs asakurae</i> (Matsumura, 1908)		europs asakurae (Matsumura, 1908) = <i>Papilio europs asakurae</i> = <i>Pazala europs asakurae</i> = <i>Pazala euroa asakurae</i>		Taiwan
<i>Graphium (Pazala) europs cashmirensis</i> (Rothschild, 1895)		cashmirensis (Rothschild, 1895) = <i>Papilio europs cashmirensis</i> = <i>Graphium glycerion cashmirensis</i>		Jammu, Kumaon, Cachemire à Himachal Pradesh, Uttarakhand Nord-ouest de l'Inde, Tibet
<i>Graphium (Pazala) europs europs</i> (Leech, [1893])		europs (Leech, [1893]) = <i>Papilio europs</i> = <i>Pathysa europs</i> = <i>Pazala europs</i> = <i>Pazala europs europs</i>	Pnc: <i>Machilus odoratissimus</i> , <i>M. duthici</i>	Ouest du Népal, Assam, Sikkim, Manipur Inde, Bhoutan?, Nord et centre du Myanmar, Yunnan Chine
<i>Graphium (Pazala) europs inthanon</i> Katayama, 1986		inthanon Katayama, 1986 = <i>Pazala europs inthanon</i>		Chiang Mai, Nan Nord de la Thaïlande, Xaignabouri, Lak Sao, Xam Neua Nord du Laos, Centre et Sud du Vietnam
<i>Graphium (Pazala) europs melli</i> Racheli & Cotton, 2009		melli Racheli & Cotton, 2009		Guangxi Sud de la Chine
<i>Graphium (Pazala) europs meridionalis</i> (Mell, 1935)		meridionalis (Mell, 1935) = <i>Papilio europs meridionalis</i>		Linning Nord du Guangdong à Zhejiang Sud de la Chine
<i>Graphium (Pazala) europs panopaea</i> (de Nicéville, 1900)		panopaea (de Nicéville, 1900) = <i>Papilio panopaea</i>		Tse Kou Ouest de la Chine
<i>Graphium (Pazala) europs sikkimica</i> (Heron, 1895)		sikkimica (Heron, 1895)		Darjeeling Sikkim, Nord-ouest du Bengale, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya Inde, Népal
<i>Graphium (Pazala) incertus parus</i> (de Nicéville, 1900)		incertus parus (de Nicéville, 1900) = <i>Cosmodesmus tamerlan incertus</i> = <i>Pazala incertus</i> = <i>Graphium incerta</i> = <i>Graphium incertus</i> = <i>Graphium parus</i>		Tatsienlou Sud-ouest de la Chine
<i>Graphium (Pazala) incertus taliensis</i> (O. Bang-Haas, 1927)		taliensis (O. Bang-Haas, 1927) = <i>Papilio taliensis</i> = <i>Pazala incerta taliensis</i> = <i>Pazala tamerlana taliensis</i> = <i>Graphium tamerlana taliensis</i>		Yunnan Sud-ouest de la Chine
<i>Graphium (Pazala) mandarinus mandarinus</i> (Oberthür, 1879)		mandarinus mandarinus (Oberthür, 1879) = <i>Papilio glycerion var. mandarinus</i> = <i>Iphiclidides glycerion mandarinus</i> = <i>Papilio glycerion mandarinus f. indiv. m. albarea</i> = <i>Papilio mandarinus</i> = <i>Pazala mandarina</i>	peu commun	Ha Giang Nord du Vietnam, Chine occidentale
<i>Graphium (Pazala) mandarinus paphus</i> (de Nicéville, 1886)		paphus (de Nicéville, 1886) = <i>Papilio mandarinus paphus</i>		Sikkim Inde, Népal
<i>Graphium (Pazala) mandarinus kimurai</i> Murayama, 1982		kimurai Murayama, 1982 = <i>Graphium glycerion kimurai</i> = <i>Pazala glycerion kimurai</i> = <i>Pazala mandarina kimurai</i> = <i>Pazala mandarinum kimurai</i>		Centre du Myanmar, Chiang Mai Nord de la Thaïlande, Xaignabouri Nord du Laos
<i>Graphium (Pazala) mandarinus fangana</i> (Okano, 1986)		fangana (Okano, 1986) = <i>Pazala glycerion fangana</i> = <i>Pazala mandarinum fangana</i> = <i>Pazala mandarina fangana</i>		Doi Pha Hom Pok, Doi Pomeun, Chiang Mai Nord de la Thaïlande
<i>Graphium (Pazala) mullah chungianus</i> (Murayama, 1961)		mullah chungianus (Murayama, 1961) = <i>Pazala alebion chungianus</i> = <i>Graphium alebion chungianus</i> = <i>Graphium timur chungianus</i>		Centre de Taiwan
<i>Graphium (Pazala) mullah kooichii</i> (Morita, 1996)		kooichii (Morita, 1996) = <i>Pazala timur kooichii</i>		Lak Sao Laos, Huong Son, Ha Tinh Centre du Vietnam
<i>Graphium (Pazala) mullah mullah</i> (Alphéraky, 1897)		mullah (Alphéraky, 1897) = <i>Papilio alebion var. mullah</i>		Sichuan Chine
<i>Graphium (Pazala) tamerlanus hoenei</i> (Mell, 1935)		tamerlanus hoenei (Mell, 1935) = <i>Papilio tamerlanus hoenei</i> = <i>Pazala sichuanica</i> = <i>Graphium sichuanica</i> = <i>Pazala hoenei</i>		Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shaanxi, Sichuan Sud de la Chine
<i>Graphium (Pazala) tamerlanus kansuensis</i> Bang-Haas, 1933		kansuensis Bang-Haas, 1933 = <i>Cosmodesmus tamerlanus kansuensis</i>		Peilingschan, Tsinglingschan, Sud du Kansu Chine
<i>Graphium (Pazala) tamerlanus tamerlanus</i> (Oberthür, 1876)		tamerlanus (Oberthür, 1876) = <i>Papilio tamerlanus</i> = <i>Pazala tamerlanus</i>		Moupin, Sichuan Chine, Tibet
<i>Graphium (Pazala) timur timur</i> (Ney, 1911)		timur (Ney, 1911) = <i>Papilio tamerlanus var. timur</i> = <i>Cosmodesmus alebion timur</i> = <i>Pazala timur</i>		Ta-tsien-lu Kangding Chine
<i>Graphium (Pazala) glycerion glycerion</i> (Gray, 1831)		glycerion (Gray, 1831) = <i>Papilio glycerion</i> = <i>Pathysa glycerion</i> = <i>Pazala glycerion</i> = <i>Pazala glycerion glycerion</i>		Népal, Sikkim, Assam Inde, Myanmar

Papilionini Latreille, [1802]		Tribu des : Papilionini Latreille, [1802]		
Chilasa Moore, [1881]		Chilasa = Agehana = Clytia = Cadugoides = Eupleopsis = Menamopsis = Isamiopsis	Moore, [1881]	
		Sous-genre : Agehana Matsumura, 1936		
<i>Chilasa (Agehan) elwesi</i> (Leech, 1889)		elwesi (Leech, 1889) Pnc: Ombellifères = <i>Papilio elwesi</i> = <i>Papilio elwesi cavaleriei</i> = <i>Agehana elwesi</i>	peu commun	Ha Giang Nord du Vietnam, Kuikiang, Est et Centre de la Chine
<i>Chilasa (Agehana) maraho</i> (Shiraki & Sonan, 1934)		maraho (Shiraki & Sonan, 1934) Pnc: Sassafran randaiense = <i>Papilio maraho</i> = <i>Papilio elwesi maraho</i> = <i>Agehana maraho</i>	rare	Eboshi, Rato-Prefecture Taiwan
		Sous-genre : Chilasa = Clytia = Cadugoides = Eupleopsis = Menamopsis = Isamiopsis	Moore, [1881]	
		Groupe des agestor		
<i>Chilasa (Chilasa) agestor agestor</i> (Gray, 1831)		agestor agestor (Gray, 1831) Pnc: Lauracées = <i>Papilio agestor</i> = <i>Chilasa agestor</i> = <i>Papilio agestor agestor</i> = <i>Papilio agestor senchalus</i> = <i>Papilio agestor cresconius</i> = <i>Chilasa agestor inakoi</i>	Commun	Népal, Assam, Sikkim Inde, Bhoutan à Myanmar, Mae Hong Son, Chiang Rai, Chiang Mai, Nan Thaïlande, Lak Sao Laos, Dalat Sud du Vietnam
<i>Chilasa (Chilasa) agestor chiraghshahi</i> (Bang-Haas, 1933)		chiraghshahi (Bang-Haas, 1933) = <i>Papilio agestor chiraghshahi</i>		Jehlum River, Punchstate Ouest du Kashmir Inde
<i>Chilasa (Chilasa) agestor govindra</i> (Moore, 1864)		govindra (Moore, 1864) = <i>Papilio govindra</i> = <i>Papilio agestor govindra</i>		Nord de l'Inde

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Chilasa (Chilasa) agestor kuangtungensis</i> (Mell, 1935)	<i>kuangtungensis</i> = <i>Papilio agestor kuantungensis</i> = <i>Chilasa agestor moritai</i>	(Mell, 1935)		Mt. DayaoShan, Laoshan Guangxi, Guangdong, Fujian, Zhejiang Chine
<i>Chilasa (Chilasa) agestor matsumarae</i> (Fruhstorfer, 1909)	<i>matsumarae</i> = <i>Papilio agestor matsumurae</i> = <i>Chilasa agestor galbanus</i>	(Fruhstorfer, 1909)	Pnc: <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>C. micranthum</i> , <i>Persea japonica</i> , <i>P. thunbergii</i> , <i>P. zuihoensis</i>	Titsugettan, Horisha Taiwan
<i>Chilasa (Chilasa) agestor restricta</i> (Leech, 1893)	<i>restricta</i> = <i>Papilio agestor var. restricta</i> = <i>Papilio agestor restrictus</i> = <i>Papilio agestor restricta</i>	(Leech, 1893)		Sud de la Chine
<i>Chilasa (Chilasa) agestor shirozui</i> Igarashi, 1979	<i>shirozui</i> = <i>Chilasa shirozui</i> = <i>Papilio agestor shirozui</i>	Igarashi, 1979	Pnc: <i>Cinnamomum</i> , <i>Persea</i>	Ressemble à <i>Parantica sita</i>
<i>Chilasa (Chilasa) agestor teruyooae</i> (Shinkai, 1996)	<i>teruyooae</i> = <i>Papilio agestor teruyooae</i>	(Shinkai, 1996)		Mt. Pia Oac Nord du Vietnam
<i>Chilasa (Chilasa) epycides agestorides</i> (Fruhstorfer, 1909)	<i>epycides agestorides</i> = <i>Papilio epycides agestorides</i> = <i>Papilio agestor agestorides</i> = <i>Papilio epycides ouvardi</i> = <i>Papilio agestor ouvardi</i>	(Fruhstorfer, 1909)		Lou-Tse-Kiang Tibet , Petshong Sud du Yunnan Chine
<i>Chilasa (Chilasa) epycides epycides</i> (Hewitson, 1864)	<i>epycides</i> = <i>Papilio epycides</i> = <i>Papilio epycides epycides</i> = <i>Papilio epycides f. shitakurona</i> = <i>Papilio epycides ab. palluta</i>	(Hewitson, 1869)		Commun Sikkim, Assam Inde , Bhoutan
<i>Chilasa (Chilasa) epycides curiatus</i> (Fruhstorfer, 1901)	<i>curiatus</i> = <i>Papilio epycides curiatus</i>	(Fruhstorfer, 1901)		Nord du Myanmar
<i>Chilasa (Chilasa) epycides horatius</i> (Blanchard, 1871)	<i>horatius</i> = <i>Papilio horatius</i> = <i>Papilio epycides horatius</i>	(Blanchard, 1871)		Mou-pin, Ouest du Sichuan, ... Chine
<i>Chilasa (Chilasa) epycides hypochra</i> (Jordan, 1909)	<i>hypochra</i> = <i>Papilio epycides hypochra</i> = <i>Papilio epycides camilla</i>	(Jordan, 1909)		Sud du Myanmar , Mae Hong Son, Chiang Rai, Chiang Mai, Nan Nord de la Thaïlande , Xam Neua, Hinboun, Xaysomboun, Lak sao Laos , Nord du Vietnam , Sud du Yunnan Chine
<i>Chilasa (Chilasa) epycides imitata</i> Devyatkin & Monastyrskii, 2003	<i>imitata</i> = <i>Chilasa imitata</i> = <i>Papilio epycides imitata</i>	Devyatkin & Monastyrskii, 2003		Bi Doup-Nui Ba Nature Reserve, Dong Mong district,Dambri, Lam Dong Province Centre du Vietnam
<i>Chilasa (Chilasa) epycides melanoleucus</i> (Ney, 1911)	<i>melanoleucus</i> = <i>Papilio epycides melanoleucus</i> = <i>Chilasa epycides melanoleuca</i>	(Ney, 1911)	Pnc: <i>Lindera megaphylla</i> , <i>Litsea cubeba</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>C. micranthum</i>	Taiwan
<i>Chilasa (Chilasa) epycides yamabuki</i> Yoshino, 2008	<i>yamabuki</i>	Yoshino, 2008		Zhondian Nord du Yunnan Chine
<i>Chilasa (Chilasa) slateri hainanensis</i> Chou, 1994	<i>slateri hainanensis</i> = <i>Papilio slateri hainanensis</i>	Chou, 1994		Hainan Chine
<i>Chilasa (Chilasa) slateri hewitsonii</i> (Westwood, 1864)	<i>hewitsonii</i> = <i>Papilio hewitsonii</i> = <i>Papilio camma</i> = <i>Chilasa slateri hewitsoni</i>	(Westwood, 1864)		Rare Nord de Borneo Malaisie
<i>Chilasa (Chilasa) slateri perses</i> (de Nicéville, 1894)	<i>perses</i> = <i>Papilio perses</i> = <i>Menamopsis perses</i> = <i>Papilio hewitsonii var. sumatrana</i> = <i>Papilio petra</i> = <i>Papilio slateri perses ab. petra</i> = <i>Papilio sticheli</i> = <i>Papilio slateri perses ab. sticheli</i> = <i>Papilio slateri ab. persoides</i> = <i>Chilasa slateri perses</i>	(de Nicéville, 1894)	Pnc: <i>Cinnamomum</i>	Ranong, Surat Thani, Yala Sud de la Thaïlande , Perak Péninsule malaise Malaisie , Nord de Sumatra Indonésie
<i>Chilasa (Chilasa) slateri slateri</i> (Hewitson, 1859)	<i>slateri</i> = <i>Papilio slateri</i> = <i>Papilio clarae</i> = <i>Papilio slateri slateri</i> = <i>Papilio slateri slateri ab. jaintinus</i> = <i>Papilio slateri f. geogr. marginata</i> = <i>Chilasa slateri marginata</i> = <i>Papilio slateri marginata ab. cnephas</i> = <i>Papilio tavoyanus</i> = <i>Chilasa slateri tavoyanus</i>	(Hewitson, 1859)		Copie <i>Euploea</i> Assam, Sikkim Inde , Sud des Shan Sates, Tenasserim Centre et Sud du Myanmar , Mae Hong Son, Chiang Mai, Uttaradi, Chanthaburi, Phetchaburi, Ranong Nord et centre de la Thaïlande , Lak Sao, Thabok, Hinboun, Thakek Laos , Lam Dong Nord du Vietnam , Sud de la Chine
	Groupe des <i>clytia</i>			
<i>Chilasa (Chilasa) clytia anuus</i> Page & Treadaway, 2003	<i>clytia anuus</i> = <i>Papilio clytia anuus</i>	Page & Treadaway, 2003		Talamban Sibuyan Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) clytia clytia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>clytia</i> = <i>Papilio clytia</i> = <i>Nymphalis clytia</i> = <i>Papilio janus</i> = <i>Chilasa clytia clytia f. janus</i> = <i>Arisbe similis</i> = <i>Papilio saturior</i> = <i>Papilio clytia lanata</i> = <i>Papilio clytia ab. nigra</i> = <i>Papilio clytia ab. pallida</i> = <i>Chilasa clytia</i> = <i>Papilio casyapa</i> = <i>Papilio papone</i> = <i>Papilio onpape</i> = <i>Chilasa clytia clytia f. onpape</i> = <i>Papilio clytia onpape ab. janus</i> = <i>Papilio clytia ab. commixtus</i> = <i>Papilio clytia ab. casyapa</i> = <i>Papilio clytia ab. papone</i> = <i>Chilasa clytia clytia f. papone</i> = <i>Papilio panope</i> = <i>Nymphalis panope</i> = <i>Papilio saturata</i> = <i>Papilio clytia panope ab. loc. saturatus</i> = <i>Papilio clytia ab. saturator</i> = <i>Papilio clytia f. vitalisi</i> = <i>Papilio clytia panope ab. dissimilis</i> = <i>Papilio dissimilis</i> = <i>Nymphalis dissimilis</i> = <i>Papilio clytia ab. dissimilis</i> = <i>Chilasa clytia clytia f. dissimilis</i> = <i>Chilasa clytia f. dissimilina</i> = <i>Papilio clytia clytia f. dissimilina</i> = <i>Papilio lankeswara</i> = <i>Papilio clyia lankeswara</i> = <i>Papilio clytia lankeswara ab. clytioides</i> = <i>Chilasa clytioides</i> = <i>Papilio clytia lankeswara ab. dissimilis</i> = <i>Chilasa clytia lankeswara</i> = <i>Papilio clytia clytia</i>	(Linnaeus, 1758)	Pnc: <i>Alseodaphne</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Litsea glutinosa</i>	Commun. Copie <i>Euploea core</i> Sri Lanka, Inde à Myanmar , Thaïlande , Laos , Vietnam , Péninsule malaise, Langkawi island Malaisie , Singapour , Hong-Kong , Hainan, Sud du Yunnan Chine
<i>Chilasa (Chilasa) clytia duboisi</i> Page & Treadaway, 2003	<i>duboisi</i> = <i>Papilio clytia duboisi</i>	Page & Treadaway, 2003		Fuga island, Babuyanès Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) clytia echidna</i> (Boisduval, 1836)	<i>echidna</i> = <i>Papilio dissimilis var. echidna</i> = <i>Papilio clytia echidnedes</i>	(Boisduval, 1836)		Timor, Wetar, Kissar, Letti Group, Alor, Moa Indonésie
<i>Chilasa (Chilasa) clytia gulam</i> Page & Treadaway, 2003	<i>gulam</i> = <i>Papilio clytia gulam</i>	Page & Treadaway, 2003		Crislam River, Abong Abong, Zamboanga del Sud Sud-ouest de Mindanao Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) clytia flavolimbatus</i> (Oberthür, 1879)	<i>flavolimbatus</i> = <i>Papilio dissimilis var. flavolimbatus</i> = <i>Chilasa clytia flavolimbatus</i>	(Oberthür, 1879)		Andamans Inde
<i>Chilasa (Chilasa) clytia lacedemon</i> (Fabricius, 1793)	<i>lacedemon</i> = <i>Papilio lacedemon</i>	(Fabricius, 1793)		Malabar Sud-ouest de l' Inde
<i>Chilasa (Chilasa) clytia palephates</i> (Westwood, 1845)	<i>palephates</i> = <i>Papilio palephates</i> = <i>Papilio clytia palephatides</i> = <i>Chilasa clytia palephatides</i> = <i>Papilio clytia palephates</i> = <i>Papilio clytia saporés</i>	(Westwood, 1845)		Camiguin de Luzon, Catanduanes, Luzon, Marinduque, Mindoro, Negros, Panay, Samar, Siquijor, Batan Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) clytia panopinus</i> (Staudinger, 1889)	<i>panopinus</i> = <i>Papilio panope var. panopinus</i> = <i>Papilio cuyo</i> = <i>Papilio clytia panopinus</i>	(Staudinger, 1889)		Balabac, Busuanga, Calamian, Cuyo group, Dumaran, Palawan Philippines

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
<i>Chilasa (Chilasa) clytia partidu</i> Page & Treadaway, 2003	<i>partidu</i>	Page & Treadaway, 2003			Tugas, Jolo Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) clytia takizawai</i> Myashita, 1980	<i>takizawai</i> = <i>Papilio clytia takizawai</i>	Myashita, 1980			Flores Indonésie
<i>Chilasa (Chilasa) clytia visayensis</i> Okano & Okano, 1987	<i>visayensis</i> = <i>Papilio clytia visayensis</i>	Okano & Okano, 1987			Basilan, Bohol, Cebu, Jolo, Leyte, Mindoro, Negros, Panay, Samar, Siquijor Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) paradoxa aenigma</i> Wallace, 1865	<i>paradoxa aenigma</i> = <i>Papilio butleri</i> = <i>Papilio velutinus</i> = <i>Papilio penomimus</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles m. ab. distanti</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles f. ab. nepticula</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. nepticula</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles f. ab. haasei</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. haasei</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles f. ab. haasei</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. aenigma</i> = <i>Chilasa paradoxa f.f. andromina</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. andromina</i> = <i>Papilio eucyana</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. eucyana</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. aenigma</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles m. ab. butleri</i> = <i>Papilio butleri fuscus</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles m. ab. aenigma</i> = <i>Papilio caunus r. aegialus</i> = <i>Papilio caunus aegialus</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. aegialus</i> = <i>Papilio kerosa</i> = <i>Chilasa paradoxa f.m. eucyanoides</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles ab.m. kerosa</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. kerosa</i> = <i>Papilio paradoxa ab. leucothoides</i> = <i>Papilio schönbergianus</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles ab.f. leucothoides</i> = <i>Chilasa paradoxa aenigma f. leucothoides</i>	Wallace, 1865	Copie le mâle d' <i>Euploea mulciber</i>		Ranong, Surat Thani, Yala Sud de la Thaïlande, Malaisie, Singapour, Sumatra, Bangka Indonésie
<i>Chilasa (Chilasa) paradoxa melanostoma</i> Jordan, 1909	<i>melanostoma</i> = <i>Chilasa paradoxa melanostoma</i>	Jordan, 1909			Palawan Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) paradoxa mesades</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>mesades</i> = <i>Papilio caunus mesades</i> = <i>Papilio paradoxa mesades</i>	(Fruhstorfer, 1908)			Batu island Indonésie
<i>Chilasa (Chilasa) paradoxa niasicus</i> (Rothschild, 1895)	<i>niasicus</i> = <i>Papilio paradoxus niasicus</i> = <i>Papilio paradoxaniasicus</i>	(Rothschild, 1895)			Nias Indonésie
<i>Chilasa (Chilasa) paradoxa paradoxa</i> (Zinken, 1831)	<i>paradoxa</i> = <i>Zelima paradoxa</i> = <i>Papilio paradoxa</i> = <i>Papilio zanoa</i> = <i>Papilio juda</i> = <i>Papilio caunus</i> = <i>Papilio caunus mendax</i> = <i>Papilio paradoxus</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles ab.f. juda</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles ab.f. eanoa</i> = <i>Chilasa paradoxa</i> = <i>Papilio paradoxa paradoxa</i>	(Zinken, 1831)	Pnc: <i>Cinnamomum</i> , <i>Litsea</i>	Localisé et peu commun	Java Indonésie
<i>Chilasa (Chilasa) paradoxa telearchus</i> (Hewitson, 1852)	<i>telearchus</i> = <i>Papilio telearchus</i> = <i>Papilio danisepa</i> = <i>Eupleopsis telearchus</i> = <i>Papilio paradoxus telearchus</i> = <i>Papilio caunus danisepa</i> = <i>Chilasa paradoxa telearchus f. daniseppa</i> = <i>Papilio paradoxa telearchus</i> = <i>Chilasa paradoxa f. daniseppa</i>	(Hewitson, 1852)		Copie <i>Euploea diocletiana</i>	Sylhet Bangladesh, Assam Inde, Dong Nai Nord du Vietnam, Nan, Sakon Nakhon, Trat Thaïlande, Vientiane, Thabok, Hinboun, Lak Sao Laos, Sud de la Birmanie, Sud du Yunnan Chine
<i>Chilasa (Chilasa) paradoxa telesicles</i> (C. & R. Felder, 1864)	<i>telesicles</i> = <i>Papilio telesicles</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles ab.f. daja</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles ab.f. russus</i> = <i>Papilio paradoxus telesicles</i> = <i>Chilasa paradoxa telesicles f. kerosa</i> = <i>Chilasa paradoxa telesicles f. daja</i> = <i>Chilasa paradoxa telesicles f. mendex</i>	(C. & R. Felder, 1864)			Borneo Malaisie et Indonésie
	Groupe des <i>veiovis</i>				
<i>Chilasa (Chilasa) veiovis veiovis</i> (Hewitson, 1865)	<i>veiovis</i> = <i>Papilio veiovis</i> = <i>Papilio veiovis aristyllos</i> = <i>Papilio veiovis samanganus</i>	(Hewitson, 1865)		pas rare	Sulawesi Indonésie
	Groupe des <i>laglaizei</i>				
<i>Chilasa (Chilasa) laglaizei laglaizei</i> (Depuiset, 1877)	<i>laglaizei</i> = <i>Papilio laglaizei</i> = <i>Papilio alcidinus</i> = <i>Papilio kumiokae</i> = <i>Papilio laglaizei ab. wahnesi</i> = <i>Papilio laglaizei mukaensis</i> = <i>Papilio laglaizei maraganus</i>	(Depuiset, 1877)	Pnc: <i>Litsea</i>	Localisé mais pas rare. Copie <i>Alcides agathyrus</i>	Muka, Waigeu, Ouest de l'Irian Indonésie, Maraga, Astrolabe Bay Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Chilasa (Chilasa) moerneri mayrhoferi</i> (Bang-Haas, 1939)	<i>moerneri mayrhoferi</i> = <i>Papilio moerneri mayrhoferi</i>	(Bang-Haas, 1939)		extrêmement rare	Sud-est Baininger Alpen, Nouvelle Bretagne Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Chilasa (Chilasa) moerneri moerneri</i> (Aurivillius, 1919)	<i>moerneri</i> = <i>Papilio mörneri</i> = <i>Papilio moerneri moerneri</i>	(Aurivillius, 1919)		rappelle <i>toboroi</i>	Neumecklenburg Nouvelle Irlande Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Chilasa (Chilasa) toboroi toboroi</i> (Ribbe, 1907)	<i>toboroi</i> = <i>Papilio laglaizei toboroi</i> = <i>Papilio toboroi toboroi</i> = <i>Papilio toboroi reductus</i>	(Ribbe, 1907)		Localisé mais pas rare.	Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Chilasa (Chilasa) toboroi straatmani</i> (Racheli, 1979)	<i>straatmani</i> = <i>Papilio toboroi straatmani</i>	(Racheli, 1979)			Holibara Santa Isabel îles Salomons
	Groupe des <i>?</i>				
<i>Chilasa (Chilasa) osmana cabale</i> Page & Treadaway, 2003	<i>osmana cabale</i> = <i>Papilio osmana cabale</i>	Page & Treadaway, 2003		IV-V extrêmement rare	Tandag, Surigao, Nord-est de Mindanao Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) osmana osmana</i> (Jumalon, 1967)	<i>osmana</i> = <i>Papilio osmana</i>	(Jumalon, 1967)			Sud de Leyte Philippines
<i>Chilasa (Chilasa) carolinensis</i> (Jumalon, 1967)	<i>carolinensis</i> = <i>Papilio carolinensis</i>	(Jumalon, 1967)		II,III et IV extrêmement rare	Est et Sud-est de Mindanao Philippines
Meandrusa Moore, 1888	Meandrusa = Dabasa	Moore, 1888			
<i>Meandrusa gyas</i> (Westwood, 1841)	<i>gyas</i> = <i>Papilio gyas</i> = <i>Dabasa gyas</i>	(Westwood, 1841)			Sikkim, Assam Inde, Nord du Myanmar
<i>Meandrusa payeni brunei</i> (Fruhstorfer, 1894)	<i>payeni brunei</i> = <i>Papilio brunei</i> = <i>Papilio payeni brunei</i>	(Fruhstorfer, 1894)			Brunei, Nord de Borneo, Sud-est de Sumatra, Kalimantan Indonésie
<i>Meandrusa payeni ciminius</i> (Fruhstorfer, 1909)	<i>ciminius</i> = <i>Papilio payeni ciminius</i> = <i>Papilio amphix</i> = <i>Meandrusa ordan</i>	(Fruhstorfer, 1909)	Pnc: <i>Litsea cubeba</i>		Sud du Myanmar, Surat Thani Sud de la Thaïlande, Péninsule malaise Malaisie, Padang Nord-ouest de Sumatra Indonésie
<i>Meandrusa payeni evan</i> (Doubleday, 1845)	<i>evan</i> = <i>Papilio evan</i> = <i>Papilio payeni evan</i> = <i>Papilio evan evanides</i>	(Doubleday, 1845)			Sikkim, Assam Inde, Bhoutan
<i>Meandrusa payeni hegylus</i> (Jordan, 1909)	<i>hegylus</i> = <i>Papilio payeni hegylus</i>	(Jordan, 1909)			Hainan Chine
<i>Meandrusa payeni langsonensis</i> (Fruhstorfer, 1901)	<i>langsonensis</i> = <i>Papilio payeni langsonensis</i>	(Fruhstorfer, 1901)			Mae Hong Son, Chiang Rai, Nan Nord de la Thaïlande, Thabok, Cham Pasak Laos, Chiem Hoa, Hoang Lien Son, Lam Dong Nord du Vietnam
<i>Meandrusa payeni payeni</i> (Boisduval, [1836])	<i>payeni</i> = <i>Papilio payeni</i> = <i>Dabasa payeni</i>	(Boisduval, [1836])		peu commun	Java Indonésie
<i>Meandrusa sciron abaensis</i> Sugiyama, 1994	<i>sciron abaensis</i>	Sugiyama, 1994			Nord du Mt. Signiang Sichuan Chine

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018	
Meandrusa sciron arribas (Fruhstorfer, 1909)	arribas (Fruhstorfer, 1909) = <i>Papilio gyas aribbas</i> = Meandrusa lachinus arribas	Nord du Myanmar, Chiang Mai, Tak, Chaïyaphum Nord de la Thaïlande, Lao Cai, Ha Giang, Vinh Phu Nord du Vietnam
Meandrusa sciron hajangensis Funahashi, 2003	hajangensis Funahashi, 2003 = Meandrusa hercules hajangensis	Haijiang Nord du Vietnam
Meandrusa sciron helenusoides Funahashi, 2003	helenusoides Funahashi, 2003 = Meandrusa gyas helenusoides = Meandrusa sciron dalata = Meandrusa lachinus helenusoides	Bao Lac, Dalat, Bi Doup-Nui Ba Nature Reserve, Dong Mang District, Dambri, Dai Duc Me, Lam Dong Sud du Vietnam
Meandrusa sciron lachinus (Fruhstorfer, 1902)	lachinus (Fruhstorfer, 1902) = <i>Papilio gyas lachinus</i>	Protégé en Inde
Meandrusa sciron nagamasai Okano, 1986	nagamasai Okano, 1986 = Meandrusa gyas nagamasai = Meandrusa lachinus nagamasai	Ranong, Khao Poata, Surat Thanl, Sud de la Thaïlande
Meandrusa sciron sciron (Leech, 1890)	sciron (Leech, 1890) = <i>Papilio sciron</i> = <i>Papilio gyas</i> var. <i>hercules</i> = <i>Papilio hercules</i>	Local mais pas rare
Meandrusa sciron sukkiti Nakano, 1995	sukkiti Nakano, 1995 = Meandrusa gyas sukkiti = Meandrusa lachinus sukkiti	Doi Phu Kha, Nan, Nord-est de la Thaïlande, Vu Quang, Huang Son, centre du Vietnam, Cham Pasak, Xam Neua, Lak Sao Laos
Papilio Linnaeus, 1759	Papilio = Pterourus = Princeps = Amaryssus = Jasoniades = Euphoeades = Heraclides = Achillides = Orpheides = Nestorides = Calaiides = Priamides = Pyrrhosticta = Iliades = Menelaides = Troilides = Thoas = Aemauta = Caudati = Druryia = Harimala = Charus = Sarbaria= Sainia = Araminta = Pangeranopsis = Panosmiopsis= Tamera = Achivus = Eques = Icarus = Melindopsis = Iterus = Sadengia = Heterocreon = Mimbyasa = Motasiona = Eleponne	Linnaeus, 1759
	Sous-genre : Papilio = Amaryssus = Aemauta = Achivus	Linnaeus, 1758
	Groupe des machaon	
Papilio (Papilio) alexanor alexanor Esper, 1800	alexanor alexanor Esper, 1800 = <i>Papilio alexanor</i> = <i>Papilio poldamas</i> = <i>Papilio alexanor polychaon</i>	Pnc: Ombellifères, <i>Trinia vulgaris</i> , <i>Seseli montanum</i> , <i>S. libanotis</i> , <i>Ptychotis heterophylla</i> , <i>Falcaria vulgaris</i> , <i>Torilis heterophylla</i> , <i>Ferula karategina</i> , <i>F. uganica</i> L'Alexanor; Le Grand Sélésier
Papilio (Papilio) alexanor atticus Verity, [1911]	atticus Verity, [1911] = <i>Papilio alexanor graecus</i>	V-VII peu commun. Protégé en France
Papilio (Papilio) alexanor destelensis Nel & Chauliac, 1983	destelensis Nel & Chauliac, 1983	Isère, Drôme, Var, Vaucluse, Alpes-d-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes France
Papilio (Papilio) alexanor eitschbergeri Bolino & Sala, 1992	eitschbergeri Bolino & Sala, 1992	Sainte-Anne-d'Evenos Sud-ouest du Var France
Papilio (Papilio) alexanor judaeus Staudinger, 1893	judaeus Staudinger, 1893 = <i>Papilio alexanor</i> var. <i>judaeus</i> = <i>Papilio alexanor</i> var. <i>maccabaeus</i> = <i>Papilio poldamas orientalis</i> ab. <i>maccabaeus</i>	Manolates Ile Samos, Ile Lesbos Grèce
Papilio (Papilio) alexanor orientalis Romanov, 1884	orientalis Romanov, 1884 = <i>Papilio alexanor</i> var. <i>orientalis</i> = <i>Papilio poldamas orientalis</i> = <i>papilio alexanor hazarajatica</i>	Jerusalem Israël, Liban, Jordanie, Syrie?
Papilio (Papilio) alexanor radighierii Sala & Bollino, 1991	radighierii Sala & Bollino, 1991 Pnc: <i>Trinia glauca</i>	Ordoubad Arménie, Joshanak Valley, Sud de Band-i-Amir, Ouest de Koh-i-Baba Mts. Afghanistan, Kopet-Dagh, Sud de Ghissar Kazakhstan
Papilio (Papilio) alexanor voldemar Kreuzberg, 1989	voldemar Kreuzberg, 1989	Valdieri Piémont Italie
Papilio (Papilio) breviceauda bretonensis McDunnough, 1939	breviceauda bretonensis McDunnough, 1939	Aktash valley, Karzantau mountain range Ouzbékistan, Ouest du Tian-Shan
Papilio (Papilio) breviceauda breviceauda Saunders, 1869	breviceauda Saunders, 1869 = <i>Papilio breviceauda</i> = <i>Papilio asterius</i> = <i>Papilio anticostiensis</i> = <i>Papilio medicandus</i> = <i>Papilio machaon breviceauda</i>	rive Nord du Nouveau-Brunswick, île du Cap Breton Nouvelle-Ecosse, île du Prince-Edouard Provinces maritimes Canada
Papilio (Papilio) breviceauda gaspeensis McDunnough, 1934	gaspeensis McDunnough, 1934	Sud du Labrador, Terre-Neuve, île d'Anticosti Canada
Papilio (Papilio) hospiton Gené, 1839	hospiton Gené, 1839 Pnc: Ombellifères, <i>Foeniculum vulgare</i>	Le Porte-Queue de Corse; Le Grand Féruilier
Papilio (Papilio) indra bonnevillensis Whaley, 2000	indra bonnevillensis Whaley, 2000	Protégé. CITES annexe I
Papilio (Papilio) indra calcicola Emmel & Griffin, 1998	calcicola Emmel & Griffin, 1998	Sardaigne Italie, Corse France
Papilio (Papilio) indra fordii Comstock & Martin, 1956	fordii Comstock & Martin, 1956	
Papilio (Papilio) indra indra Reakirt, 1866	indra Reakirt, 1866 Pnc: <i>Cymopterus purpurea</i> , <i>C. panamintensis</i> <i>autifolius</i> , <i>Aletes acaulis</i> , <i>Harbouria trachypleura</i> , <i>Lomatium lucidum</i> , <i>L. parryi</i> , <i>L. nuttallii</i> , <i>L. eastwoodi</i> , <i>L. marginatum</i> , <i>L. scabrum</i> , <i>L. latilobum</i> , <i>L. junceum</i> , <i>L. grayi</i> , <i>L. triternatum</i> , <i>L. dissectum</i> <i>multifidum</i> , <i>Pteryxia hendersonii</i> , <i>P. petraea</i> , <i>P. terebinthina californica</i> , <i>Tauschia parischii</i> , <i>T. arguta</i> , <i>Thamnosma montana</i> , <i>Musineon tenuifolium</i>	V-VI peu commun
Papilio (Papilio) indra kaibabensis Bauer, 1955	kaibabensis Bauer, 1955	Manning Sud de la Colombie britannique Canada, Nord-est du Washington, Nord-est de l'Oregon, Idaho, Montana, Nord de l'Utah, Ouest du Colorado Nord-ouest des USA
Papilio (Papilio) indra martini T. & J. Emmel, 1966	martini T. & J. Emmel, 1966	Nord de l'Arizona, Sud de l'Utah USA
Papilio (Papilio) indra minori Cross, 1937	minori Cross, 1937	Providence Moutains, San Bernardino Co. Nord-est du Mohave Desert Californie USA
Papilio (Papilio) indra nevadensis T. & J. Emmel, 1971	nevadensis T. & J. Emmel, 1971	Ouest du Colorado, Est de l'Utah, Nord-ouest du Nouveau-Mexique, Nord-est de l'Arizona USA
Papilio (Papilio) indra panamintensis Emmel, 1982	panamintensis Emmel, 1982	Centre et Nord du Nevada USA
Papilio (Papilio) indra pygmaeus J. Emmel, T. Emmel & Griffin, 1998	pygmaeus J. Emmel, T. Emmel & Griffin, 1998 = <i>Papilio indra parvindra</i>	Panamints Mtns., Death valley region Californie USA
Papilio (Papilio) indra pergamus H. Edwards, 1874	pergamus H. Edwards, 1874	Dead Mtns. San Bernardino Californie USA
Papilio (Papilio) indra phyllisae Emmel, 1982	phyllisae Emmel, 1982	Los Angeles, Ouest de San Berdo, Riverside, San Diego cos. Ouest de la Californie USA
Papilio (Papilio) indra shastensis Emmel & Emmel, 1998	shastensis Emmel & Emmel, 1998	Sud de la Sierra Nevada Californie USA
Papilio (Papilio) joanae J.R. Heitzman, 1973	joanae J.R. Heitzman, 1973 Pnc: <i>Thaspium barbinode</i> , <i>Taenidia integerrima</i> , <i>Zizia</i> sp.	Napa Co. Nord-ouest de la Californie, Sud-ouest de l'Oregon USA
Papilio (Papilio) machaon alaska Scudder, 1869	machaon alaska Scudder, 1869 = <i>Papilio alaska</i> = <i>Papilio machaon joannisii</i> = <i>Papilio machaon petersii</i>	Ozarks Mountains Missouri, Arkansas, Oklahoma, Kansas USA
Papilio (Papilio) machaon archias Fruhstorfer, 1907	archias Fruhstorfer, 1907	Chukot Peninsula Russie, Alaska USA, Yukon, Territoires du Nord-ouest, Nord de la Colombie britannique Canada
		Fou-Lin Sud du Sichuan Chine

[illegible]

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
<i>Papilio (Papilio) polyxenes asterius</i> Stoll, 1782	<i>asterius</i> = <i>Papilio asterius</i> = <i>Papilio asterius</i> var. <i>ampliata</i> = <i>Papilio calverleyi</i> = <i>Papilio asterioides</i> = <i>Papilio asterias</i> var. <i>viridis</i> = <i>Papilio asterias</i> var. <i>alunata</i> = <i>Papilio mediocauda</i> = <i>Papilio asterias</i> var. <i>semi-alba</i> = <i>Papilio asterias</i> var. <i>curvifascia</i> = <i>Papilio polyxenes</i> ab. <i>masculina</i> = <i>Papilio asterias</i> ab. <i>ehrmanni</i> = <i>Papilio asterius</i> f. <i>gertrudis</i> = <i>Papilio polyxenes</i> ab. <i>forsythae</i> = <i>Papilio polyxenes astyanax</i> = <i>Papilio ajax</i> = <i>Papilio ajax</i> f. <i>pseudoamericus</i> = <i>Papilio gracehus</i> = <i>Papilio</i> f. <i>subamplicata</i> = <i>Papilio polyxenes troilus</i> = <i>Papilio alunata</i> = <i>Papilio polyxenes calverleyi</i> = <i>Papilio polyxenes alunata</i> = <i>Papilio polyxenes semialba</i> = <i>Papilio polyxenes curvifascia</i>	Stoll, 1782	Pnc: <i>Angelica ampla</i> , <i>A. atropurea</i> , <i>A. venenosa</i> , <i>Anethum graveolens</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Conium maculatum</i> , <i>Daucus pusillus</i> , <i>D. carota</i> , <i>Cryptotaenia canadensis</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Harbouria trachyleura</i> , <i>Heracleum lanatum</i> , <i>Levisticum officinale</i> , <i>Ligusticum scoticum</i> , <i>Berula erecta</i> , <i>Osmorhiza longistylis</i> , <i>Oxypolis canbyi</i> , <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Prilimum capillaceum</i> , <i>Carum carvi</i> , <i>Cicuta maculata</i> , <i>C. bulbifera</i> , <i>C. douglasii</i> , <i>Sium suave</i> , <i>Spermolepis divaricata</i> , <i>Taenidia integerrima</i> , <i>Thaspium barbinode</i> , <i>Thamnosma texana</i> , <i>Ruta graveolens</i> , <i>Dictamnus albus</i> , <i>Musineon tenuifolium</i> , <i>Oxypolis rigidior</i> , <i>Zizia aurea</i>	V-VI et VII-VIII	Sud du Manitoba, Nord-ouest et Sud de l'Ontario, Quebec, Provinces Maritimes Canada , Est, Centre et Sud des USA , Mexique à Nicaragua
<i>Papilio (Papilio) polyxenes coloro</i> Wright, 1905	<i>coloro</i> = <i>Papilio coloro</i> = <i>Papilio bairdii</i> f. <i>rudkini</i> = <i>Papilio rudkini</i> = <i>Papilio rudkini</i> f. <i>clarki</i> = <i>Papilio rudkini</i> f. <i>comstocki</i>	Wright, 1905	Pnc: <i>Daucus carota</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Cymopterus panamintensis acutifolius</i> , <i>Tauschia parishii</i> , <i>T. arguta</i> , <i>Thamnosma monana</i> , <i>Ruta graveolens</i>		Déserts du Centre de l'Arizona, du Sud de la Californie, du Sud du Nevada et du Sud de l'Utah USA
<i>Papilio (Papilio) polyxenes gerardi</i> Bollino & Vitale, 2002	<i>gerardi</i>	Bollino & Vitale, 2002			Pérou
<i>Papilio (Papilio) polyxenes kahli</i> Chermock, 1937	<i>kahli</i> = <i>Papilio kahli</i> = <i>Papilio kahli</i> f. <i>comstocki</i>	Chermock, 1937	<i>Daucus carota</i> , <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Zizia aurea</i> , <i>Z. aptera</i>		Saskatchewan, Manitoba USA
<i>Papilio (Papilio) polyxenes polyxenes</i> Fabricius, 1775	<i>polyxenes</i> = <i>Papilio polyxenes</i> = <i>Papilio amplicata</i> ? = <i>Papilio polyxenes amplicata</i> = <i>Papilio philoxenes</i>	Fabricius, 1775	Pnc: <i>Daucus carota</i> , <i>Apiaceae</i> , <i>Rutaceae</i> , <i>Ruta graveolens</i> , <i>Thamnosma texana</i> , <i>Apium leptophyllum</i> , <i>Foeniculum vulgare</i>	Commun	Cuba
<i>Papilio (Papilio) polyxenes sadalus</i> Lucas, 1852	<i>sadalus</i> = <i>Papilio sadalus</i>	Lucas, 1852			Equateur
<i>Papilio (Papilio) polyxenes stabilis</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>stabilis</i> = <i>Papilio asterius</i> ab. <i>streckeri</i>	Rothschild & Jordan, 1906	Pnc: <i>Apium leptophyllum</i> , <i>Foeniculum vulgare</i>		Costa Rica, Ouest du Panama
<i>Papilio (Papilio) saharae rathjensi</i> Warnecke, 1932	<i>saharae rathjensi</i>	Warnecke, 1932	Pnc: <i>Ferula sinaica</i> , <i>Pyncocycla glauca</i>		Yemen, Sud-ouest de l'Arabie Saoudite
<i>Papilio (Papilio) saharae saharae</i> Oberthür, 1879	<i>saharae</i> = <i>Papilio machaon</i> var. <i>saharae</i> = <i>Papilio machaon</i> var. <i>hospitonides</i> = <i>Papilio machaon saharae</i> f. <i>xanthostoma</i>	Oberthür, 1879	Pnc: <i>Deverra scopularia</i> , <i>D. chloranthus</i> , <i>D. tortuosus</i> , <i>Seseli varium</i>		Maroc à Est de l'Arabie
<i>Papilio (Papilio) zelicaon nitra</i> Edwards, 1883	<i>zelicaon nitra</i> = <i>Papilio nitra</i> = <i>Papilio gothica</i> = <i>Papilio indra nitra</i>	Edwards, 1883	Pnc: <i>Anthem graveolens</i> , <i>Angelica ampla</i> , <i>Harbouria trachyleura</i> , <i>Heracleum lanatum</i> , <i>Zizia aptera</i> , <i>Lomatium nuttallii</i> , <i>Musineon tenuifolium</i>	V-VIII	Montana, Colorado USA , Versant est des Montagnes Rocheuses à Sud-est du Saskatchewan Canada
<i>Papilio (Papilio) zelicaon zelicaon</i> Lucas, 1852	<i>zelicaon</i> = <i>Papilio zelicaon</i> = <i>Papilio zelicaon</i> ab. <i>formosa</i> = <i>Papilio zelicaon</i> ab. <i>impunctata</i> = <i>Papilio zelicaon</i> ab. <i>melanotaenia</i> = <i>Papilio zelicaon</i> tr.f. <i>mcLunnoughi</i> = <i>Papilio macLunnoughi</i> = <i>Papilio formosus</i> = <i>Papilio zelicaon</i> = <i>Papilio machaon</i> var. <i>californica</i> = <i>Papilio polyxenes zelicaon</i>	Lucas, 1852	Pnc: <i>Anthem graveolens</i> , <i>Angelica ampla</i> , <i>A. arguta</i> , <i>A. hendersonii</i> , <i>A. kingii</i> , <i>A. lineariloba</i> , <i>A. tomentosa</i> , <i>A. lucida</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Cicuta maculata</i> , <i>Conioselinum scopulorum</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>D. pusillus</i> , <i>Conium maculatum</i> , <i>Carum carvi</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Harbouria trachyleura</i> , <i>Heracleum lanatum</i> , <i>Ligusticum porteri</i> , <i>L. grayi</i> , <i>Lomatium nuttallii</i> , <i>L. californicum</i> , <i>L. dasycarpum</i> , <i>L. urticulatum</i> , <i>L. grayi</i> , <i>L. parryi</i> , <i>L. triternatum</i> , <i>L. marginatum</i> , <i>L. martindalei</i> , <i>L. dissectum multifidum</i> , <i>Oenanthe sarmentosa</i> , <i>Zizia aptera</i> , <i>Pseudocymopterus montanus</i> , <i>Pimpinelle</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Pteryxia hendersoni</i> , <i>P. petraea</i> , <i>P. terebenthina californica</i> , <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Perideridia bolanderi</i> , <i>P. gairdneri</i> , <i>P. kelloggii</i> , <i>Sphenosciadium capitellatum</i> , <i>Tauschia arguta</i> , <i>T. parishii</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>C. limon</i> , <i>Ruta graveolens</i>	Commun	Côte pacifique de la Colombie britannique, Alberta, Sud-ouest du Saskatchewan Canada à la Californie USA , Nord de Baja California Mexique
	Sous-genre : <i>Sinoprinceps</i>	Hancock, 1983			
	Groupe des <i>xuthus</i>				
<i>Papilio (Sinoprinceps) benguetana</i> Joicey & Talbot, 1923	<i>benguetana</i> = <i>Papilio benguelana</i> ? = <i>Papilio benguetanus</i> = <i>Sinoprinceps benguetana</i> = <i>Papilio xuthus benguetanus</i>	Joicey & Talbot, 1923		pas rare	Benguet District Nord de Luzon Philippines
<i>Papilio (Sinoprinceps) xuthus</i> Linnaeus, 1767	<i>xuthus</i> = <i>Papilio xanthus</i> = <i>Papilio xuthulus</i> = <i>Papilio xuthulinus</i> = <i>Papilio xanthus koxinga</i> = <i>Papilio xanthus neoxuthus</i> = <i>Sinoprinceps xuthus</i> = <i>Papilio xanthus</i> ab. <i>gen. vern. xuthulus</i> = <i>Papilio xanthus</i> ab. <i>gen. aest. xanthus</i> = <i>Papilio xuthus</i> ab. <i>chinensis</i> = <i>Papilio xanthus xuthulus</i> f. <i>hondoensis</i> = <i>Papilio neoxanthus</i> f. <i>xuthina</i> = <i>Papilio xuthus</i> ab. <i>igneus</i> = <i>Papilio xuthus xuthus</i> ab. <i>feminisimilis</i> = <i>Papilio xuthus neoxuthus</i> f. <i>ochrea</i>	Linnaeus, 1767	Pnc: <i>Phellodendron amurense</i> , <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Zanthoxylum alanthoides</i> , <i>Z. nitidum</i> , <i>Citrus</i> , <i>Eudodia rucaerpa</i>	V-VIII Commun	Nord du Myanmar, Ha Giang Nord du Vietnam, Taiwan, Yunnan, Est de la Chine à Corée, Ussuri, Amour, Sakhaline, Iles Kouriles Russie , Japon, Guam, Hawaii, Midway Islands, Wake Islands Sud du Pacifique USA
	Sous-genre : <i>Eleponne</i>	Hancock, 1979			
<i>Papilio (Eleponne) anactus</i> W.S. MacLeay, 1826	<i>anactus</i> = <i>Eleponne anactus</i>	W.S. MacLeay, 1826	Pnc: <i>Citrus paradisi</i> , <i>C. limon</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Eremocitrus glauca</i> , <i>Limonia acidissima</i> , <i>Microcitrus australasica</i> , <i>M. australis</i> , <i>M. garrawayae</i> , <i>M. inodora</i>	Commun	Queensland, Nouvelles Galles du Sud Australie
	Sous-genre : <i>Princeps</i> = <i>Orpheides</i>	Hübner, [1807]			
	Groupe des <i>dardanus</i>				
<i>Papilio (Princeps) constantinus constantinus</i> Ward, 1871	<i>constantinus constantinus</i> = <i>Papilio constantinus</i> = <i>Princeps constantinus</i> = <i>Papilio constantinus</i> f. <i>chrysotemis</i> = <i>Princeps constantinus constantinus</i>	Ward, 1871	Pnc: <i>Clausena anisata</i> , <i>Vepris reflexa</i> , <i>V. undulata</i> , <i>V. lanceolata</i> , <i>Citrus</i> , <i>Teclea trifoliatum</i> , <i>T. nobilis</i> , <i>T. gerrardii</i>	pas rare	Natal, Transvaal Afrique du Sud , Swaziland, Est du Bostwana, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Sud et Nord-est de la Zambie, Tanzanie, Côte du Kenya, Sud de la Somalie, Sud-est de l' Ethiopie
<i>Papilio (Princeps) constantinus lecerfi</i> Koçak, 1996	<i>lecerfi</i> = <i>Papilio constantinus lecerfi</i> = <i>Papilio constantinus alticola</i> = <i>Papilio constantinus monticolus</i> = <i>Princeps constantinus lecerfi</i>	Koçak, 1996			Central highlands, Mau Escarpment Kenya

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Papilio (Princeps) constantinus mweruanus</i> Joicey & Talbot, 1927	<i>mweruanus</i> = <i>Papilio constantinus mweruana</i> = <i>Papilio constantinus f. mathieui</i> = <i>Papilio constantinus mweruana f. wittei</i> = <i>Princeps constantinus mweruanus</i>	Joicey & Talbot, 1927		Lomami, Shaba République démocratique du Congo, Ouest de la Tanzanie, Zambie
<i>Papilio (Princeps) dardanus antinorii</i> Oberthür, 1883	<i>dardanus antinorii</i> = <i>Papilio antinorii</i> = <i>Papilio dardanus hodsoni</i> = <i>Papilio antinorii f.ab. niavoides</i> = <i>Papilio antinorii f.ab. ruspinæ</i> = <i>Papilio merope antinorii var. niavina</i> = <i>Papilio dardanus antinorii var. alticola</i> = <i>Papilio dardanus hodsoni f.f. weinholti</i> = <i>Papilio dardanus f.f. zaoditou</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. alameitu</i> = <i>Papilio dardanus f.m. conjunctiflava</i> = <i>Papilio dardanus antinorii ab. seriata</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. immaculata</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. extensinigra</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. obsoleta</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. ornata</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. rufomaculata</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. aurantica</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. aperta</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. depuncta</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. parvicaudata</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. ceneaoides</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. streckerioides</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. lambornieoides</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. niobeoides</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. salaamoides</i> = <i>Princeps dardanus antinorii</i>	Oberthür, 1883		Yumbo, Province de Gaba, Highlands Sud-ouest de l’Ethiopie
<i>Papilio (Princeps) dardanus byatti</i> Poulton, 1926	<i>byatti</i> = <i>Princeps dardanus byatti</i>	Poulton, 1926		Highlands du Nord de la Somalie
<i>Papilio (Princeps) dardanus cenea</i> Stoll, [1790]	<i>cenea</i> = <i>Papilio cenea</i> = <i>Papilio cenea acene</i> = <i>Papilio dardanus cephonius</i> = <i>Papilio merope tibullus var. hippocoönides</i> = <i>Papilio dardanus f.f. leighi</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. leighi</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. radiata</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. natalica</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. hypolimnides</i> = <i>Papilio dardanus cenea m.f.ind. extensiflava</i> = <i>Papilio dardanus cenea f. sylvicola</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. neocenea</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. nigricans</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. transiens</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. akeni</i> = <i>Papilio dardanus cenea f.f. infuscata</i> = <i>Danaïs rechila</i> = <i>Princeps dardanus cenea</i>	Stoll, [1790] Pnc: Xymalos monospra, teclæa swynnertoni, Vepris lanceolata, Toddalia aculeata, T. natalensis, Clausena inaequalis, Citus	Copie <i>Amauris echeria septentrionis</i>	Sud du Mozambique, Est du Zimbabwe, Swaziland, Afrique du Sud
<i>Papilio (Princeps) dardanus dardanus</i> Brown, 1776	<i>dardanus</i> = <i>Papilio dardanus</i> = <i>Princeps dardanus</i> = <i>Papilio dardanus heimsi</i> = <i>Papilio dardanus berio</i> = <i>Papilio dardanus f.ab. niobe</i> = <i>Papilio dardanus f.ab. niobeoides</i> = <i>Papilio f. latemarginatus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. sirius</i> = <i>Papilio dardanus ab. crocotus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. ceneispila</i> = <i>Papilio dardanus f. fagerskioldi</i> = <i>Papilio dardanus dardanus ab. punctata</i> = <i>Papilio dardanus dardanus ab. divisa</i> = <i>Papilio dardanus dardanus ab. bipunctata</i> = <i>Papilio dardanus dardanus ab. paradoxa</i> = <i>Papilio dardanus dardanus f.f. completa</i> = <i>Papilio dardanus dardanus f.f. subpunctata</i> = <i>Papilio dardanus dardanus f.f. dawanti</i> = <i>Papilio dardanus dardanus f.f. impunctata</i> = <i>Papilio dardanus dardanus f.f. jottirandi</i> = <i>Papilio dardanus dardanus f.f. extrema</i> = <i>Papilio dardanus f. semineles</i> = <i>Papilio dardanus f.f. trophonissa</i> = <i>Papilio dardanus ab. obscura</i> = <i>Papilio dardanus polytrophus f.f. alluaudi</i> = <i>Papilio merope</i> = <i>Papilio trophonius</i> = <i>Papilio dionysos</i> = <i>Papilio westermanni</i> = <i>Papilio hippocoön</i> = <i>Papilio brutus</i> = <i>Princeps dardanus dardanus</i>	Brown, 1776 Pnc: Vepris lanceolata, V. undlata, V. eugenifolia, Toddalia asiatica, Oricia swynnertoni, O. bachmanni, Clausena anisata, Citrus, Teclæa simplicifolia, T. nobilis, T. stuhlmanni, T. villosa, T. natalensis, Xymalos monospora, Calodendrum capense, Zanthoxylum		Senegal, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Sao Tome et Principe, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Angola, République démocratique du Congo, Ouest du lac Victoria, Province de Toro Ouest de l’Ouganda, Ouest du Kenya, Nord de la Zambie
<i>Papilio (Princeps) dardanus figinii</i> Storace, 1962	<i>figinii</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. vaccaroi</i> = <i>Papilio dardanus antinorii f.f. protoniavioides</i> = <i>Papilio dardanus figinii f.f. protomima</i> = <i>Princeps dardanus figinii</i>	Storace, 1962		Highlands d’Erythrée
<i>Papilio (Princeps) dardanus flavicornis</i> Carpenter, 1947	<i>flavicornis</i> = <i>Princeps dardanus flavicornis</i>	Carpenter, 1947		Mt. Kulal Nord-ouest du Kenya
<i>Papilio (Princeps) dardanus humbloti</i> Oberthür, 1888	<i>humbloti</i> = <i>Papilio humbloti</i> = <i>Princeps dardanus humbloti</i>	Oberthür, 1888		Grand Comore Comores
<i>Papilio (Princeps) dardanus meriones</i> C. & R. Felder, 1865	<i>meriones</i> = <i>Papilio meriones</i> = <i>Papilio dardanus meriones m.f.indiv. palæotypus</i> = <i>Princeps dardanus meriones</i>	C. & R. Felder, 1865	F. avec queues	Madagascar
<i>Papilio (Princeps) dardanus meseres</i> Carpenter, 1948	<i>meseres</i> = <i>Papilio merope f.f. planemoides</i> = <i>Papilio dardanus f.f. dionysoides</i> = <i>Papilio dardanus f.f. pentolipus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. mixtus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. acenides</i> = <i>Papilio dardanus f.f. swynnertoni</i> = <i>Papilio dardanus f.f. carpenteri</i> = <i>Papilio dardanus m.f. xanthocaudatus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. hippocoönatus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. dominicanoides</i> = <i>Papilio dardanus f.f. planematus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. epiplanemoides</i> = <i>Papilio dardanus xanthocaudatus f.f. briani</i> = <i>Princeps dardanus meseres</i>	Carpenter, 1948		Ouganda, Sud-ouest du Kenya, Ouest, sud et sud-est du lac Victoria Tanzanie
<i>Papilio (Princeps) dardanus ochraceana</i> Vane-Wright, 1995	<i>ochraceana</i> = <i>Princeps dardanus ochraceana</i> = <i>Papilio dardanus ochracea</i> = <i>Papilio dardanus cenea ochracea f.f. ochracea</i> = <i>Papilio dardanus ochracea f.f. atavica</i>	Vane-Wright, 1995		Mt. Marsabit, Mt. Nyiru Nord du Kenya
<i>Papilio (Princeps) dardanus polytrophus</i> Rothschild & Jordan, 1903	<i>polytrophus</i> = <i>Papilio dardanus tibullus f.f. dorippoides</i> = <i>Papilio dardanus f.f. speciosa</i> = <i>Papilio dardanus f.f. jeanneli</i> = <i>Papilio dardanus var. polytrophus f. punctimargo</i> = <i>Papilio dardanus polytrophus f.f. hippocoöninus</i> = <i>Papilio dardanus polytrophus f.f. albescens</i> = <i>Papilio dardanus polytrophus f.f. nigrescens</i> = <i>Papilio dardanus polytrophus f.f. acenoides</i> = <i>Papilio dardanus polytrophus f.f. trophonoides</i> = <i>Papilio dardanus polytrophus f.f. mixtoides</i> = <i>Papilio dardanus var. polytrophus f. protocenea</i> = <i>Papilio dardanus var. polytrophus f. astarte</i> = <i>Papilio dardanus m.f. nairobiensis</i> = <i>Papilio dardanus f.f. poultoni</i> = <i>Papilio dardanus nairobiensis f.f. akechia</i> = <i>Papilio dardanus nairobiensis f.f. neria</i> = <i>Papilio dardanus f.f. millari</i> = <i>Papilio dardanus f.f. babingtonia</i> = <i>Papilio dardanus nairobianus f.f. akechiana</i> = <i>Papilio dardanus nairobianus f.f. nerianna</i>	Rothschild & Jordan, 1903		Elmentella, Highlands de l’est de la Vallée du Rift Kenya

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Papilio (Princeps) dardanus sulfurea</i> Palisot de Beauvois, 1806	<i>sulfurea</i> = <i>Papilio sulfurea</i> = <i>Papilio dardanus storacei</i> = <i>Papilio dardanus sulfureus</i> = <i>Princeps dardanus sulfurea</i>	Palisot de Beauvois, 1806		SãoTomé et Principe, île de Bioko Guinée équatoriale
<i>Papilio (Princeps) dardanus tibbulus</i> Kirby, 1880	<i>tibbulus</i> = <i>Papilio tibulus</i> = <i>Papilio boosi</i> = <i>Papilio cenea maculatus</i> = <i>Papilio cenea discopunctatus</i> = <i>Papilio cenea salaami</i> = <i>Papilio dardanus f.f. trimeni</i> = <i>Papilio dardanus var. tibullus ab. gomia</i> = <i>Papilio dardanus tibullus f.f. lamborni</i> = <i>Papilio dardanus f.f. mombescus</i> = <i>Papilio dardanus f.f. melanoleuca</i> = <i>Princeps dardanus tibulus</i>	Kirby, 1880		Est du Kenya, Dar-es-Salaam, Est de la Tanzanie, Malawi, Zambie
<i>Papilio (Princeps) delalandei</i> Godart, [1824]	<i>delalandei</i> = <i>Papilio lalandei</i> = <i>Princeps delalandei</i> = <i>Papilio delalandi</i> = <i>Papilio delalande</i>	Godart, [1824]	commun	Madagascar
	Groupe des <i>demodocus</i>			
<i>Papilio (Princeps) demodocus bennetti</i> Dixey, 1898	<i>demodocus bennetti</i> = <i>Papilio bennetti</i> = <i>Princeps demodocus bennetti</i>	Dixey, 1898		île de Socotra Yémen
<i>Papilio (Princeps) demodocus demodocus</i> Esper, [1798]	<i>demodocus</i> = <i>Papilio demodocus</i> = <i>Princeps demodocus</i> = <i>Papilio demoleus var. nubila</i> = <i>Papilio demodocus decusdemo</i> = <i>Papilio demodocus albicans</i> = <i>Papilio demodocus ab. karema</i> = <i>Papilio demodocus ab. canel</i> = <i>Papilio demodocus ab. tessmanni</i> = <i>Papilio demodocus ab. confusus</i> = <i>Papilio demodocus f. epunctatus</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. minor</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. juncta</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. semijuncta</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. mathieui</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. houzeaui</i> = <i>Papilio demodocus f. longsdoni</i> = <i>Papilio demodocus aurantiorum</i> = <i>Papilio demodocus f. oblongula</i> = <i>Papilio demodocus f. viginta</i> = <i>Papilio demodocus f. adla</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. vreuricki</i> = <i>Papilio demodocus f. bennettoides</i> = <i>Papilio demodocus f. atromaculatus</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. duboisi</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. aurantiaca</i> = <i>Papilio demodocus demodocus ab. ochrea</i> = <i>Papilio demodocus ab. dufranei</i> = <i>Papilio demodocus ab. overlacti</i> = <i>Papilio demodocus f. confluens</i> = <i>Papilio demodocus f. continua</i> = <i>Papilio demodocus f. deminuta</i> = <i>Papilio demodocus f. flavocincta</i> = <i>Papilio demodocus ab. belonota</i> = <i>Papilio demodocus f. latevittata</i> = <i>Papilio demodocus f. pseudopraeses</i> = <i>Princeps demodocus demodocus</i>	Esper, [1798] Pnc: <i>Clausena inaequalis</i> , <i>Calodendron capense</i> , <i>Toddalia aculeata</i> , <i>T. lanceolata</i> , <i>Teclea natalensis</i> , <i>T. swynnertonii</i> , <i>Citrus</i> , <i>Fagara capensis</i> , <i>Ptaeroxylon utile</i> , <i>P. obliquum</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Bubo galbanum</i> , <i>B. gummiferum</i> , <i>Hippodromus alata</i> , <i>Phturanthos burchelli</i> , <i>Phelodendron amurense</i> , <i>Ptela trifoliata</i> , <i>Skimmia japonica</i> , <i>Archangelica officinalis</i> , <i>Deverra burchelli</i> , <i>Fagaropsis angolensis</i> , <i>Haplophyllum</i> , <i>Hippobromus pauciflorus</i> , <i>Oricia bachmannii</i> , <i>O. swynnertonii</i> , <i>Pseudospondias microcarpa</i> , <i>Ruta</i> , <i>Vepris lanceolata</i> , <i>Zanthoxylum capense</i> , <i>Z. celagoense</i>	Commun	Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Lesotho, Sud de l'Arabie saoudite, Yemen, îles du Cap vert, Comores, Madagascar, île Maurice, île de la Réunion
<i>Papilio (Princeps) demoleus demoleus</i> Linnaeus, 1758	<i>demoleus demoleus</i> = <i>Papilio demoleus</i> = <i>Princeps demoleus</i> = <i>Papilio erithonius</i> = <i>Papilio epius</i> = <i>Papilio erithonius var. demoleinus</i> = <i>Papilio demoleus libanuis</i> = <i>Papilio flavosignatus</i> = <i>Papilio ab. jordani</i> = <i>Papilio ab. oblitterata</i> = <i>Papilio ab. rubropunctata</i> = <i>Princeps demoleus demoleus</i> = <i>Papilio demoleus libanuis</i>	Linnaeus, 1758 Pnc: <i>Psoralea tenax</i> , <i>P. patens</i> , <i>P. cinerea</i> , <i>P. leucantha</i> , <i>P. pinnata</i> , <i>P. pustulata</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>Citrus limon</i> , <i>C. microcarpa</i> , <i>C. paradisi</i> , <i>Clausena excavata</i> , <i>Fortunella hindii</i> , <i>F. japonica</i> , <i>Fortunella hindii</i> , <i>F. japonica</i> , <i>Microcitrus australis</i> , <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> , <i>Z. nitidum</i> , <i>Ziziphus jujuba</i> , <i>Atalantia buxifolia</i>	Commun	Arabie Saoudite, Emirats arabes, Oman à Sri Lanka, Inde à Myanmar, Nord du Vietnam, Hainan et Sud de la Chine, Taiwan, Philippines, îles Talaud, îles Sangihe, Sarana îles Sula, Manado district Nord du Sulawesi Indonésie, Yonakuni islands Japon, Grandes Antilles
<i>Papilio (Princeps) demoleus malayanus</i> Wallace, 1865	<i>malayanus</i> = <i>Papilio erithonius loc.f. malayanus</i> = <i>Papilio demoleus annamiticus</i> = <i>Princeps demoleus malayanus</i> = <i>Papilio demoleus ab. Chryseis</i>	Wallace, 1865 Pnc: <i>Citrus</i> , <i>Glycosmis pentaphylla</i> , <i>Ziziphus jujuba</i>		Sud du Myanmar, Mae Hong Son, Chiang Rai, Chiang Mai, Nan, Trat, Ranong Thaïlande, Xam Neua, Vientiane, Thabok, Hinboun, Paksong Laos, Cambodge, Sud du Vietnam, Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie, Singapour, Sumatra Indonésie
<i>Papilio (Princeps) demoleus novoguineensis</i> Rothschild, 1908	<i>novoguineensis</i> = <i>Princeps demoleus novoguineensis</i>	Rothschild, 1908 Pnc: <i>Salvia</i>		Sud de la Papouasie Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Princeps) demoleus sthenelinus</i> Rothschild, 1895	<i>sthenelinus</i> = <i>Princeps demoleus sthenelinus</i>	Rothschild, 1895		Flores, Alor Indonésie
<i>Papilio (Princeps) demoleus sthenelus</i> Macleay, 1926	<i>sthenelus</i> = <i>Papilio sthenelus</i> = <i>Papilio demoleus sumbanus</i> = <i>Papilio demoleus pictus</i> = <i>Princeps demoleus sthenelus</i>	Macleay, 1926 Pnc: <i>Psoralea tenax</i> , <i>P. patens</i> , <i>P. cinerea</i> , <i>P. leucantha</i> , <i>P. pustulata</i> , <i>P. badocana</i> , <i>Citrus</i>		Sumba Indonésie, Australie
<i>Papilio (Princeps) erithonioides</i> Grose-Smith, 1891	<i>erithonioides</i> = <i>Papilio demodocus erithonioides</i> = <i>Princeps erithonioides</i>	Grose-Smith, 1891	assez commun mais femelle très rare	Madagascar
<i>Papilio (Princeps) grosesmithi</i> Rothschild, 1926	<i>grosesmithi</i> = <i>Papilio grose-smithi f. praeses?</i> = <i>Princeps grosesmithi</i>	Rothschild, 1926	peu commun	Madagascar
<i>Papilio (Princeps) morondavana</i> Grose-Smith, 1891	<i>morondavana</i> = <i>Princeps morondavana</i>	Grose-Smith, 1891	localement commun	Madagascar
	Groupe des <i>hesperus</i>			
<i>Papilio (Princeps) euphranor</i> Trimen, 1868	<i>euphranor</i> = <i>Papilio euphranor moratus</i> = <i>Princeps euphranor</i>	Trimen, 1868 Pnc: <i>Cryptocarya woodii</i>	Localisé et rare	Transkei, Natal, Transvaal, Afrique du Sud, Swaziland
<i>Papilio (Princeps) hesperus feae</i> Storce, 1963	<i>hesperus feae</i> = <i>Princeps hesperus feae</i>	Storce, 1963		île de Bioko Guinée équatoriale
<i>Papilio (Princeps) hesperus hesperus</i> Westwood, 1845	<i>hesperus</i> = <i>Papilio hesperus</i> = <i>Princeps hesperus</i> = <i>Papilio horribilis var. calabaricus</i> = <i>Papilio hesperus maculatus</i> = <i>Papilio hesperus f. additionis</i> = <i>Papilio hesperus f. bukoba</i> = <i>Papilio hesperus ab. dualana?</i> = <i>Papilio hesperus var. kassaiensis</i> = <i>Papilio embodinus</i> = <i>Papilio hesperus f.individ. insolitus</i> = <i>Papilio hesperus m.f. rufopuncta</i> = <i>Papilio hesperus hesperus ab. lagai</i> = <i>Papilio hesperus hesperus ab. blariauxi</i> = <i>Papilio hesperus hesperus ab. cuveliieri</i> = <i>Papilio hesperus hesperus f. mariae</i> = <i>Papilio hesperus hesperus f. punctata</i> = <i>Princeps hesperus hesperus</i>	Westwood, 1845 Pnc: <i>Beilschmiedia ugandensis</i>	pas rare	Nigeria, République centrafricaine, Cameroun, île de Bioko Guinée équatoriale, République du Congo, République démocratique du Congo, Ouganda, Nord-ouest de la Tanzanie, Nord de la Zambie
<i>Papilio (Princeps) hesperus sudana</i> Gabriel, 1945	<i>sudana</i> = <i>Princeps hesperus sudana</i>	Gabriel, 1945		Lotti Forest Sud du Soudan
<i>Papilio (Princeps) horribilis</i> Butler, 1874	<i>horribilis</i> = <i>Papilio hermes</i> = <i>Papilio hesperus horribilis</i> = <i>Papilio hermes var. peltax</i> = <i>Princeps horribilis</i>	Butler, 1874 Pnc: <i>Beilschmiedia manni</i>	peu commun	Sud de la Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana

Auteur: Dominiek PRUVOT	août 2018				
Papilio (Princeps) pelodurus pelodurus Butler, 1896	pelodurus pelodurus = Papilio pelodurus = Princeps pelodurus = Papilio pelodurus pelodurus f. individ. lyrus = Papilio pelodurus pelodurus f. individ. extensus = Princeps pelodurus pelodurus	Butler, 1896	Pnc: Cryptocarya liebertiana, Ocotea usambarenis	pas rare	Nyika Plateau à Mt. Mianje Malawi
Papilio (Princeps) pelodurus vesper Le Cerf, 1924	vesper = Papilio pelodurus ab. histricus = Papilio pelodurus vesper f.individ. excedens = Princeps pelodurus vesper	Le Cerf, 1924			Est et Sud de la Tanzanie, Nyika Nord-est de la Zambie, Misuku Hills Nord du Malawi
	Groupe des menestheus				Ancien monde
Papilio (Princeps) lormieri lormieri Distant, 1874	lormieri lormieri = Papilio lormieri = Princeps lormieri = Papilio menestheus v. lormieri ab. bassana = Papilio menestheus var. aureus = Papilio menestheus lormieri ab. cuvelleri = Princeps lormieri lormieri	Distant, 1874	Pnc: Clausena anisata, Fagaropsis, Teclea, Fagara macrophylla	Commun	Sud et est du Cameroun, République démocratique du Congo, Nord de l'Angola, Sud-ouest du Soudan
Papilio (Princeps) lormieri neocrocea Koçak, 1983	neocrocea = Papilio lormieri crocea = Papilio lormieri f. ophidicephaloides = Papilio lormieri f. rufopunctata = Princeps lormieri neocrocea	Koçak, 1983	Pnc: Rutacées, Clausema		Est et Centre de l'Ouganda, Kakamega forest Ouest du Kenya
Papilio (Princeps) lormieri semlikana Le Cerf, 1924	semlikana = Papilio menestheus-lormieri semlikana = Princeps lormieri semlikana	Le Cerf, 1924			Est de Kivu Nord-est de la République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda, Nord-ouest de la Tanzanie
Papilio (Princeps) menestheus canui Gauthier, 1984	menestheus canui = Princeps menestheus canui	Gauthier, 1984			Île de Bioko Guinée équatoriale
Papilio (Princeps) menestheus menestheus Drury, 1773	menestheus = Papilio menestheus = Papilio menestheus ab. pygmaeus = Papilio menestheus ab. unimaculatus = Papilio menestheus v. lormieri ab. latefasciatus = Princeps menestheus menestheus	Drury, 1773		Commun	Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Ouest du Cameroun
Papilio (Princeps) ophidicephalus ayresi van Son, 1939	ophidicephalus ayresi = Princeps ophidicephalus ayresi	van Son, 1939		Pas rare	Swaziland, Mpumalanga, KwaZulu-Natal Nord-ouest de l'Afrique du Sud
Papilio (Princeps) ophidicephalus chirinda van Son, 1939	chirinda = Papilio ophidicephalus chirinda var. barnesi = Princeps ophidicephalus chirinda	van Son, 1939			Centre-ouest du Mozambique, Est du Zimbabwe
Papilio (Princeps) ophidicephalus cottrelli van Son, 1939	cottrelli = Princeps ophidicephalus cottrelli	van Son, 1939			Sud central de la Zambie
Papilio (Princeps) ophidicephalus entabeni van Son, 1939	entabeni = Princeps ophidicephalus entabeni	van Son, 1939			Entabeni Limpopo Province Afrique du Sud
Papilio (Princeps) ophidicephalus mkuwadzi Gifford, 1961	mkuwadzi = Princeps ophidicephalus mkuwadzi	Gifford, 1961			Sud-ouest de la Tanzanie, Nord du Malawi, Nord-est de la Zambie
Papilio (Princeps) ophidicephalus niassicola Storace, 1955	niassicola = Princeps ophidicephalus niassicola	Storace, 1955			Centre et Sud du Malawi
Papilio (Princeps) ophidicephalus ophidicephalus Oberthür, 1878	ophidicephalus = Papilio ophidicephalus = Princeps ophidicephalus = Princeps ophidicephalus ophidicephalus	Oberthür, 1878	Pnc: Clausema inaequalis, C. anisata, Fagara capensis, Calodendron capense, Citrus, Zanthoxylum delagoense, Z. davyi, Z. capense		Est du Kenya, Tanzanie, Nord-est de la Zambie, Sud-est de la République démocratique du Congo
Papilio (Princeps) ophidicephalus phalusco Suffert, 1904	phalusco = Princeps ophidicephalus phalusco	Suffert, 1904			KwaZulu-Natal - Eastern Cape Province Afrique du Sud
Papilio (Princeps) ophidicephalus transvaalensis van Son, 1939	transvaalensis = Princeps ophidicephalus transvaalensis	van Son, 1939			Pietersburg District Limpopo Province Afrique du Sud
Papilio (Princeps) ophidicephalus zuluensis van Son, 1939	zuluensis = Princeps ophidicephalus zuluensis	van Son, 1939			KwaZulu-Natal Afrique du Sud
	Groupe des incertae sedis				
Papilio (Princeps) nandina Rothschild & Jordan, 1901	nandina Rothschild & Jordan, 1901			Hybride naturel entre P. phorcas ansorgei x P. dardanus polytrophus	Escarpment Kenya, Kayonza Ouganda
Papilio (Princeps) phorcas ansorgei Rothschild, 1896	phorcas ansorgei = Papilio phorcas tippelskirchi = Papilio phorcas f.f. thersandroides = Princeps phorcas ansorgei	Rothschild, 1896			Highlands de l'est de la vallée du Rift Kenya, Man Ouganda, Loliondo Nord de la Tanzanie
Papilio (Princeps) phorcas bardamu Canu, 1994	bardamu = Papilio phorcas bardamu f. velledae = Princeps phorcas bardamu	Canu, 1994			Île de Bioko Guinée équatoriale
Papilio (Princeps) phorcas congoanus Rothschild, 1896	congoanus = Papilio phorcas caspor = Papilio phorcas ab. kassaiensis = Papilio phorcas f. bergeri = Papilio phorcas f. xera = Papilio phorcas f. viridissima = Papilio phorcas congoanus f. ponzonii = Princeps phorcas congoanus	Rothschild, 1896			Nigeria, Cameroun, Île de Bioko Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Nord de l'Angola, Ouest de l'Ouganda, Ouest de la Tanzanie. Nord de la Zambie
Papilio (Princeps) phorcas nyikanus Rothschild & Jordan, 1903	nyikanus = Papilio phorcas leopoldi = Papilio phorcas ab. phorcadius = Princeps phorcas nyikanus	Rothschild & Jordan, 1903			Nord-est de la Zambie, Malawi, Mori, Mangati, Est de la Tanzanie, Rwanda
Papilio (Princeps) phorcas phorcas Cramer, [1775]	phorcas = Papilio phorcas = Princeps phorcas = Papilio doreus = Papilio thersander = Papilio phorcas f.f. media = Princeps phorcas phorcas	Cramer, [1775]	Pnc: Vepris, Teclea nobilis, T. simplicifolia, Macrostylis villosa, Oricopsis, Calodendrum, Clausena, Citrus, Fagara, Toddalia	Commun	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria
Papilio (Princeps) phorcas ruscoei Krüger, 1928	ruscoei = Papilio phorcas f ruscoei = Papilio phorcas f.f. mutans = Papilio phorcas f. furcula = Papilio phorcas f. inexpectata = Papilio phorcas pseudothersander = Papilio phorcas f. polyxena = Papilio phorcas f. bayoni = Papilio phorcas nilotica = Princeps phorcas ruscoei	Krüger, 1928			Est de l'Ouganda, Highlands de l'ouest de la vallée du Rift Kenya
Papilio (Princeps) phorcas sudanicola Storace, 1965	sudanicola = Princeps phorcas sudanicola	Storace, 1965			Sud du Soudan
Papilio (Princeps) phorcas tenuifasciatus Kielland, 1990	tenuifasciatus = Papilio phorcas tenuifasciatus f. meto = Princeps phorcas tenuifasciatus	Kielland, 1990			Highlands du nord de la Tanzanie, Chyulu Hills Kenya
Papilio (Princeps) leucotaenia Rothschild, 1908	leucotaenia = Princeps leucotaenia	Rothschild, 1908		rare	Kiezi Sud-ouest de l'Ouganda, Rugoge Forest Rwanda, Burundi, Kivu Est de la République démocratique du Congo
Papilio (Princeps) mangoura Hewitson, 1875	mangoura = Princeps mangoura	Hewitson, 1875		peu commun	Madagascar
Papilio (Princeps) nobilis cripsianus Stoneham, 1936	nobilis cripsianus = Papilio nobilis chrissipianus = Papilio nobilis leroyi = Princeps nobilis cripsianus	Stoneham, 1936			Kivu République démocratique du Congo, Ruwenzori, Ankole, Kigezi Ouest de l'Ouganda, Ouest du Kenya, Kasulu, Biharamulo Nord-ouest de la Tanzanie
Papilio (Princeps) nobilis didingensis Carpenter, 1928	dingensis = Princeps nobilis didingensis	Carpenter, 1928			Didinga Sud du Soudan
Papilio (Princeps) nobilis mpanda Kielland, 1990	mpanda = Princeps nobilis mpanda	Kielland, 1990			Kampisa River, Mpanda district Ouest de la Tanzanie
Papilio (Princeps) nobilis nobilis Rogenhöfer, 1891	nobilis = Papilio nobilis = Princeps nobilis = Papilio nobilis pallidus = Papilio pringlei = Papilio nobilis f. mariabonaparte = Papilio nobilis f. nobilissima = Papilio nobilis f. ab. josetta = Princeps nobilis nobilis	Rogenhöfer, 1891	Pnc: Warburgia ugandensis	pas rare	central HighlandsMasai Mara e versants du lac Victoria Kenya, Lac Victoria Est de l'Ouganda, Nord-ouest de la Tanzanie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
		Sous-genre : Druryia = Eques = Icarus = Iterus = Melindopsis	Aurivillius, 1881	
		Groupe des antimachus		
Papilio (Druryia) antimachus antimachus Drury, 1782	antimachus antimachus = Papilio antimachus = Druryia antimachus = Princeps antimachus = Druryia antimachus var. gigantea = Druryia antimachus ab. plagiata = Papilio antimachus f. parvus = Papilio antimachus f. karschi = Papilio antimachus f. rothschildiana = Papilio antimachus f. staudingeri = Papilio antimachus f. centrispila = Papilio antimachus f. melanescens = Papilio antimachus congolanus = Papilio antimachus congolanus ab. vreuricki = Papilio antimachus congolanus ab. pupillata = Papilio antimachus congolanus ab. obsoleta = Papilio antimachus congolanus ab. lagai = Papilio antimachus congolanus ab. virgularia = Papilio antimachus coffea = Papilio antimachus congolanus ab. burgeoni = Princeps antimachus antimachus	Drury, 1782	E T rare en beaucoup d'endroits, commun au Zaïre et en République centrafricaine	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Ouest de la République démocratique du Congo, Sud du Soudan, Nord de l'Angola
Papilio (Druryia) antimachus parva (Jackson, 1956)	parva = Princeps antimachus parva	(Jackson, 1956)	Taille plus petite	Est de la République du Congo, Ouganda
	Groupe des zalmoxis			
Papilio (Druryia) zalmoxis Hewitson, [1864]	zalmoxis = Icarus zalmoxis f. sufferti = Icarus zalmoxis f. riponi = Papilio zalmoxis ab. cinereus = Druryia zalmoxis = Iterus zalmoxis = Princeps zalmoxis	Hewitson, [1864]	E T pas rare	Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo?, Sud du Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Angola, République démocratique du Congo, Sud du Soudan, Ouganda
	Groupe des nireus			
Papilio (Druryia) aristophontes Oberthür, 1897	aristophontes = Papilio nireus aristophontes = Princeps aristophontes	Oberthür, 1897	Commun localement	Iles Comores
Papilio (Druryia) charopus charopus Westwood, 1843	charopus = Papilio charopus = Princeps charopus = Druryia charopus = Princeps charopus charopus	Westwood, 1843	Commun	Nigeria, Cameroun, île de Bioko Guinée équatoriale
Papilio (Druryia) charopus montuosus Joicey & Talbot, 1927	montuosus = Papilio charopus juvenus = Princeps charopus montuosus	Joicey & Talbot, 1927		Ouest de l'Ouganda, Ituri, Kivu République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi
Papilio (Druryia) chrapkowskii Suffert, 1904	chrapkowskii = Papilio chrapkowskii = Papilio bromius var. brontia = Papilio bromius chrapkowskii = Papilio bromius chrapkowskii ab. obliterata = Papilio bromius chrapkowskii ab. addenda = Princeps chrapkowskii	Suffert, 1904	Pnc: Teclea commun	Est et centre de l'Ouganda, Hauts pays du Kenya, Tanzanie
Papilio (Druryia) chrapkowskoides chrapkowskoides Storace, 1952	chrapkowskoides chrapkowskoides = Druryia bromius = Papilio bromius = Princeps chrapkowskoides = Papilio bromius chrapkowskoides = Papilio bromius chrapkowskoides ab. opposita = Papilio chrapkowskoides interjacens = Papilio bromius interjacens = Princeps chrapkowskoides chrapkowskoides	Storace, 1952		Est de la République du Congo, Sud-ouest de l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Ouest de la Tanzanie
Papilio (Druryia) chrapkowskoides nurettini Koçak, 1983	nurettini = Papilio nurettini = Papilio bromius ab. tessmanni = Papilio bromius ab. incerta = Papilio bromius bromius = Papilio bromius bromius ab. impunctata = Papilio bromius bromius chrapkowskii ab. ornata = Papilio bromius bromius f. macrops? = Papilio bromius bromius f. litor = Papilio bromius bromius f. imitans = Papilio bromius bromius f. angustevittata = Papilio bromius bromius f. caerulea = Papilio bromius bromius var. tenuis = Papilio bromius bromius var. septentrionalis	Koçak, 1983		Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, Angola, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda
Papilio (Druryia) desmondi desmondi van Someren, 1960	desmondi desmondi = Papilio desmondi = Papilio brontes desmondi = Princeps desmondi = Princeps desmondi desmondi	van Someren, 1960	Pnc: <i>Vepris eugenifolia</i> , <i>Teclea</i> , <i>Clausena</i> , <i>Calodendrum</i> , <i>Citrus</i>	commun Chyulu Hills Sud-est du Kenya
Papilio (Druryia) desmondi magdae Gifford, 1961	magdae = Papilio magdae = Papilio brontes = Princeps desmondi magdae	Gifford, 1961		peu commun Mt. Meru, Mt. Kilimandjaro, Ngorongoro Crater Nord de la Tanzanie
Papilio (Druryia) desmondi teita van Someren, 1960	teita = Papilio teita = Princeps desmondi teita	van Someren, 1960		Teita Hills Sud-est du Kenya
Papilio (Druryia) desmondi usambaraensis Koçak, 1980	usambaraensis = Papilio brontes usambaraensis = Princeps desmondi usambaraensis = Papilio desmondi australis = Papilio brontes australis	Koçak, 1980		Est et sud de la Tanzanie, Nord du Malawi, Nord-est de la Zambie
Papilio (Druryia) hornimani hornimani Distant, 1879	hornimani hornimani = Papilio hornimani = Princeps hornimani = Princeps hornimani hornimani	Distant, 1879	Pnc: <i>Teclea</i>	pas rare Chyulu Hills Sud du Kenya, Nord de la Tanzanie
Papilio (Druryia) hornimani mbulu Kielland, 1990	mbulu = Princeps hornimani mbulu	Kielland, 1990		Ngorongo, Oldeani, Hasama Forest, Mamahisara, Mbulu forest, MT. Kwaraha, Mt. Meru, Mt. Kilimandjaro Tanzanie
Papilio (Druryia) hornimani mwanihanae Kielland, 1987	mwanihanae = Princeps hornimani mwanihanae	Kielland, 1987		Mwanihana National Park Tanzanie
Papilio (Druryia) interjectana Vane-Wright, 1995	interjectana = Princeps interjectana = Papilio interjecta	Vane-Wright, 1995		Ouganda, Kaimosi Forest Ouest du Kenya
Papilio (Druryia) nerminae Koçak, 1983	nerminae = Papilio bromius nerminae = Papilio bromius furvus = Princeps nerminae	Koçak, 1983		SãoTomé et Príncipe
Papilio (Druryia) nireus lyaeus Doubleday, 1845	nireus lyaeus = Papilio lyaeus = Papilio lyaeus aelyus = Papilio nireus pseudonireus f. pseudonireoides = Papilio nireus lyaeus f. callistria = Papilio manitheus = Princeps nireus lyaeus	Doubleday, 1845	Pnc: <i>Clauseria inaequalis</i> , <i>Calodendron capense</i> , <i>Toddalia aculeata</i> , <i>T. lanceolata</i> , <i>T. natalensis</i> , <i>Citrus</i> , <i>Teclea swynnertonii</i> , <i>Fagraia capensis</i>	Didinga Mountains Sud du Soudan, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Caprivi Namibie, Swaziland, Afrique du Sud
Papilio (Druryia) nireus nireus Linnaeus, 1758	nireus = Papilio nireus = Druryia nireus = Princeps nireus = Papilio nireus f. nora = Papilio nireus f. dimidiatus = Papilio nireus nireus var. xerophila = Papilio nireus micronireus = Papilio nireus ab. lyaeoides = Papilio erinus = Papilio nireoides = Papilio nireus nireus ab. bedoci = Papilio nireus nireus ab. punctata = Papilio nireus nireus ab. seeldrayersi = Papilio nireus nireus ab. piardi = Papilio nireus nireus ab. falcata = Papilio nireus nireus ab. houzeaui	Linnaeus, 1758	Pnc: <i>Calodendrum capense</i> , <i>Citrus</i> , <i>Clausena anisata</i> , <i>Fagraia macrophylla</i> , <i>Oricia bachmannii</i> , <i>Teclea natalensis</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Vepris lanceolata</i> , <i>Zanthoxylum capense</i> , <i>Z. delagoense</i>	commun Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Sud du Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, Angola, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Bwamba Ouest de l'Ouganda, Ouest de la Tanzanie, Zambie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
<i>Papilio (Druryia) nireus nireus</i> Linnaeus, 1758		= <i>Papilio nireus nireus f. tenuivittata</i> = <i>Papilio nireus nireus f. cedeae</i> = <i>Princeps nireus nireus</i>			
<i>Papilio (Druryia) nireus pseudonireus</i> C. & R. Felder, 1865		pseudonireus = <i>Papilio pseudonireus</i> = <i>Papilio nireus</i> var. <i>abyssinica</i> = <i>Papilio donaldsoni</i> = <i>Papilio nireus pseudonireus</i> ab. <i>pseudolyaeus</i> = <i>Papilio nireus pseudonireus</i> ab. <i>anticemaculata</i> = <i>Papilio nireus pseudonireus</i> ab. <i>minor</i> = <i>Papilio nireus pseudonireus f. semivittata</i> = <i>Princeps nireus pseudonireus</i>	C. & R. Felder, 1865		Nord du Kenya, Nord de l'Ouganda, Sud du Soudan, Somalie, Ethiopie, Erythrée
<i>Papilio (Druryia) sosia debilis</i> Storace, 1951		sosia debilis = <i>Princeps sosia debilis</i>	Storace, 1951	Bande régulière à bord droit	Ouganda, Nord-ouest de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) sosia pulchra</i> Berger, 1950		pulchra = <i>Papilio sosia f. imitatrix</i> = <i>Papilio sosia</i> ab. <i>pristina</i> = <i>Papilio sosia</i> ab. <i>atlantica</i> ? = <i>Princeps sosia pulchra</i>	Berger, 1950		Cameroun, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, Nord de l'Angola, République démocratique du Congo
<i>Papilio (Druryia) sosia sosia</i> Rothschild & Jordan, 1903		sosia = <i>Papilio sosia</i> = <i>Princeps sosia</i> = <i>Princeps sosia sosia</i>	Rothschild & Jordan, 1903	Pnc: <i>Teclea</i> , <i>Toddalia</i> , <i>Zanthoxylum gillesi</i> , <i>Citrus</i>	Localisé Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Sud du Nigeria, Ouest du Cameroun
<i>Papilio (Druryia) thurau cyclopis</i> Rothschild & Jordan, 1903		thurau cyclopis = <i>Papilio bromius cyclopis</i> = <i>Princeps thurau cyclopis</i>	Rothschild & Jordan, 1903		Nyika Plateau Malawi, Zambie
<i>Papilio (Druryia) thurau heathi</i> (Hancock, 1984)		heathi = <i>Princeps thurauyi occidua f. heathi</i> = <i>Druryia thurau occidua f. heathi</i> = <i>Princeps thurau heathi</i>	(Hancock, 1984)		Mlanje Malawi
<i>Papilio (Druryia) thurau ngorongoro</i> (Hancock, 1984)		ngorongoro = <i>Princeps thurau ngorongoro</i> = <i>Druryia thurau ngorongoro</i>	(Hancock, 1984)		Ngorongoro Crater Nord de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) thurau occidua</i> Storace, 1951		occidua = <i>Papilio brontes occidua</i> = <i>Papilio brontes occidentale</i> = <i>Princeps thurau occidua</i>	Storace, 1951		Kasai République démocratique du Congo, Malawi, Nord-est de la Zambie
<i>Papilio (Druryia) thurau thurau</i> Karsch, 1900		thurau = <i>Papilio thurau</i> = <i>Princeps thurau</i> = <i>Princeps thurau thurau</i>	Karsch, 1900	Pnc: <i>Toddalia asiatica</i>	peu commun Sud de la Tanzanie, Nord du Malawi
<i>Papilio (Druryia) thurau viphya</i> (Hancock, 1984)		viphya = <i>Princeps thurau f. viphya</i> = <i>Druryia thurau viphya</i>	(Hancock, 1984)		Musamba, Viphya Malawi
<i>Papilio (Druryia) ufipa</i> Carcasson, 1961		ufipa = <i>Papilio bromius ufipa</i> = <i>Papilio thurau ufipa</i> = <i>Princeps ufipa</i>	Carcasson, 1961		Ufipa district Sud-ouest de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) wilsoni</i> Rotschild, 1926		wilsoni = <i>Papilio nireus wilsoni</i> = <i>Princeps wilsoni</i>	Rotschild, 1926		Nubar Hills, Taldi Ethiopie
		Groupe des cynorta		Pas de queues	
<i>Papilio (Druryia) arnoldiana</i> Vane-Wright, 1995		arnoldiana = <i>Papilio cynorta arnoldi</i> = <i>Princeps arnoldiana</i>	Vane-Wright, 1995		Grine Sud-ouest de l'Ethiopie
<i>Papilio (Druryia) cynorta</i> Fabricius, 1793		cynorta = <i>Papilio zerynthius</i> = <i>Papilio boisduvallianus</i> = <i>Papilio cynorta f. lavochrea</i> = <i>Papilio cynorta f. ochrospla</i> = <i>Papilio cynorta l.f. acraeaminus</i> = <i>Papilio cynorta f. albifurcatus</i> = <i>Papilio cynorta f. parageodes</i> = <i>Papilio cynorta cynorta f. agayana</i> = <i>Papilio cynorta cynorta f. bwanbensis</i> = <i>Papilio cynorta norcyta</i> = <i>Papilio gallienus peculiaris</i> = <i>Papilio triptolemus</i> = <i>Papilio cynorta cynorta</i> = <i>Druryia cynorta</i> = <i>Princeps cynorta</i>	Fabricius, 1793	Pnc: <i>Clausena</i> , <i>Vepris</i> , <i>Calodendrum</i> , <i>Citrus</i> , <i>Fagara</i> , <i>Teclea</i>	pas rare. La femelle copie <i>Acraea epaea</i> Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Sud du Nigeria, Cameroun, Ile de Bioko Guinée équatoriale, République du Congo, Angola, République démocratique du Congo, Ouganda, République centrafricaine, Kenya, Tanzanie, Ethiopie
<i>Papilio (Druryia) plagiatus</i> Aurivillius, 1898		plagiatus = <i>Princeps plagiatus</i>	Aurivillius, 1898		peu commun Est du Nigeria, Cameroun, Mongala, Uele, Ituri République démocratique du Congo, République centrafricaine, Sud du Soudan, Ouganda
		Groupe des zenobia			
<i>Papilio (Druryia) andronicus</i> Ward, 1871		andronicus = <i>Papilio chionicus</i> = <i>Princeps andronicus</i>	Ward, 1871		Barombi Cameroun
<i>Papilio (Druryia) cyproeofila cyproeofila</i> Butler, 1868		cyproeofila cyproeofila = <i>Papilio cypraeofila</i> = <i>Papilio zenobius</i> ? = <i>Princeps cyproeofila</i> = <i>Princeps cyproeofila cyproeofila</i>	Butler, 1868	Pnc: <i>Piper</i>	pas rare Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ouest du Nigeria
<i>Papilio (Druryia) cyproeofila praecyola</i> Suffert, 1904		praecyola = <i>Papilio cypraeafila praecyola</i> = <i>Princeps cyproeofila praecyola</i> = <i>Papilio fernandus praecyola</i>	Suffert, 1904		Est du Nigeria, Cameroun, République centrafricaine
<i>Papilio (Druryia) gallienus</i> Distant, 1879		gallienus = <i>Papilio cypraeafila gallienus</i> = <i>Papilio gallienus gallienus</i> ab. <i>vreuricki</i> = <i>Papilio gallienus gallienus</i> ab. <i>ochreatea</i> = <i>Papilio gallienus</i> ab. <i>hulstaerti</i> = <i>Princeps gallienus</i>	Distant, 1879		peu commun Cross River loop Nigeria, Cameroun, République du Congo, Centre de la République démocratique du Congo, République centrafricaine
<i>Papilio (Druryia) fernandus</i> Fruhstorfer, 1903		fernandus = <i>Papilio cypraeafila fernandus</i> = <i>Papilio cyproeofila fernandus</i> = <i>Papilio cyproeofila fernandus f. fumigatus</i> = <i>Princeps fernandus</i>	Fruhstorfer, 1903		Fernando Po, Ile de Bioko Guinée équatoriale
<i>Papilio (Druryia) filaprae filaprae</i> Suffert, 1904		filaprae filaprae = <i>Papilio cypraeafila filaprae</i> = <i>Papilio cyproeofila filaprae</i> = <i>Princeps filaprae</i> = <i>Papilio cypraeofila l.lactifascia</i> = <i>Princeps filaprae filaprae</i>	Suffert, 1904		Barombi Sud-est du Cameroun, République du Congo, Sud-ouest de la République démocratique du Congo, Angola
<i>Papilio (Druryia) filaprae musolanus</i> (Hancock, 1988)		musolanus = <i>Princeps filaprae musolanus</i> = <i>Papilio cypraeafila f. insularis</i>	(Hancock, 1988)		Ile de Bioko Guinée équatoriale, Ouest du Cameroun
<i>Papilio (Druryia) mechow mechow</i> Dewitz, 1881		mechow mechow = <i>Druryia mechow</i> = <i>Princeps mechow</i> = <i>Papilio mechow mechow f. ab. albomaculata</i> = <i>Princeps mechow mechow</i>	Dewitz, 1881		Localisé mais commun Cameroun, République du Congo, République centrafricaine, Tambura Sud du Soudan, Ouganda, République démocratique du Congo, Angola, Gabon
<i>Papilio (Druryia) mechow whitnalli</i> Neave, 1904		whitnalli = <i>Papilio gallienus whitnalli</i> = <i>Princeps mechow whitnalli</i>	Neave, 1904		Centre et Est de l'Ouganda
<i>Papilio (Druryia) mechowianus</i> Dewitz, 1885		mechowianus = <i>Papilio cypraeafila var. mechowianus</i> = <i>Proneps mechowianus</i> = <i>Papilio andoclidides</i> = <i>Papilio mechowianus</i> ab. <i>lagai</i> = <i>Princeps mechowianus</i>	Dewitz, 1885		commun Nord de l'Angola, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Soudan?
<i>Papilio (Druryia) nobicea</i> Suffert, 1904		nobicea = <i>Papilio zenobia nobicea</i> = <i>Papilio zenobia</i> ab. <i>nobicea</i> = <i>Princeps nobicea</i> = <i>Papilio maesseni</i> = <i>Princeps maesseni</i>	Suffert, 1904		Ghana, Togo
<i>Papilio (Druryia) zenobia</i> Fabricius, 1775		zenobia = <i>Papilio messalina</i> = <i>Papilio odenatus</i> = <i>Papilio zenobia f. amygdaliferus</i> = <i>Papilio zenobia</i> ab. <i>infrapicta</i> = <i>Druryia zenobia</i> = <i>Princeps zenobia</i>	Fabricius, 1775	Pnc: <i>Piper umbellatum</i>	Commun Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, Ile de Bioko Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Ouest de l'Ouganda

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
		Groupe des <i>echerioides</i>		
<i>Papilio (Druryia) echerioides ambangulu</i> Clifton & Collins, 1997	<i>echerioides ambangulu</i> = <i>Princeps echerioides ambangulu</i>	Clifton & Collins, 1997		Ambangulu, Ouest d'Usambara Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) echerioides chirindanus</i> van Son, 1956	<i>chirindanus</i> = <i>Princeps echerioides chirindanus</i>	van Son, 1956		Mt. Gorongosa Mozambique , Est du Zimbabwe
<i>Papilio (Druryia) echerioides echerioides</i> Trimen, 1868	<i>echerioides</i> = <i>Papilio echerioides</i> = <i>Druryia echerioides</i> = <i>Princeps echerioides</i> = <i>Princeps echerioides echerioides</i>	Trimen, 1868	Pnc: <i>Clausena inaequalis</i> , <i>Toddalia lanceolata</i> , <i>T. asiatica</i> , <i>Fagara capensis</i> , <i>Zanthoxylum delagoense</i> , <i>Vepris lanceolata</i> , <i>Citrus</i>	Swaziland , Afrique du Sud
<i>Papilio (Druryia) echerioides homeyeri</i> Plotz, 1880	<i>homeyeri</i> = <i>Papilio homeyeri</i> = <i>Papilio neumanni</i> = <i>Papilio tangankae</i> = <i>Papilio zoroastres neumanni</i> ab. <i>subtangankae</i> = <i>Papilio zoroastres neumanni</i> ab. <i>zoroastrides</i> = <i>Princeps acherioides homeyeri</i>	Plotz, 1880		Pungo-Andongo Angola , Lomami, Shaba, Lualaba, Tanganika République démocratique du Congo , Geri Sud-ouest de la Tanzanie , Nord de la Zambie
<i>Papilio (Druryia) echerioides joiceyi</i> Gabriel, 1945	<i>joiceyi</i> = <i>Papilio zoroastres joiceyi</i> = <i>Papilio zoroastres f.f. pallidochrea</i> = <i>Princeps echerioides joiceyi</i>	Gabriel, 1945	Pnc: Rutacées, <i>Teckea</i>	Opare Forest, Immatong Mts., Sud du Soudan , Ouganda , Ouest du Kenya , Ouest de la Tanzanie , Rwanda , Nord de Kivu République démocratique du Congo
<i>Papilio (Druryia) echerioides kiellandi</i> Clifton & Collins, 1997	<i>kiellandi</i> = <i>Princeps echerioides kiellandi</i>	Clifton & Collins, 1997		Teita Hills, Chyulu Hills Sud du Kenya , Kingarama, Loliondo, Nord de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) echerioides leucospilus</i> Rothschild, 1902	<i>leucospilus</i> = <i>Princeps echerioides leucospilus</i>	Rothschild, 1902		Highlands du sud-est de la vallée du Rift Ethiopie
<i>Papilio (Druryia) echerioides nioka</i> (Hancock, 1989)	<i>nioka</i> = <i>Princeps echerioides nioka</i> = <i>Papilio zoroastres joycei f. nioka?</i>	(Hancock, 1989)		Nioka, Ituri district République démocratique du Congo
<i>Papilio (Druryia) echerioides nyiro</i> Carcasson, 1962	<i>nyiro</i> = <i>Princeps echerioides nyiro</i>	Carcasson, 1962		Mt. Nyiro Nord-ouest du Kenya
<i>Papilio (Druryia) echerioides oscar</i> Rothschild, 1902	<i>oscar</i> = <i>Princeps echerioides oscar</i>	Rothschild, 1902		Highlands de l'ouest de la vallée du Rift Ethiopie
<i>Papilio (Druryia) echerioides pseudowertheri</i> Kielland, 1990	<i>pseudowertheri</i> = <i>Princeps echerioides pseudowertheri</i>	Kielland, 1990		Muhulu Forest, Ulange District, Est et sud-est de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) echerioides shirensis</i> (Hancock, 1987)	<i>shirensis</i> = <i>Princeps echerioides shirensis</i>	(Hancock, 1987)		Shire Highlands sud du Malawi
<i>Papilio (Druryia) echerioides wertheri</i> Karsch, 1898	<i>wertheri</i> = <i>Papilio echerioides var. wertheri</i> = <i>Papilio echerioides rideschi</i> = <i>Papilio echerioides rectofasciata</i> = <i>Princeps echerioides wertheri</i>	Karsch, 1898		Est du Kenya , Oldeani, Modji, Ngorongoro, Mt. Meru, Mt. Kilimandjaro, Mbulu forests Est et nord de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) echerioides zoroastres</i> Druce, 1878	<i>zoroastres</i> = <i>Papilio zoroastres</i> = <i>Papilio zoroastres</i> ab. <i>zoroastroides</i> = <i>Papilio zoroastres</i> ab. <i>sapponis</i> = <i>Papilio zoroastres barnsi</i> = <i>Papilio zoroastres zoroastres</i> = <i>Papilio echerioides gabriel</i> = <i>Papilio zoroastres gabriel</i> = <i>Papilio preussius</i> = <i>Princeps echerioides zoroastres</i>	Druce, 1878	assez rare	Buea-Gebirge, Highlands Cameroun , Fernando Po Guinée équatoriale
<i>Papilio (Druryia) fueleborni fueleborni</i> Karsch, 1900	<i>fueleborni</i> = <i>Papilio fueleborni</i> = <i>Princeps fueleborni</i> = <i>Princeps fueleborni fueleborni</i> = <i>Druryia fueleborni fueleborni</i>	Karsch, 1900	Pnc: <i>Clausena</i>	Est et sud de la Tanzanie , Nord du Malawi
<i>Papilio (Druryia) fueleborni rydoni</i> Kielland, 1987	<i>rydoni</i> = <i>Papilio fueleborni rydoni</i> = <i>Princeps fueleborni rydoni</i> = <i>Druryia fueleborni rydoni</i>	Kielland, 1987		Mts. Uluguru, Mts Usambara Nord-est de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) fueleborni sjoestedti</i> Aurivillius, 1908	<i>sjoestedti</i> = <i>Papilio sjöstedti</i> = <i>Papilio fueleborni sjoestedti</i> = <i>Princeps fueleborni sjoestedti</i> = <i>Druryia sjoestedti sjoestedti</i>	Aurivillius, 1908	pas rare	Mt. Meru, Oldeani-Ngorongoro highlands, Mbulu forests, Mt. Kwaraha Nord de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) fueleborni neocesa</i> Kemal & Kocak, 2005	<i>neocesa</i> = <i>Papilio sjöstedti var. atavus</i> = <i>Papilio fueleborni atavus</i> = <i>Papilio sjoestedti atavus</i> = <i>Princeps fueleborni neocesa</i> = <i>Druryia fueleborni atavus</i>	Kemal & Kocak, 2005		Mt. Kilimandjaro Nord de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) jacksoni hecqui</i> Berger, 1954	<i>jacksoni hecqui</i> = <i>Princeps jacksoni hecqui</i>	Berger, 1954		Nord-ouest du Lac Albert Nord-est de la République démocrtique du Congo
<i>Papilio (Druryia) jacksoni imatonga</i> Clifton & Collins, 1997	<i>imatonga</i> = <i>Papilio echerioides imatonga</i> = <i>Princeps jacksoni imatonga</i>	Clifton & Collins, 1997		Imatong Mts. Sud-ouest du Soudan
<i>Papilio (Druryia) jacksoni jacksoni</i> Sharpe, 1891	<i>jacksoni</i> = <i>Papilio jacksoni</i> = <i>Druryia jacksoni</i> = <i>Princeps jacksoni</i> = <i>Papilio jacksoni f.f. multimaculata</i> = <i>Princeps jacksoni jacksoni</i>	Sharpe, 1891	Pnc: <i>Clausena anisata</i> , <i>Toddalia</i>	Commun. La femelle copie <i>Amauris echeria</i> Highlands du Kenya , Est de l' Ouganda
<i>Papilio (Druryia) jacksoni kungwe</i> Cottrell, 1963	<i>kungwe</i> = <i>Princeps jacksoni kungwe</i>	Cottrell, 1963		Kungwe-Mahale Mts. Kigoma, Mpanda, Ufipa districts Ouest de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) jacksoni nyika</i> Cottrell, 1963	<i>nyika</i> = <i>Princeps jacksoni nyika</i>	Cottrell, 1963		Nyika Plaetau Nord du Malawi et Est de la Zambie
<i>Papilio (Druryia) jacksoni ruandana</i> Le Cerf, 1924	<i>ruandana</i> = <i>Princeps jacksoni ruandana</i>	Le Cerf, 1924		Kivu République démocratique du Congo , Sud-est du Lac Albert Est de l' Ouganda , Rwanda , Burundi
	Groupe des <i>oribazus</i>			
<i>Papilio (Druryia) epiphorbas epiphorbas</i> Boisduval, 1833	<i>epiphorbas epiphorbas</i> = <i>Papilio epiphorbas</i> = <i>Druryia epiphorbas</i> = <i>Princeps epiphorbas</i> = <i>Papilio epiphorbas f. f.individ. hova</i> = <i>Papilio epiphorbas m. f.individ. oriphorbas</i> = <i>Princeps epiphorbas epiphorbas</i>	Boisduval, 1833	Commun	Madagascar
<i>Papilio (Druryia) epiphorbas guyonnaudii</i> Turlin & Guilbot, 1990	<i>guyonnaudii</i> = <i>Princeps epiphorbas guyonnaudii</i>	Turlin & Guilbot, 1990		Île d'Anjouan Comores
<i>Papilio (Druryia) epiphorbas praedicta</i> Turlin & Guilbot, 1990	<i>praedicta</i> = <i>Princeps epiphorbas praedicta</i>	Turlin & Guilbot, 1990		Grand Comore Comores
<i>Papilio (Druryia) oribazus</i> Boisduval, 1836	<i>oribazus</i> = <i>Druryia oribazus</i> = <i>Princeps oribazus</i>	Boisduval, 1836	Commun	Est de Madagascar
	Groupe des <i>incertae sedis</i>			
<i>Papilio (Druryia) chitondensis</i> Bivar de Sousa & Fernandes, 1966	<i>chitondensis</i> = <i>Papilio nireus chitondensis</i> = <i>Druryia chitondensis</i> = <i>Princeps chitondensis</i>	Bivar de Sousa & Fernandes, 1966		Roa Chitonde, Jungo, Novo Redondo Angola
<i>Papilio (Druryia) mackinnoni benguellae</i> Jordan, 1908	<i>mackinnoni benguellae</i> = <i>Princeps mackinnoni benguellae</i>	Jordan, 1908		Highlands du centre de l' Angola
<i>Papilio (Druryia) mackinnoni isokae</i> (Hancock, 1984)	<i>isokae</i> = <i>Princeps mackinnoni isokae</i> = <i>Druryia mackinnoni isokae</i>	(Hancock, 1984)		Nord-est de la Zambie , Ouest de la Tanzanie , Nord du Malawi
<i>Papilio (Druryia) mackinnoni mackinnoni</i> Sharpe, 1891	<i>mackinnoni</i> = <i>Druryia mackinnoni</i> = <i>Princeps mackinnoni</i> = <i>Papilio mackinnoni immaculatus</i> = <i>Papilio mackinnoni bimaculatus</i> = <i>Papilio mackinnoni f.individ. unimaculatus</i> = <i>Papilio mackinnoni var. elgonia</i> = <i>Papilio mackinnoni</i> ab. <i>amplusmaculata</i> = <i>Papilio mackinnoni mackinnoni f. addenda</i> = <i>Princeps mackinnoni mackinnoni</i>	Sharpe, 1891	Pnc: Rutacées, <i>Clausema</i> , <i>Toddalia</i> , <i>Teckea simplicifolia</i> , <i>T. nobilis</i> , <i>T. tricarpa</i>	commun localement Sud du Soudan , Ituri, Kivu République démocratique du Congo , Ouganda , Rwanda , Burundi , Kenya , Nord-est de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) mackinnoni mpwapwana</i> Kielland, 1990	<i>mpwapwana</i> = <i>Princeps mackinnoni mpwapwana</i>	Kielland, 1990		Mangalisa, Rubeho Mts., Mpwapwa et Kilosa Districts Est de la Tanzanie
<i>Papilio (Druryia) mackinnoni reductofascia</i> Kielland, 1990	<i>reductofascia</i> = <i>Princeps mackinnoni reductofascia</i>	Kielland, 1990		Longido, Arusha Nord de la Tanzanie , Sud du Kenya

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
Papilio (Druryia) mackinnoni theodori Riley, 1921	theodori = <i>Princeps mackinnoni theodori</i>	Riley, 1921			Shaba Sud de la République démocratique du Congo , Nord-ouest de la Zambie
Papilio (Druryia) manlius Fabricius, 1798	manlius = <i>Papilio grachus</i> = <i>Papilio philemon</i> = <i>Princeps manlius</i>	Fabricius, 1798 Pnc: <i>Citrus</i>	commun		Île Maurice
Papilio (Druryia) microps Storace, 1952	microps = <i>Papilio aethiops microps</i> = <i>Papilio aethiops</i> = <i>Papilio aethiops</i> ab. <i>elicole</i> = <i>Papilio aethiops</i> f. <i>orbizoides</i> = <i>Papilio aethiops</i> ab. <i>ragazzii</i> = <i>Princeps aethiopsis</i> = <i>Papilio yildizae</i> = <i>Princeps microps</i>	Storace, 1952	peu commun		Ethiopie , Nord de la Somalie
Papilio (Druryia) phorbanta nana Oberthür, 1879	phorbanta nana = <i>Papilio disparilis</i> var. <i>nana</i> = <i>Princeps phorbanta nana</i>	Oberthür, 1879			Îles Seychelles
Papilio (Druryia) phorbanta phorbanta Linnaeus, 1771	phorbanta = <i>Papilio phorbanta</i> = <i>Princeps phorbanta</i> = <i>Papilio disparilis</i> = <i>Princeps phorbanta phorbanta</i>	Linnaeus, 1771	Le Papillon de la pâture	Protégé	Île de la Réunion
Papilio (Druryia) rex abyssinicana Vane-Wright, 1995	rex abyssinicana = <i>Princeps rex abyssinicana</i> = <i>Papilio rex abyssinicus</i>	Vane-Wright, 1995			Highlands, Ganji River, Nado's Province Sud-est de l' Ethiopie
Papilio (Druryia) rex commixtus Aurivillius, 1908	commixtus = <i>Papilio rex commixta</i> = <i>Papilio rex</i> var. <i>alnderi</i> = <i>Papilio rex</i> f. <i>commixta</i> = <i>Papilio rex</i> var. <i>alnderi</i> f. <i>lindblomi</i> = <i>Papilio rex</i> f. <i>intermediata</i> = <i>Papilio rex alnderi</i> f. <i>holmi</i> = <i>Princeps rex commixtus</i>	Aurivillius, 1908			Highlands de l'ouest de la vallée du Rift Kenya
Papilio (Druryia) rex franciscae Carpenter, 1928	franciscae = <i>Princeps rex franciscae</i>	Carpenter, 1928			Sud du Soudan , Sud-ouest de l' Ethiopie
Papilio (Druryia) rex mimeticus Rothschild, 1897	mimeticus = <i>Papilio mimeticus</i> = <i>Papilio rex barnsi</i> = <i>Princeps rex mimeticus</i>	Rothschild, 1897		Copie <i>Tirumala formosa</i>	Ituru, Kivu République démocratique du Congo , Ouganda , Rwanda , Burundi , Nord-ouest de la Tanzanie , Ouest du Kenya
Papilio (Druryia) rex regulana Vane-Wright, 1995	regulana = <i>Princeps rex regulana</i> = <i>Papilio rex</i> var. <i>regulus</i> = <i>Papilio rex</i> ab. <i>eisneri</i> = <i>Papilio rex</i> f. <i>endymion</i>	Vane-Wright, 1995			Kikuyu Escarpment, Highlands de l'est de la vallée du Rift Kenya
Papilio (Druryia) rex rex Oberthür, 1886	rex = <i>Papilio rex</i> = <i>Princeps rex</i> = <i>Papilio rex</i> var. <i>arnoldi</i> = <i>Princeps rex rex</i>	Oberthür, 1886 Pnc: <i>Teclaea tricarpa</i> , <i>T. stuhlmanni</i> , <i>Calodendrum</i> , <i>Citrus</i> , <i>Clausena</i> , <i>Fagara</i> , <i>Toddala</i>	pas rare		Nord-est et centre de la Tanzanie
Papilio (Druryia) rex schultzei Aurivillius, 1904	schultzei = <i>Papilio schultzei</i> = <i>Princeps rex schultzei</i>	Aurivillius, 1904		Rare	Est du Nigeria , Highlands du Cameroun
	Sous-genre : <i>Menelaides</i> = <i>Nestorides</i> = <i>Iliades</i> = <i>Charus</i> = <i>Araminta</i> = <i>Sainia</i> = <i>Tamera</i> Hübner, [1819] = <i>Sadengia</i> = <i>Mimbyasa</i> = <i>Priamides</i> = <i>Panosmiopsis</i> = <i>Heterocreon</i>				
	Groupe des <i>demolion</i>				
Papilio (Menelaides) demolion delostenus Rothschild, 1908	demolion delostenus Rothschild, 1908	Pnc: <i>Luvunga scandens</i>			Palawan Philippines
Papilio (Menelaides) demolion demolion Cramer, [1776]	demolion = <i>Papilio demolion</i> = <i>Papilio demolion messius</i> = <i>Menelaides demolion</i> = <i>Papilio crespontes</i> = <i>Princeps demolion demolion</i>	Cramer, [1776] Pnc: <i>Luvunga scandens</i> , <i>Citrus</i>	Commun		Nord-est de l' Inde , Sud du Myanmar , Thaïlande , Laos , Vietnam , Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie , Tioman , Singapour , Sumatra, Java, Borneo, Bangka, Bali, Lombok Indonésie
Papilio (Menelaides) demolion energetes Fruhstorfer, 1908	energetes Fruhstorfer, 1908				Nias Indonésie
Papilio (Menelaides) euchenor comma Joicey & Noakes, 1915	euchenor comma Joicey & Noakes, 1915				Biak Indonésie
Papilio (Menelaides) euchenor depilis Rothschild, 1895	depilis Rothschild, 1895				Nouvelle Bretagne, Duke of York Group Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) euchenor euchenor Guérin-Ménéville, 1829	euchenor = <i>Papilio euchenor</i> = <i>Papilio axion</i> = <i>Papilio euchenor lasos</i> = <i>Papilio euchenor scribonius</i> = <i>Papilio euchenor hippotas</i>	Guérin-Ménéville, 1829 Pnc: <i>Citrus</i> , <i>Evodia</i>	Commun		Ouest de l'Irian, Waigau Indonésie , Milne Bay Papouasie-Nouvelle-Guinée , Dampier Peninsula Australie
Papilio (Menelaides) euchenor eutropius Janson, 1886	eutropius = <i>Papilio eutropius</i> = <i>Papilio euchenor</i> ab. <i>eutropius</i> = <i>Papilio euchenor eutropius f. mago</i>	Janson, 1886			Jobi Indonésie
Papilio (Menelaides) euchenor godarti Montrouzier, 1856	godarti = <i>Papilio godarti</i> = <i>Papilio euchenor euchenides</i>	Montrouzier, 1856			Fergusson D'entrecasteaux, Woodlark island Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) euchenor misimanus Rothschild, 1898	misimanus Rothschild, 1898				Misima Island Louisiades Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) euchenor misolensis Rothschild, 1908	misolensis Rothschild, 1908				Misool Island Indonésie
Papilio (Menelaides) euchenor naucles Rothschild, 1908	naucles Rothschild, 1908				Kai Island Indonésie
Papilio (Menelaides) euchenor neohannoveranus Rothschild, 1898	neohannoveranus Rothschild, 1898				Nouveau Hanovre Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) euchenor novohibernicus Rothschild, 1896	novohibernicus Rothschild, 1896				Nouvelle Irlande Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) euchenor obsolescens Rothschild, 1895	obsolescens Rothschild, 1895				Aru Indonésie
Papilio (Menelaides) euchenor rosselanus Rothschild, 1908	rosselanus Rothschild, 1908				Rossel Island Louisiades Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) euchenor subcoerulea Rothschild, 1915	subcoerulea Rothschild, 1915				Dampier Isles Australie
Papilio (Menelaides) euchenor sudestensis Rothschild, 1908	sudestensis Rothschild, 1908				Sudest Island Louisiades Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) gigon gigon C. & R. Felder, 1864	gigon gigon = <i>Papilio gigon</i> = <i>Menelaides gigon</i>	C. & R. Felder, 1864	Commun		Sulawesi, Buton island, Kabaena island, Siao Îles Sangihe Indonésie
Papilio (Menelaides) gigon mangolinus Fruhstorfer, 1899	mangolinus Fruhstorfer, 1899				Peleng Îles Banggai, Mangole, Sanana, Taliabu Îles Sula Indonésie
Papilio (Menelaides) gigon neriotas Rothschild, 1908	neriotas Rothschild, 1908				Îles Talaud, Sangihe Îles Sangihe Indonésie
Papilio (Menelaides) liomedon Moore, [1874]	liomedon = <i>Papilio demolion liomedon</i> = <i>Princeps liomedon</i>	Moore, [1874]	assez rare. Protégé		Calicut, Malabar coast, Ouest de Ghats Sud de l' Inde
	Groupe des <i>?</i>				
Papilio (Menelaides) luzviae Schröder & Treadaway, 1991	luzviae = <i>Menelaides luzviae</i>	Schröder & Treadaway, 1991	Croisement ente <i>Papilio deiphobus rumanzovia</i> et <i>Papilio memnon lowii</i>		Marinduque Philippines
Papilio (Menelaides) "pseudoluzviae" Page & Treadaway, 2003	"pseudoluzviae" = <i>Menelaides "pseudoluzviae"</i>	Page & Treadaway, 2003	Hybride?		Mindoro Philippines
	Groupe des <i>aegeus</i>				
Papilio (Menelaides) aegeus adrastus C. & R. Felder, [1864]	aegeus adrastus = <i>Papilio adrastus</i> = <i>Papilio aegeus</i> f. <i>priasa</i> = <i>Papilio aegeus</i> f. <i>tellias</i>	C. & R. Felder, [1864]			Îles Banda Moluques Indonésie
Papilio (Menelaides) aegeus aegatinus Rothschild, 1908	aegatinus = <i>Papilio aegeus aegatinus</i> f. <i>melia</i> = <i>Papilio aegeus aegatinus</i> f. <i>myrtis</i>	Rothschild, 1908			Noemfoor Island Papouasie Indonésie
Papilio (Menelaides) aegeus goramensis Rothschild, 1908	goramensis Rothschild, 1908				Goram Island Indonésie
Papilio (Menelaides) aegeus keianus Rothschild, 1896	keianus = <i>Papilio aegeus keianus</i> f.f. <i>amaranta</i> = <i>Papilio aegeus keianus</i> f.f. <i>blanca</i>	Rothschild, 1896			Kei Island Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
Papilio (Menelaides) aegeus aegeus Donovan, 1805	aegeus = Papilio aegeus = Papilio erectheus = Papilio oberon = Papilio doddi = Papilio f. abator? = Menelaides aegeus = Papilio aegeus f. tullia = Papilio aegeus f. beatrix = Papilio aegeus ab. dolorosa = Papilio aegeus ab. leucotaenia	Donovan, 1805 Pnc: <i>Citrus sinensis</i> , <i>C. reticulata</i> , <i>C. aurantium</i> , <i>C. aurantifolia</i> , <i>C. limon</i> , <i>C. medica</i> , <i>C. pardisi</i> , <i>Gejera salicifolia</i> , <i>G. parviflora</i> , <i>Flindersia</i> , <i>Poncitrus trifoliata</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Cryptocarpa glaucescens</i> , <i>Aristolochia elegans</i> , <i>Capparis nobilis</i> , <i>Acronychia</i> , <i>Choisya ternata</i> , <i>Clausena brevistyla</i> , <i>Eriostemon lanceolatus</i> , <i>E. myoporoides</i> , <i>Fagara</i> , <i>Findersia australis</i> , <i>F. bennettiana</i> , <i>F. collina</i> , <i>F. ifflaiana</i> , <i>F. laevicarpa</i> , <i>F. oppositifolia</i> , <i>F. pimenteliana</i> , <i>F. schottiana</i> , <i>F. xanthoxyla</i> , <i>Fortunella</i> , <i>Halfordia</i> , <i>Melicope erythrococca</i> , <i>M. melanophloia</i> , <i>Microcitrus australasica</i> , <i>M. australis</i> , <i>M. garrawayae</i> , <i>M. inodora</i> , <i>Micromelum minutum</i> , <i>Murraya koenigii</i> , <i>Phebalium ambiens</i> , <i>P. dentatum</i> , <i>Zanthoxylum alanthoides</i> , <i>Z. brachycanthum</i> , <i>Z. nitidum</i> , <i>Z. veneficum</i> , <i>Zieria laevigata</i> , <i>Z. smithii</i> , <i>Owenia venosa</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Apium graveolens</i>	Commun	Cape York, Est de Victoria, Sud de l' Australie
Papilio (Menelaides) aegeus kissuanus Rothschild, 1908	kissuanus Rothschild, 1908			Watubela Island, Goram Island Indonésie
Papilio (Menelaides) aegeus oritas Godman & Salvin, 1879	oritas = Papilio oritas = Papilio aegeus oritas f. ximene = Papilio aegeus oritas f. capsus = Papilio aegeus oritinus	Godman & Salvin, 1879		Nouvelle Irlande, Nouveau Hanovre Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) aegeus ormenulus Fruhstorfer, 1902	ormenulus = Menelaides aegeus ormenulus	Fruhstorfer, 1902		Kiriwina Fergusson, D'Entrecasteaux Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) aegeus ormenus Guérin-Ménéville, [1831]	ormenus = Papilio ormenus = Papilio pandion = Papilio amanga = Papilio onesimus = Papilio aegeus aegates = Papilio euchenor euchenides = Papilio ormenus var. polydorina = Papilio aegeus ormenus ab.f. inornatus = Papilio aegeus ormenus f. seleucis = Papilio aegeus ormenus f. leporina = Papilio aegeus ormenus f. ormenus = Papilio aegeus ormenus ab.f. pandion = Papilio aegeus ormenus f. pandion = Papilioa aegeus ormenus f. inornatus = Papilio aegeus ormenus f. onesimus = Papilio aegeus ormenus ab.f. polydorinus = Papilio aegeus ormenus ab.f. amanga = Papilio aegeus ormenus f. amanga = Papilio aegeus ormenus f. aegates = Papilio aegeus ormenus f. pandoxus	Guérin-Ménéville, [1831]		Aru, Missol, Salawari, Jobi, Waigen, Ouest de l'Irian Indonésie , Milne Bay, Trobriand, D'Entrecasteaux, Woodlark, Lousiades, Torres Straits Papouaise-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) aegeus othello Grose-Smith, 1894	othello = Papilio othello = Papilio aegeus f. desmedona = Papilio aegeus f. thuria = Papilio aegeus f. obscurata = Papilio aegeus ormenus ab.f. othello	Grose-Smith, 1894		Biak Indonésie
Papilio (Menelaides) aegeus websteri Grose-Smith, 1894	websteri = Papilio websteri = Papilio aegeus websteri f. sopaea = Papilio aegeus bismarckianus = Menelaides aegeus bismarckianus	Grose-Smith, 1894		Nouvelle Bretagne Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) bridgei bridgei Mathew, 1886	bridgei bridgei = Papilio bridgei = Papilio bridgei nobilior = Menelaides bridgei = Princeps bridgei = Papilio bridgei ab. gorei = Papilio bridgei bridgei f. gorei = Papilio bridgei ab. pseudoprospéro	Mathew, 1886	Pnc: <i>Citrus</i>	Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée , Choiseul, Santa Isabel, Treasury Island, Fauro Island, Alu island Îles Shortland Îles Salomon , Munia island Îles Fidji
Papilio (Menelaides) bridgei fischeri Ribbe, 1900	fischeri = Papilio bridgei var. fischeri	Ribbe, 1900		Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée , Nord de Choiseul Îles Salomons
Papilio (Menelaides) bridgei hecataeus Godman & Salvin, 1888	hecataeus = Papilio hecataeus	Godman & Salvin, 1888		Guadalcanal Îles Salomon
Papilio (Menelaides) bridgei michae Racheli, 1984	michae Racheli, 1984			Malaita Îles Salomons
Papilio (Menelaides) bridgei ortegae Rothschild, 1904	ortegae Rothschild, 1904			Florida Islands Îles Salomon
Papilio (Menelaides) bridgei prospero Grose-Smith, 1889	prospero = Papilio prospero = Papilio prospero ab. rookiensis = Papilio bridgei prospero ab. rookiensis	Grose-Smith, 1889		New Georgia Group, Île de Rook Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) bridgei tryoni Mathew, 1889	tryoni = Papilio tryoni	Mathew, 1889		Ugi, San Cristobal Îles Salomon
Papilio (Menelaides) erskinei Mathew, 1886	erskinei = Papilio woodfordi erskinei	Mathew, 1886		Ugi Island Nord de San Cristobal Îles Salomon
Papilio (Menelaides) gambrisius arachosius Fruhstorfer, 1921	gambrisius arachosius Fruhstorfer, 1921			Waigeu Indonésie
Papilio (Menelaides) gambrisius buruanus Rothschild, 1897	buruanus Rothschild, 1897		peu commun	Buru Indonésie
Papilio (Menelaides) gambrisius colossus Fruhstorfer, 1899	colossus Fruhstorfer, 1899			Ceram Indonésie
Papilio (Menelaides) gambrisius gambrisius Cramer, [1777]	gambrisius = Papilio gambrisius = Papilio amphitron = Papilio fusconiger = Papilio drusius = Papilio drimachus = Papilio gambrisius ab.m. abbreviatus = Menelaides gambrisius	Cramer, [1777]		Ambon Moluques, Sulawesi Indonésie
Papilio (Menelaides) heringi Niepelt, 1924	heringi = Princeps heringi	Niepelt, 1924	rare. Hybride entre Papilio fuscus lapathus et Papilio tydeus tydeus	Halmahera Indonésie
Papilio (Menelaides) inopinatus Butler, 1883	inopinatus = Papilio nopinatus inauris = Papilio inopinatus kosmos = Menelaides inopinatus	Butler, 1883	Commun	Romang, Babar, Damar, Tanimbar Lesser Sunda Islands, Timor Indonésie
Papilio (Menelaides) ptolychus Godman & Salvin, 1888	ptolychus = Menelaides ptolychus	Godman & Salvin, 1888	Commun	Malaita, Guadalcanal, Florida Island Îles Salomon
Papilio (Menelaides) tydeus obiensis Rothschild, 1898	tydeus obiensis Rothschild, 1898			Obi Indonésie
Papilio (Menelaides) tydeus tydeus C. & R. Felder, 1860	tydeus = Papilio tydeus = Menelaides tydeus	C. & R. Felder, 1860	Commun	Bachan, Ternate, Halmahera, Morotai Moluques
Papilio (Menelaides) weymeri Niepelt, 1914	weymeri = Princeps weymeri = Papilio cartereti = Menelaides weymeri	Niepelt, 1914	Localisé et rare	Manus, Îles de l' Amirauté Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) woodfordi ariel Grose-Smith, 1889	woodfordi ariel = Papilio ariel = Papilio laarchus ariel	Grose-Smith, 1889		Santa Isabel Îles Salomon
Papilio (Menelaides) woodfordi choiseuli Rothschild, 1908	choiseuli Rothschild, 1908			Choiseul Îles Salomon
Papilio (Menelaides) woodfordi gimblei Tennet, 1999	gimblei Tennet, 1999			Hauta, San Cristobal Îles Salomon
Papilio (Menelaides) woodfordi laarchus Godman & Salvin, 1888	laarchus = Papilio laarchus	Godman & Salvin, 1888		New Georgia Group Îles Salomon
Papilio (Menelaides) woodfordi mome Tennet, 1999	mome Tennet, 1999			Sud de Malaita Îles Salomon
Papilio (Menelaides) woodfordi woodfordi Godman & Salvin, 1888	woodfordi = Papilio woodfordi = Princeps woodfordi = Menelaides woodfordi	Godman & Salvin, 1888	Pnc: <i>Citrus</i> pas rare	Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée , Shortland Island Îles Salomon

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
		Groupe des <i>godeffroyi</i>		
<i>Papilio (Menelaides) amynthor</i> Boisduval, 1859	<i>amynthor</i> = <i>Papilio iloneus</i> = <i>Papilio amphiarus</i> = <i>Papilio abstrusus</i> = <i>Papilio amyntor</i> = <i>Menelaides amynthor</i> = <i>Papilio amynthor iloneus</i> = <i>Papilio amynthor amynthor</i> = <i>Papilio iloneus ab. amynthor</i>	Boisduval, 1859 Pnc: <i>Citrus</i>	Commun	Nouvelle Calédonie, Îles Loyauté France, Norfolk Island Australie
<i>Papilio (Menelaides) godeffroyi</i> Semper, 1866	<i>godeffroyi</i> = <i>Princeps godeffroyi</i>	Semper, 1866	peu commun	Upolu Îles Samoa
<i>Papilio (Menelaides) schmeltzi</i> Herrich-Schäffer, 1869	<i>schmeltzi</i> = <i>Princeps schmeltzi</i>	Herrich-Schäffer, 1869 Pnc: <i>Citrus</i>	Protégé mais assez commun	Ovalau Île Fidji
	Groupe des <i>polytes</i>			
<i>Papilio (Menelaides) ambrax ambrax</i> Boisduval, 1832	<i>ambrax</i> <i>ambrax</i> = <i>Papilio ambrax</i> = <i>Papilio orophanes</i> = <i>Menelaides ambrax</i> = <i>Papilio ambracia</i> = <i>Papilio ambrax ab.m. conspectus</i> = <i>Papilio mabrax ab. ambracius</i> = <i>Papilio ambrax ambracia f. lutosa</i> = <i>Papilio akames</i> = <i>Papilio ambrax akames</i> = <i>Papilio decebalus</i> = <i>Papilio ambrax decebalus</i> = <i>Papilio ambrax decebalus f. ambracina</i> = <i>Papilio ambrax mazaïos</i>	Boisduval, 1832 Pnc: <i>Citrus</i> , <i>Morinda citrifolia</i> , <i>Clausena brevistyla</i> , <i>Limonia acidissima</i> , <i>Microcitrus garrawayae</i> , <i>M. inodora</i> , <i>Murraya koenigii</i> , <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> , <i>Z. brachyacanthum</i> , <i>Z. nitidum</i> , <i>Z. ovalifolium</i>	Commun	Ouest de l'Irian Indonésie à Papouasie, Milne Bay, Île Fergusson Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaides) ambrax artanus</i> Rothschild, 1908	<i>artanus</i>	Rothschild, 1908		Nunfor, Geelvink Bay Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) ambrax dunali</i> Montrouzier, 1856	<i>dunali</i> = <i>Papilio dunali</i>	Montrouzier, 1856		Woodlark Island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaides) ambrax egipius</i> Miskin, 1876	<i>egipius</i> = <i>Papilio egipius</i>	Miskin, 1876		Cairns, Mackay Australie
<i>Papilio (Menelaides) ambrax epirus</i> Wallace, 1865	<i>epirus</i> = <i>Papilio epirus</i>	Wallace, 1865		Aru Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) alphenor alphenor</i> Cramer, [1776]	<i>alphenor</i> <i>alphenor</i> = <i>Papilio alphenor</i> = <i>Papilio gronovi</i> = <i>Princeps alphenor</i> = <i>Papilio polytes alphenor</i>	Cramer, [1776]		Ambon, Ceram Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) alphenor ledebouria</i> Eschscholtz, 1821	<i>ledebouria</i> = <i>Papilio ledebouria</i> = <i>Papilio elyros</i> = <i>Papilio horsfieldii</i> = <i>Papilio polytes alphenor f.f. horsfieldi</i> = <i>Papilio polytes alphenor f.f. alphenor</i> = <i>Papilio polytes alphenor f.f. loc. ledebourius</i> = <i>Papilio polytes alphenor f.f. loc. elyros</i> = <i>Papilio polytes ledebouria</i> = <i>Papilio polytes ledebouria f. praxilla</i> = <i>Papilio polytes ledebouria f. elyros</i> = <i>Papilio polytes ledebouria f. horsfieldi</i> = <i>Menelaides polytes ledebouria</i>	Eschscholtz, 1821		Toutes les Philippines excepté Batanes
<i>Papilio (Menelaides) alphenor perversus</i> Rothschild, 1895	<i>perversus</i> = <i>Papilio polytes perversus</i> = <i>Papilio polytes f.f. martius</i> = <i>Papilio polytes f.f. atavus</i> = <i>Papilio polytes alpheios</i>	Rothschild, 1895		Nord du Sulawesi, Sao island, Îles Talaud, Îles Sangihe Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) alphenor polycritus</i> Fruhstorfer, 1901	<i>polycritus</i> = <i>Papilio polytes polycritus</i> = <i>Papilio polytes falcidius</i>	Fruhstorfer, 1901		Peleng Îles Banggai, Taliabu, Sanana Îles Sula Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) phestus minusculus</i> Ribbe, 1898	<i>phestus</i> <i>minusculus</i>	Ribbe, 1898		New Georgia Group Îles Salomon
<i>Papilio (Menelaides) phestus parkinsoni</i> Honrath, 1886	<i>parkinsoni</i> = <i>Papilio parkinsoni</i> = <i>Papilio parkinsoni var. minor</i> = <i>Papilio phestus ab. minor</i> = <i>Menelaides phestus parkinsoni</i>	Honrath, 1886		Nouvelle Bretagne Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaides) phestus phestus</i> Guérin-Ménéville, 1830	<i>phestus</i> = <i>Papilio phestus</i> = <i>Menelaides phestus</i>	Guérin-Ménéville, 1830 Pnc: <i>Citrus</i>	Commun	Nouvelle Irlande, Nouveau Hanovre Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaides) phestus reductus</i> Rothschild, 1915	<i>reductus</i>	Rothschild, 1915		Île Manus Îles de l'Amirauté Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaides) polytes alcindor</i> Oberthür, 1879	<i>polytes</i> <i>alcindor</i> = <i>Papilio pammon var. alcindor</i> = <i>Papilio alphenor var. thesalphenor</i> = <i>Papilio polytes passienus</i>	Oberthür, 1879		Sulawesi, Selayar, Buton island, Kabaena island Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) polytes flavolineatus</i> Chou, Yuan & Wang, 2000	<i>flavolineatus</i>	Chou, Yuan & Wang, 2000		Nantong, Jiangsu Chine
<i>Papilio (Menelaides) polytes javanus</i> Felder, 1862	<i>javanus</i> = <i>Papilio pammon var. javanus</i> = <i>Papilio antiphus</i> = <i>Papilio polytes thesues f.f. javanus</i>	Felder, 1862		Sud de Sumatra, Java, Biliton, Bali Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) polytes liujidongi</i> Huang, 2003	<i>liujidongi</i>	Huang, 2003		Nujian valley Nord-ouest duYunnan Chine
<i>Papilio (Menelaides) polytes messius</i> Fruhstorfer, 1909	<i>messius</i>	Fruhstorfer, 1909		Lombok, Sumba, Sumbawa, Tana-Djampea, Bonerate, Alor Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) polytes nicanor</i> C. & R. Felder, 1865	<i>nicanor</i> = <i>Papilio nicanor</i> = <i>Papilio polytes nicanor f.f. manzer</i> = <i>Papilio polytes nicanor f.f. typicus</i> = <i>Papilio nicanor ab. caninor</i>	C. & R. Felder, 1865		Morotai, Halmahera, Ternate, Bachan, Oti Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) polytes nicomachus</i> Fruhstorfer, 1909	<i>nicomachus</i>	Fruhstorfer, 1909		Buru Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) polytes nikobarus</i> C. Felder, 1862	<i>nikobarus</i> = <i>Papilio pammon var. nikobarus</i>	C. Felder, 1862		Nicobar Island Inde
<i>Papilio (Menelaides) polytes obscurus</i> Chou, Yuan & Wang, 2000	<i>obscurus</i> = <i>Papilio obscurus</i>	Chou, Yuan & Wang, 2000		Lushan, Sichuan Chine
<i>Papilio (Menelaides) polytes pasikrates</i> Fruhstorfer, 1908	<i>pasikrates</i> = <i>Papilio polytes pasikrates f. fulvifasciatus</i> = <i>Papilio polytes pasikrates m.ab. gynaiensis</i> = <i>Papilio polytes pasikrates f.f. baikiensis</i> = <i>Menelaides polytes pasikrates</i>	Fruhstorfer, 1908 Pnc: <i>Citrus</i> , <i>Zanthoxylum nitidum</i> , <i>Clausena excavata</i> , <i>Toddalia asiatica</i>		Taiwan , Batanes Philippines
<i>Papilio (Menelaides) polytes polytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>polytes</i> = <i>Papilio polytes</i> = <i>Papilio depicta</i> = <i>Papilio ocha</i> = <i>Papilio polytes ab. chrysos</i> = <i>Papilio polytes ab. inaequalis</i> = <i>Papilio polytes ab. nubes</i> = <i>Papilio abdulaziza</i> = <i>Papilio astyanax</i> = <i>Papilio hector</i> = <i>Papilio chalcas</i> = <i>Papilio pammon</i> = <i>Princeps heroicus stichius</i> = <i>Papilio polytes f. sticius</i> = <i>Papilio polytes ab.f. stichius</i> = <i>Menelaides polytes</i> = <i>Papilio polytes thibetanus</i> = <i>Papilio pammon var. borealis</i> = <i>Papilio pammon var. thibetanus</i> = <i>Papilio polytes yunnan</i> = <i>Papilio polytes flavolineatus</i> = <i>Papilio obscuras</i> = <i>Papilio polytes borealis</i> = <i>Papilio polytes borelis ab. thibetanus</i> = <i>Papilio polytes borealis f.f. mandane</i> = <i>Papilio polytes polycles</i>	(Linnaeus, 1758) Pnc: <i>Citrus maxima</i> , <i>C. limonia</i> , <i>C. medica</i> , <i>C. microcarpa</i> , <i>C. paradiisi</i> , <i>C. reticulata</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Clausena latinum</i> , <i>Fortunella japonica</i> , <i>F. hindsii</i> , <i>Glycosmis citricola</i> , <i>G. parviflora</i> , <i>Zanthoxylum aviceena</i> , <i>Z. scandens</i> , <i>Z. nitidum</i> , <i>Z. myriacanthum</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Murraya</i> , <i>Poncirus</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Triphasia</i> , <i>Aegle</i> sp., <i>Euodia glabrifolia</i> , <i>Atalanta buxifolia</i>	Commun	Ha Giang, Vinh Phu Vietnam , Ouest et sud de la Chine , Amami isles, Okinawa isles, Miyako isles, Iriomotejima island, Ishigakijima island Japon
<i>Papilio (Menelaides) polytes romulus</i> Cramer, [1775]	<i>romulus</i> = <i>Papilio romulus</i> = <i>Papilio cyrus</i> = <i>Papilio mutus</i> = <i>Papilio ceylanicus</i> = <i>Papilio sakontala</i>	Cramer, [1775]		Népal, Sikkim, Malabar Inde à Myanmar, Sri Lanka, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Langkawi island, Perak Péninsule malaise Malaisie , Tioman, Aur, Singapour

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018	
Papilio (Menelaides) polytes romulus Cramer, [1775]	= Papilio polytes var. ceylanicus = Papilio wakeri = Papilio polytes f. f. rubida = Papilio polytes romulus m. ab. astreans = Papilio polytes ab. chrysos = Papilio polytes pammon f. cyroides = Papilio polytes ab. coomani = Papilio polytes f. joannisi = Papilio polytes ab. oblitterata = Papilio polytes f.f. cyrus = Papilio polytes romulus f. indiv. f. rufopalmeta = Papilio polytes f.f. loc. romulus = Papilio polytes neomelanides = Papilio polytes romulus f.f. cyrus = Papilio polytes romulus f.f. polytes = Papilio polytes romulus f.f. theseus = Princeps polytes romulus = Princeps polytes romulus f. polytes = Papilio polytes neomelanides		
Papilio (Menelaides) polytes rubeus Page & Treadaway, 2011	rubeus Page & Treadaway, 2011		Karimata Island Indonésie
Papilio (Menelaides) polytes sotira Jordan, 1909	sotira Jordan, 1909		Sumbawa Indonésie
Papilio (Menelaides) polytes steffi (Page & Treadaway, 2003)	steffi (Page & Treadaway, 2003)		Bongao, Cavan Cavan Sibutu, Tawitawi Philippines
Papilio (Menelaides) polytes stichioides Evans, 1927	stichioides Evans, 1927		Sud de l'île Andaman Inde
Papilio (Menelaides) polytes theseus Cramer, [1777]	theseus Cramer, [1777]		Sumatra, Kalimantan Borneo Indonésie
Papilio (Menelaides) polytes timorensis C. & R. Felder, 1864	timorensis C. & R. Felder, 1864		Wetar, Leti, Timor, Babar Island Indonésie
Papilio (Menelaides) polytes tucanus Jordan, 1909	tucanus Jordan, 1909		Binongko, Kaledupa ÎlesTukangbesi Indonésie
Papilio (Menelaides) polytes vigellius Fruhstorfer, 1909	vigellius Fruhstorfer, 1909		Bawean Indonésie
Groupe des castor			
Papilio (Menelaides) castor castor Westwood, 1842	castor castor Westwood, 1842	Commun	Assam, Sikkim Inde, Bangladesh
Papilio (Menelaides) castor dioscursus Jordan, 1909	dioscursus Jordan, 1909		Than Moi Nord du Vietnam
Papilio (Menelaides) castor formosanus Rothschild, 1896	formosanus Rothschild, 1896	Pnc: Toddalia asiatica, Murraya paniculata, M. crenulata, Clycosmis citrifolia	Kelung Nord de Taiwan
Papilio (Menelaides) castor hamela Crowley, 1900	hamela Crowley, 1900		Hainan Chine
Papilio (Menelaides) castor kanlanpanus Rothschild, 1895	kanlanpanus Rothschild, 1895		
Papilio (Menelaides) castor khmer Bouillet & Le Cerf, 1912	khmer Bouillet & Le Cerf, 1912		Phnom-Penh Cambodge
Papilio (Menelaides) castor neocastor Chou, Yuan & Wang, 2000	neocastor Chou, Yuan & Wang, 2000		Wuzhishann Hainan Chine
Papilio (Menelaides) dravidarum Wood-Mason, 1880	dravidarum Wood-Mason, 1880	Peu commun. Copie Euploea core	Ouest de Ghats Sud de l'Inde
Papilio (Menelaides) mahadeva choui Li, 1994	mahadeva choui Li, 1994		Longzhou Guangxi Chine
Papilio (Menelaides) mahadeva mahadeva Moore, [1878]	mahadeva Moore, [1878]	Peu commun	Moolai à Moolat Tenasserim Sud du Myanmar, Chanthaburi, Phetchaburi, Ranong, Yala Thaïlande, Vang Vieng, Thabok, Hinboun Laos, Dong Nai Sud du Vietnam, Langkawi Island, Péninsule malaise Malaisie
Papilio (Menelaides) mahadeva mehala Grose-Smith, 1886	mehala Grose-Smith, 1886		Toungoo centre du Myanmar, Prae Nord de la Thaïlande, Nord du Laos
Groupe des fuscus			
Papilio (Menelaides) albinus albinus Wallace, 1865	albinus albinus Wallace, 1865	Localisé et rare	Ouest de l'Irian Indonésie
Papilio (Menelaides) albinus lesches Godman & Salvin, 1880	lesches Godman & Salvin, 1880		Nouvelle Guinée Indonésie et Papouaise-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) albinus sekarensis Honrath, 1885	sekarensis Honrath, 1885		Sekar Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) antonio antonio Hewitson, 1875	antonio antonio Hewitson, 1875	Localisé et peu communn	Basilan, Leyte, Mindanao Philippines
Papilio (Menelaides) antonio negrosiana Schroeder & Treadaway, 1991	negrosiana Schroeder & Treadaway, 1991		Ayungon, Sud de Negros Philippines
Papilio (Menelaides) diophantus Grose-Smith, 1883	diophantus Grose-Smith, 1883	Peu commun	Nord de Sumatra Indonésie
Papilio (Menelaides) fuscus beccarii Oberthür, 1880	fuscus beccarii Oberthür, 1880		Ouest de l'Irian, Nord-ouest de la Nouvelle Guinée
Papilio (Menelaides) fuscus capaneus Westwood, 1843	capaneus Westwood, 1843		Cape York, Thursday Isles, Nord des Nouvelles Galles du Sud, Nord du Queensland Australie
Papilio (Menelaides) fuscus cilix Godman & Salvin, 1879	cilix Godman & Salvin, 1879		Nouveau Hanovre, Nouvelle Irlande, Nouvelle Bretagne Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papilio (Menelaides) fuscus alorensis Rothschild, 1894	alorensis Rothschild, 1894		Alor Indonésie
Papilio (Menelaides) fuscus burgessi Samson, 1982	burgessi Samson, 1982		Vanuatu Nouvelles Hébrides
Papilio (Menelaides) fuscus canopinus Rothschild, 1895	canopinus Rothschild, 1895		Roma Island, Leti Island, Moa Indonésie
Papilio (Menelaides) fuscus canopus Westwood, 1842	canopus Westwood, 1842		Territoire du Nord, Melville Island, Nord du Queensland Nord-ouest de l'Australie
Papilio (Menelaides) fuscus cristobalensis Samson, 1982	cristobalensis Samson, 1982		San Cristobal Îles Salomon

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018		
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus croton</i> Fruhstorfer, 1904	<i>croton</i> = <i>Papilio canopus croton</i>	Fruhstorfer, 1904	Damar Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus dayacus</i> Rothschild, 1908	<i>dayacus</i>	Rothschild, 1908	Mt. Kinabalu Nord de Borneo Malaisie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus fuscus</i> Goeze, 1779	<i>fuscus</i> = <i>Papilio fuscus</i> = <i>Papilio fuscus offakus</i> = <i>Menelaïdes fuscus</i> = <i>Papilio cinereomaculatus</i> = <i>Papilio severus</i> = <i>Papilio castaneus</i> = <i>Papilio fuscus fuscus f. madanus</i> = <i>Papilio fuscus madanus</i> = <i>Papilio fuscus castaneus</i>	Goeze, 1779 Pnc: <i>Citrus aurantium</i> , <i>C. aurantifolia</i> , <i>C. limon</i> , <i>C. reticulata</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Glycosmis pentaphylla</i> , <i>Micromelum minutum</i> , <i>Bosistoa brassii</i> , <i>Clausena revistyla</i> , <i>Euodia</i> , <i>Fagara</i> , <i>Geijera</i> , <i>Halfordia scleroxyla</i> , <i>Microcitrus australasica</i> , <i>M. garrawayae</i> , <i>M. inodora</i> , <i>Murraia koenigii</i> , <i>Morinda</i> , <i>Murraia</i> , <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> , <i>Z. brachyacanthum</i> , <i>Z. nitidum</i>	Buru, Ambon, Ceram Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus gyrei</i> Tennent, 1999	<i>gyrei</i>	Tennent, 1999	Nord-est d'Auki, Malaita Îles Salomon
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus hasterti</i> Ribbe, 1907	<i>hasterti</i> = <i>Papilio xenophilus hasterti</i>	Ribbe, 1907	Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée, Choiseul Îles Salomon
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus hypsicles</i> Hewitson, 1868	<i>hypsicles</i> = <i>Papilio hypsicles</i> = <i>Papilio canopus hypsicles</i>	Hewitson, 1868	Nouvelles Hébrides Vanuatu
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus hypsiclides</i> Rothschild, 1894	<i>hypsiclides</i> = <i>Papilio vollenhovii hypsiclides</i> = <i>Papilio canopus hypsiclides</i>	Rothschild, 1894	Wetar Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus indicatus</i> Butler, 1876	<i>indicatus</i> = <i>Papilio indicatus</i>	Butler, 1876	Sud de la Nouvelle Guinée, d'Entrecasteaux, Woodlark, Louisiades, Torres Straits island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus lamponius</i> Fruhstorfer, 1904	<i>lamponius</i> = <i>Papilio clix lamponius</i> = <i>Papilio albinus lamponius</i> = <i>Papilio fuscus f. lamponides</i>	Fruhstorfer, 1904	Nouvelle Bretagne, Ile Rook Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus lapathus</i> Fruhstorfer, 1904	<i>lapathus</i>	Fruhstorfer, 1904	Morotai, Halmahera, Ternate, Bachan Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus lunifer</i> Rothschild, 11895	<i>lunifer</i> = <i>Papilio hipponous lunifer</i> = <i>Menelaïdes fuscus lunifer</i>	Rothschild, 11895	Sangie island, Salebabu, Karakelong? Îles Talaud Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus metagenes</i> Fruhstorfer, 1904	<i>metagenes</i>	Fruhstorfer, 1904	Binongko, Kalidupa, Tukangbesi islands Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus minor</i> Oberthür, 1879	<i>minor</i>	Oberthür, 1879	Nord du Sulawesi, Sangihe, Siao Îles Sangihe Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus modestia</i> Tsukada & Nishiyama, 1980	<i>modestia</i> = <i>Papilio canopus modestia</i>	Tsukada & Nishiyama, 1980	Flores Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus nomus</i> Gabriel, 1936	<i>nomus</i>	Gabriel, 1936	Torres Isles Vanuatu
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus ombiranus</i> Rothschild, 1898	<i>ombiranus</i>	Rothschild, 1898	Obi Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus pyrgoteles</i> Fruhstorfer, 1916	<i>pyrgoteles</i> = <i>Papilio pyrgoteles</i>	Fruhstorfer, 1916	Saint Aignan island Archipel des Louisiades Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus pertinax</i> Wallace, 1865	<i>pertinax</i> = <i>Papilio pertinax</i>	Wallace, 1865	Sud et Sud-est du Sulawesi, Kabaena Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus porrothenus</i> Jordan, 1909	<i>porrothenus</i>	Jordan, 1909	Sud-Ouest du Sulawesi, Tanadjampea, Kalao, Selayar? Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus relmae</i> Tennent, 1999	<i>relmae</i>	Tennent, 1999	Route de Noro à Munda, Nouvelle Géorgie, New Georgia Group Îles Salomon
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus rotalita</i> (Swinhoe, 1893)	<i>rotalita</i> = <i>Charus rotalita</i> = <i>Papilio septimius</i>	(Swinhoe, 1893)	Anu, Key Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus sumbanus</i> Rothschild, 1886	<i>sumbanus</i> = <i>Papilio canopus sumbanus</i> = <i>Menelaïdes canopus sumbanus</i>	Rothschild, 1886	Patadala, Sumba Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus talyabona</i> Joicey & Talbot, 1932	<i>talyabona</i>	Joicey & Talbot, 1932	Mangole, Sanana Îles Sula Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus tenimberensis</i> Rothschild, 1896	<i>tenimberensis</i> = <i>Papilio canopus tenimberensis</i> = <i>Papilio canopus babberensis</i>	Rothschild, 1896	Tanimbar, Babar Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus thomsoni</i> Butler, 1884	<i>thomsoni</i> = <i>Papilio thomsoni</i> = <i>Papilio langeni</i> = <i>Papilio albinus thomsoni</i> = <i>Papilio albinus thomsoni</i> ab. <i>mordingtoni</i>	Butler, 1884	Kei island Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus umbrosus</i> Rothschild, 1894	<i>umbrosus</i> = <i>Papilio vollenhovii umbrosus</i> = <i>Papilio canopus umbrosus</i>	Rothschild, 1894	Sumbawa Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus vitilus</i> Fruhstorfer, 1921	<i>vitilus</i> = <i>Papilio fuscus oitylus</i>	Fruhstorfer, 1921	Yule Island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus vollenhovii</i> C. & R. Felder, 1865	<i>vollenhovii</i> = <i>Papilio vollenhovii</i> = <i>Papilio canopus vollenhovii</i>	C. & R. Felder, 1865	Timor Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus wasiensis</i> Hanafusa, 1991	<i>wasiensis</i>	Hanafusa, 1991	Wangiwangi Îles Tukangbesi Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) fuscus xenophilus</i> Mathew, 1886	<i>xenophilus</i> = <i>Papilio xenophilus</i> = <i>Papilio fuscus epibomius</i>	Mathew, 1886	Guadalcanal, Santa Isabel, Île Floride, Rendova, New Georgia Group Îles Salomon
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous bazilanus</i> Fruhstorfer, 1899	<i>hipponous bazilanus</i> = <i>Menelaïdes hipponous bazilanus</i>	Fruhstorfer, 1899	Basilan, Mindanao Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous bowringi</i> Prout, 1919	<i>bowringi</i>	Prout, 1919	Hainan Chine
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous daku</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>daku</i> = <i>Menelaïdes hipponous daku</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Boac Marinduque, Mindoro Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous gamay</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>gamay</i> = <i>Menelaïdes hipponous gamay</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Balabac, Irawan Palawan Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous hipponous</i> C. & R. Felder, 1862	<i>hipponous</i> = <i>Papilio hipponous</i> = <i>Menelaïdes hipponous</i> = <i>Menelaïdes hipponous hipponous</i>	C. & R. Felder, 1862 Pnc: <i>Citrus</i>	Camiguin de Luzon, Luzon, Mindanao Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous jalanii</i> Abang & Page, 2006	<i>jalanii</i>	Abang & Page, 2006	Balambangan Island, Banggai Island Sabah Malaisie
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous leptopsephus</i> Fruhstorfer, 1909	<i>leptopsephus</i> = <i>Papilio pitmani leptopsephus</i>	Fruhstorfer, 1909	Assam Nord de l'Inde, Haute Birmanie Myanmar
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous lunifer</i> Rothschild, 1894	<i>lunifer</i>	Rothschild, 1894	Talaud, Sangir Island Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous lynn</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>lynn</i> = <i>Menelaïdes hipponous lynn</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Araceli Cuyo Island Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous madil</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>madil</i> = <i>Menelaïdes hipponous madil</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Coron Busuanga Calamian group Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous palpag</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>palpag</i> = <i>Menelaïdes hipponous palpag</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Sanga Sanga, Cavan Cavan Sibutu, Tawitawi Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) hipponous rolandi</i> (Page & Treadaway, 2003)	<i>rolandi</i> = <i>Menelaïdes hipponous rolandi</i>	(Page & Treadaway, 2003)	Panay, Bilir Bohol, Siqiuir, Negros Philippines
<i>Papilio (Menelaïdes) pitmani duboisi</i> Vitalis de Salvaza, 1921	<i>pitmani duboisi</i> = <i>Papilio hipponous</i> var. <i>duboisi</i> = <i>Papilio hipponous</i> var. <i>montpezzati</i> = <i>Papilio prexaspes intricatus</i> = <i>Papilio prexaspes duboisi</i>	Vitalis de Salvaza, 1921	Huu Lien, Lang Son Nord du Vietnam, Trang Bom Forest, Ma-Da forest Dong Nai Sud du Vietnam
<i>Papilio (Menelaïdes) pitmani pitmani</i> Elwes & de Nicéville, [1887]	<i>pitmani</i> = <i>Papilio pitmani</i> = <i>Princeps pitmani</i> = <i>Papilio hipponous siamensis</i> = <i>Papilio hipponous pitmani</i> = <i>Menelaïdes pitmani pitmani</i> = <i>Papilio prexaspes pitmani</i>	Elwes & de Nicéville, [1887]	Sud du Myanmar, Kanchanaburi, Chanthaburi, Phetchaburi Thaïlande, Vientiane, Thabok Laos
<i>Papilio (Menelaïdes) jordani</i> Fruhstorfer, 1906	<i>jordani</i>	Fruhstorfer, 1906	Localisé et rare Nord du Sulawesi Indonésie
<i>Papilio (Menelaïdes) noblei</i> de Nicéville, [1889]	<i>noblei</i> = <i>Papilio henricus</i> = <i>Papilio noblei f. vitalisi</i> = <i>Papilio noblei haynei</i> = <i>Papilio noblei f. indiv. m. anteratra</i> = <i>Papilio noblei hoa</i>	de Nicéville, [1889]	Localisé et peu commun Myitkyina Nord du Myanmar, Nan Nord de la Thaïlande, Xaignabouri, Thabok, Hinboun, Lak Sao Nord du Laos, Cambodge, Nord du Vietnam, Yunnan Sud de la Chine
<i>Papilio (Menelaïdes) prexaspes andamanicus</i> Rothschild, 1908	<i>prexaspes andamanicus</i> = <i>Papilio fuscus andamanicus</i>	Rothschild, 1908	Îles Andamans Inde, Phangnga Tum Nung Waterfall Thaïlande

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
<i>Papilio (Menelaides) prexaspes</i> prexaspes C. & R. Felder, [1865]	<i>prexaspes</i> = <i>Papilio prexaspes</i> = <i>Princeps prexaspes</i> = <i>Papilio fuscus prexaspes</i> = <i>Princeps prexaspes prexaspes</i>	C. & R. Felder, [1865]			Yala sud de la Thaïlande , Péninsule malaise Malaisie , Sumatra Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) sakontala</i> Hewitson, 1852	<i>sakontala</i> = <i>Papilio polytes</i> ab. <i>sakontala</i>	Hewitson, 1852			Assam, Naga Hills Nord de l' Inde , Bangladesh
	Groupe des <i>helenus</i>				
<i>Papilio (Menelaides) helenus biseriatus</i> Rothschild, 1895	<i>helenus biseriatus</i>	Rothschild, 1895			Dili, Timor Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) helenus boloboca</i> Page & Treadaway, 1996	<i>boloboca</i> = <i>Menelaides helenus boloboca</i>	Page & Treadaway, 1996			Bongao, Sanga Sanga, Sibutu, Tawi-tawi Philippines
<i>Papilio (Menelaides) helenus daksha</i> Hampson, 1888	<i>daksha</i> = <i>Papilio daksha</i> = <i>Charus daksha</i>	Hampson, 1888			Sud de l' Inde
<i>Papilio (Menelaides) helenus enganius</i> Doherty, 1891	<i>enganius</i> = <i>Papilio helenus</i> var. <i>enganius</i> = <i>Charus helenus</i> var. <i>enganius</i>	Doherty, 1891			Sumatra, Java, Bali, Lombok, Kalimantan Borneo, Nias Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) helenus fortunius</i> Fruhstorfer, 1908	<i>fortunius</i> = <i>Papilio helenus fortunius</i> ab. <i>opacus</i>	Fruhstorfer, 1908	Pnc: <i>Zanthoxylum nitidum</i> , <i>Z. alanthoides</i> , <i>Citrus</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Euodia mellifolia</i> , <i>Fagara nitida</i>		Taiwan
<i>Papilio (Menelaides) helenus helenus</i> Linnaeus, 1758	<i>helenus</i> = <i>Papilio helenus</i> = <i>Charus helenus</i> = <i>Menelaides helenus</i> = <i>Papilio helenus</i> ab. <i>rufatus</i> = <i>Papilio helenus aurus</i> = <i>Papilio helenus</i> ab. <i>aurea</i> = <i>Papilio helenus aspadantus</i> = <i>Princeps helenus helenus</i>	Linnaeus, 1758	Pnc: <i>Citrus microcarpa</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Clausena lansium</i> , <i>Euodia glabrifolia</i> , <i>Fortunella hindsii</i> , <i>F. japonica</i> , <i>Glycosmis parviflora</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Zanthoxylum avicennae</i> , <i>Z. scandens</i> , <i>Z. nitidum</i> , <i>Z. myriacanthum</i> , <i>Rhus hypoleuca</i>	Commun	Népal , Sikkim Nord de l' Inde à Myanmar , Thaïlande , Laos , Cambodge , Lam Dong Vietnam , Hainan et Sud de la Chine , Langkawi island, Péninsule malaise, Pulau Tioman Malaisie
<i>Papilio (Menelaides) helenus jindanus</i> Rothschild, 1908	<i>jindanus</i>	Rothschild, 1908			Sumba Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) helenus mangarinus</i> Rothschild, 1908	<i>mangarinus</i>	Rothschild, 1908			Flores Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) helenus mooreanus</i> Rothschild, 1895	<i>mooreanus</i>	Rothschild, 1895			Sri Lanka
<i>Papilio (Menelaides) helenus nicconicolens</i> Butler, 1881	<i>nicconicolens</i> = <i>Papilio nicconicolens</i>	Butler, 1881			Nikko Japon , Sud de la Corée
<i>Papilio (Menelaides) helenus palawanicus</i> Staudinger, 1888	<i>palawanicus</i> = <i>Papilio helenus</i> var. <i>palawanicus</i> = <i>Menelaides helenus palawanicus</i>	Staudinger, 1888			Palawan, Balabac Philippines
<i>Papilio (Menelaides) helenus tambora</i> Rothschild, 1908	<i>tambora</i>	Rothschild, 1908			Sumbawa Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) hystaspes</i> C. & R. Felder, 1862	<i>hystaspes</i> = <i>Papilio hytaspes</i> = <i>Papilio varasi</i> = <i>Menelaides helenus hystaspes</i>	C. & R. Felder, 1862			Mindoro, Luzon, Panay, Masbate, Leyte, Negros, Bohol, Mindanao, Cebu, Samar Philippines
<i>Papilio (Menelaides) iswara araspes</i> C. & R. Felder, 1859	<i>iswara araspes</i> = <i>Papilio araspes</i>	C. & R. Felder, 1859		rare	Nord de Borneo Malaisie , Brunei, Natuna Island Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) iswara iswara</i> White, 1842	<i>iswara</i> = <i>Papilio iswara</i> = <i>Menelaides iswara</i> = <i>Princeps iswara iswara</i>	White, 1842		pas rare	Sud du Myanmar , Ranong, Surat Thani Sud de la Thaïlande , Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie , Singapour , Sumatra, Bangka Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) iswaroides curtisi</i> Jordan, 1909	<i>iswaroides curtisi</i> = <i>Papilio curtisi</i> = <i>Princeps iswaroides curtisi</i>	Jordan, 1909		rare	Malaisie
<i>Papilio (Menelaides) iswaroides iswaroides</i> Fruhstorfer, 1898	<i>iswaroides</i> = <i>Papilio helenus iswaroides</i> = <i>Princeps iswaroides</i>	Fruhstorfer, 1898		peu commun	Mt. Battak Sumatra Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) nephelus albolineatus</i> Forbes, 1885	<i>nephelus albolineatus</i> = <i>Papilio albolineatus</i> = <i>Papilio nephelus saturnus</i> ab. f. <i>albolineatus</i>	Forbes, 1885			Sumatra, Kalimantan Borneo Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) nephelus annulus</i> Pendlebury, 1936	<i>annulus</i> = <i>Papilio annulus</i> = <i>Papilio nephelus raya</i> = <i>Princeps nephelus annulus</i>	Pendlebury, 1936			Sud du Myanmar , Ranong, Phiangnga, Phuket satun, yala Sud de la Thaïlande , Langkawi island, Nord de la Péninsule malaise Malaisie
<i>Papilio (Menelaides) nephelus chaon</i> Westwood, 1845	<i>chaon</i> = <i>Papilio chaon</i> = <i>Papilio chaon ducenarius</i> = <i>Papilio chaon duketius</i> = <i>Papilio nephelus dispensator</i> = <i>Papilio nephelus duketius</i> = <i>Papilio chaon chaon</i> f. f. <i>leucacantha</i> = <i>Papilio chaon</i> m. ab. <i>paryphanta</i> = <i>Papilio nephelus</i> ab. <i>xanthia</i> = <i>Papilio nephelus</i> ab. <i>pseudochaonulus</i> = <i>Papilio nephelus</i> ab. <i>tripunctata</i> = <i>Menelaides chaon</i>	Westwood, 1845		Commun	Népal , Assam, Sikkim Inde à Nord de la Birmanie , Mae Hong Son, Chiang Mai, Nan, Kanchanaburi, Chanthaburi, Trata, Phetchaburi Nord et centre de la Thaïlande , Laos , Cambodge , Lam Dong Vietnam , Sud du Yunnan Chine
<i>Papilio (Menelaides) nephelus chaonulus</i> Fruhstorfer, 1902	<i>chaonulus</i> = <i>Papilio chaon</i> f. <i>chaonidis</i> = <i>Papilio nephelus chaonulus</i> m. ab. <i>horina</i> = <i>Papilio nephelus chaonulus</i> m. ab. <i>lucomptus</i>	Fruhstorfer, 1902	Pnc: <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Euodia mellifolia</i> , <i>Fagra rhetsa</i> , <i>Citrus</i> sp.		Sud de la Chine , Five Finger Mts. Hainan, Taiwan
<i>Papilio (Menelaides) nephelus ducenarius</i> Fruhstorfer, 1908	<i>ducenarius</i>	Fruhstorfer, 1908			Tenasserim Sud de la Birmanie , Thaïlande
<i>Papilio (Menelaides) nephelus nephelus</i> Boisduval, [1836]	<i>nephelus</i> = <i>Papilio nephelus</i> = <i>Menelaides nephelus</i>	Boisduval, [1836]		Commun	Java, Sulawesi Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) nephelus rileyi</i> Fruhstorfer, 1913	<i>rileyi</i>	Fruhstorfer, 1913			Hainan, Omishan, Chungking, Sichuan Sud de la Chine
<i>Papilio (Menelaides) nephelus siporanus</i> Hagen, 1898	<i>siporanus</i> = <i>Papilio siporanus</i>	Hagen, 1898			Mentawai Island Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) nephelus sunatus</i> Corbet, 1940	<i>sunatus</i> = <i>Papilio saturnus</i> = <i>Papilio neptunus</i> = <i>Papilio nephelus saturnus</i> = <i>Princeps nephelus sunatus</i>	Corbet, 1940	Pnc: <i>Zanthoxylum rhetsa</i>		Hat Yai, Yala Sud de la Thaïlande , Péninsule malaise Malaisie
<i>Papilio (Menelaides) nephelus tellonus</i> Fruhstorfer, 1906	<i>tellonus</i>	Fruhstorfer, 1906			Batu Island Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) nephelus uranus</i> Weymer, 1885	<i>uranus</i> = <i>Papilio uranus</i>	Weymer, 1885			Nias Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) nubilus musianus</i> Rothschild, 1899	<i>nubilus musianus</i>	Rothschild, 1899			Palembang Su de Sumatra Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) nubilus nubilus</i> Staudinger, 1895	<i>nubilus</i> = <i>Papilio nubilus</i>	Staudinger, 1895		Hybride naturel entre <i>Papilio polytes</i> et <i>Papilio nephelus albolineatus</i> Extrêmement rare	Nord de Borneo Malaisie , Brunei
<i>Papilio (Menelaides) sataspes sataspes</i> C. & R. Felder, 1865	<i>sataspes sataspes</i> = <i>Papilio sataspes</i> = <i>Menelaides sataspes</i> = <i>Papilio iswara sataspes</i> = <i>Papilio helenus sataspes</i> = <i>Papilio hecuba</i>	C. & R. Felder, 1865	Pnc: <i>Euodia</i> , <i>Micromelum</i> , <i>Toddalia</i>	Commun	Sulawesi, Buton island Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) sataspes artaphernes</i> Staudinger, 1895	<i>artaphernes</i> = <i>Papilio helenus</i> var. <i>artaphernes</i> = <i>Papilio artaphernes</i> var. <i>ashaverus</i> = <i>Papilio iswara artaphernes</i>	Staudinger, 1895			Banggai, Peleng Iles Banggai island, Sanana Iles Sula Indonésie
	Groupe des <i>memnon</i>				
<i>Papilio (Menelaides) acheron</i> Grose-Smith, 1887	<i>acheron</i> = <i>Papilio forbesi goetheanus</i> = <i>Princeps acheron</i> = <i>Menelaides acheron</i>	Grose-Smith, 1887		Rare	Kina Balu Moutain, Sarawak, Sabah, Nord de Bornéo Malaisie , Brunei
<i>Papilio (Menelaides) ascalaphus ascalaphus</i> Boisduval, 1836	<i>ascalaphus ascalaphus</i> = <i>Papilio ascalaphus</i> = <i>Papilio ascalaphus</i> ab. <i>nubiger</i> = <i>Menelaides ascalaphus ascalaphus</i>	Boisduval, 1836	Pnc: <i>Citrus</i>	Commun	Sulawesi, Buton island, Selayar, Ternate Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) ascalaphus ascalon</i> Staudinger, 1895	<i>ascalon</i> = <i>Papilio ascalaphus</i> var. <i>ascalon</i> = <i>Menelaides ascalaphus ascalon</i>	Staudinger, 1895			Sanana Iles Sula Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) ascalaphus munascalaphus</i> Hachitani, 1988	<i>munascalaphus</i> = <i>Menelaides ascalaphus munascalaphus</i>	Hachitani, 1988			Muna island Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) ascalaphus fukuyamai</i> Detani, 1983	<i>fukuyamai</i> = <i>Menelaides ascalaphus fukuyamai</i>	Detani, 1983			Peleng Iles Banggai Indonésie

Auteur: Dominiek PRUVOT		août 2018		
<i>Papilio (Menelaides) deiphobus deiphobus</i> Linnaeus, 1758	<i>deiphobus deiphobus</i> = <i>Papilio deiphobus</i> = <i>Papilio alcanor</i> = <i>Papilio deiphobus ab. hypoxanthus</i> = <i>Papilio deiphobus aristartus</i> = <i>Papilio eftbensis</i> = <i>Menelaides deiphobus</i>	Linnaeus, 1758Pnc: <i>Citrus</i>	Pas rare	Serang, Ambon, Buru, Obi Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) deiphobus deipylus</i> C. & R. Felder, 1864	<i>deipylus</i> = <i>Papilio deipylus</i>	C. & R. Felder, 1864		Waigeu Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) deiphobus deiphontes</i> C. & R. Felder, 1864	<i>deiphontes</i> = <i>Papilio deiphontes</i> = <i>Papilio deiphontes ab. flava</i> = <i>Papilio deiphontes ab. flavus</i>	C. & R. Felder, 1864		Sumatra, Morotai, Ternate, Halmahera, Bachan Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) deiphobus tarawakana</i> Page & Treadaway, 1993	<i>tarawakana</i> = <i>Menelaides deiphobus tarawakana</i>	Page & Treadaway, 1993		Bongao, Sanga Sanga, Sibutu, Tawi-tawi Philippines
<i>Papilio (Menelaides) deiphobus rumanzovia</i> Eschscholtz, 1821	<i>rumanzovia</i> = <i>Papilio rumanzovia</i> = <i>Papilio krusensternia</i> = <i>Ilades emalthion</i> = <i>Papilio descombesi</i> = <i>Papilio emalthion rumanzovia</i> = <i>Papilio emalthion var. semperinus</i> = <i>Papilio rumanzovia f. semperinus</i> = <i>Papilio rumanzovia f. rumanzovia</i> = <i>Papilio rumanzovius f.f. rumanzovius</i> = <i>Papilio rumanzovius f.f. loc. semperinus</i> = <i>Papilio rumanzovia f. carnia</i> = <i>Papilio rumanzovia ciris</i> = <i>Papilio rumanzovia honorius</i> = <i>Papilio rumanozovia f. paya</i> = <i>Papilio rumanozovia f. risena</i> = <i>Papilio rumanzovius spinturnix</i> = <i>Menelaides rumanzovius</i> = <i>Papilio rumanzovius</i>	Eschscholtz, 1821Pnc: <i>Atalanta, Citrus</i>	Commun	Philippines sauf centre et sud de Palawan, Balabac et Tawi-tawi, Îles Talaud, Sangihe, Siao Îles Sangihe Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) forbesi</i> Grose-Smith, 1883	<i>forbesi</i> = <i>Princeps forbesi</i> = <i>Menelaides forbesi</i>	Grose-Smith, 1883	assez commun	Nord de Sumatra Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) lampsacus</i> Boisduval, 1836	<i>lampsacus</i> = <i>Menelaides lampsacus</i>	Boisduval, 1836	peut-être éteint	Mt. Gede, Mt. Mas, Pègu Ouest de Java Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) mayo</i> Atkinson, [1874]	<i>mayo</i> = <i>Papilio charicles</i> = <i>Princeps mayo</i> = <i>Menelaides mayo</i> = <i>Papilio deiphobus mayo</i>	Atkinson, [1874]	assez commun. Protégé	Andaman islands Inde
<i>Papilio (Menelaides) memnon agenor</i> Linnaeus, 1758	<i>memnon agenor</i> = <i>Papilio agenor</i> = <i>Papilio phoenix</i> = <i>Papilio androgeos</i> = <i>Papilio alcanor</i> = <i>Papilio esperi</i> = <i>Papilio androgeus</i> = <i>Papilio clix</i> = <i>Papilio androgeos var. depelchini</i> = <i>Papilio memnon agenor m. ab. primigenius</i> = <i>Papilio memnon agenor f. ab. butlerianus</i> = <i>Papilio memnon agenor f. ab. distantianus</i> = <i>Papilio memnon agenor f.f. phoeniciana</i> = <i>Papilio memnon f. aphrodite</i> = <i>Papilio memnon ab. pohl</i> = <i>Papilio memnon f. subvenusia</i> = <i>Papilio memnon aurantiaca</i> = <i>Ilades polymnesteroides</i> = <i>Papilio vinius</i> = <i>Papilio memnon agenor f. ab. vinius</i> = <i>Papilio memnon agenor f. f. rhetorinina</i> = <i>Papilio memnon f. indiv. m. coeruleocinetus</i> = <i>Papilio memnon agenor f. f. tanahsahi</i> = <i>Papilio memnon agenor f. kyla</i> = <i>Papilio memnon agenor ab. depelchini</i> = <i>Papilio memnon agenor f. f. agenor</i> = <i>Papilio memnon agenor ab. f. phoenix</i> = <i>Papilio memnon agenor ab. f. loc. esperi</i> = <i>Papilio memnon agenor ab. f. clix</i> = <i>Papilio memnon agenor f. f. alcanor</i> = <i>Papilio memnon agenor f. agenor</i> = <i>Princeps memnon agenor f. agenor</i> = <i>Papilio memnon agenor f. esperi</i> = <i>Princeps memnon agenor f. esperi</i> = <i>Papilio memnon agenor f. butlerianus</i> = <i>Princeps memnon agenor f. butlerianus</i> = <i>Papilio memnon agenor f. distantianus</i> = <i>Princeps memnon agenor f. distantianus</i> = <i>Papilio memnon f. yunnanensis</i> = <i>Princeps memnon agenor</i>	Linnaeus, 1758Pnc: <i>Aristolochia, Magnolia, Michelia, Atalanta, Citrus, Fortunella, Paramignya, Poncirus, Severinia, Toddalia, Zanthoxylum</i>		Népal, Sikkim, Assam Inde à Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie , Hainan, Sud du Yunnan Chine, Tioman, Singapour
<i>Papilio memnon anceus</i> Cramer, [1779]	<i>anceus</i> = <i>Papilio anceus</i> = <i>Papilio memnon anceus f. f. erebihus</i> = <i>Papilio memnon anceus f. f. trochila</i> = <i>Papilio memnon anceus f. f. anceus</i> = <i>Papilio memnon anceus f. f. gerania</i> = <i>Papilio memnon anceus f. f. butis</i> = <i>Papilio memnon ab.f. anceus</i> = <i>Papilio memnon anceus f. falsus</i> = <i>Papilio memnon anceus ab. sericatus</i>	Cramer, [1779]		Palembang Sumatra, Nias, Batu Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon angustus</i> Chou, Yuan & Wang, 2000	<i>angustus</i> = <i>Papilio angustus</i> = <i>Menelaides memnon angustus</i>	Chou, Yuan & Wang, 2000		Fujian Chine
<i>Papilio (Menelaides) memnon clathratus</i> Rothschild, 1896	<i>clathratus</i> = <i>Papilio memnon clathratus f. duplex</i>	Rothschild, 1896		Sumbawa Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon caeruleus</i> van Eecke, 1914	<i>caeruleus</i> van Eecke, 1914			Simeulue Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon heronus</i> Fruhstorfer, 1902	<i>heronus</i> Fruhstorfer, 1902	Pnc: <i>Zanthoxylum nitidum, Z. allanthoides, Poncinus trifoliata, Citrus</i>		Taiwan
<i>Papilio (Menelaides) memnon imperiosus</i> Fruhstorfer, 1907	<i>imperiosus</i> Fruhstorfer, 1907			Banka Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon kalaomemnon</i> Hachitani, 1987	<i>kalaomemnon</i> = <i>Menelaides memnon kalaomemnon</i>	Hachitani, 1987		Kalao Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon lowii</i> Druce, 1873	<i>lowii</i> = <i>Papilio lowii</i> = <i>Menelaides lowii</i> = <i>Papilio lowi</i> = <i>Menelaides memnon lowii</i> = <i>Papilio lowii ab. suffusus</i>	Druce, 1873Pnc: <i>Citrus</i>	Commun	Nord de Borneo Malaisie, Balabac, Palawan Philippines
<i>Papilio (Menelaides) memnon memnoides</i> Fruhstorfer, 1903	<i>memnoides</i> Fruhstorfer, 1903			Borneo Malaisie et Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon memnon</i> Linnaeus, 1758	<i>memnon</i> = <i>Papilio memnon</i> = <i>Papilio achates</i> = <i>Papilio atrovенatus</i> = <i>Papilio laomedon</i> = <i>Papilio achiatiades</i> = <i>Papilio arbates</i> = <i>Papilio deiphobus memnon</i> = <i>Papilio memnon ab. sitolensis</i> = <i>Papilio memnon f. taihokuana</i> = <i>Papilio memnon var. javanus</i> = <i>Papilio memnon var. erebinus</i> = <i>Papilio memnon memnon f.f. amura</i> = <i>Papilio memnon f. f. laomedon</i> = <i>Papilio mamnon ab. f. erebinus</i> = <i>Papilio memnon ab. f. javanus</i> = <i>Papilio memnon f. f. achates</i> = <i>Papilionmemnon menon f. f. hiera</i> = <i>Menelaides memnon memnon</i>	Linnaeus, 1758Pnc: <i>Citrus maxima, C. microcarpa, C. paradisi, C. reticulata, C. sinensis, Clausena lansium, Fortunella hindsii, F. japonica</i>	Commun	Java, Bawean, Natuna Island, Bali Indonésie , Mapun, Bongao, Sanga Sanga Philippines
<i>Papilio (Menelaides) memnon merapu</i> Doherty, 1891	<i>merapu</i> = <i>Papilio merapu</i> = <i>Ilades merapu</i>	Doherty, 1891		Sumba Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018		
<i>Papilio (Menelaides) memnon oceani</i> Doherty, 1891	<i>oceani</i>	Doherty, 1891		Enggano Indonésie
	= <i>Papilio oceani</i>			
	= <i>Ilades oceani</i>			
	= <i>Papilio memnon oceani</i> ab. afer			
	<i>perlucidus</i> Fruhstorfer, 1903			Sapit Lombok Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon perlucidus</i> Fruhstorfer, 1903				
<i>Papilio (Menelaides) memnon pryeri</i> Rothschild, 1895	<i>pryeri</i> Rothschild, 1895			Loo Choo Island Japon
<i>Papilio (Menelaides) memnon subclathratus</i> Fruhstorfer, 1903	<i>subclathratus</i> Fruhstorfer, 1903			Flores Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) memnon tanahsahi</i> Eliot, 1982	<i>tanahsahi</i>	Eliot, 1982		Perak Péninsule malaise Malaisie
<i>Papilio (Menelaides) memnon thunbergii</i> von Siebold, 1824	= <i>Papilio memnon agenor f. f. tanahsahi</i>			
	<i>thunbergii</i>	von Siebold, 1824		Nagasaki, Kiushu, Shikoku Japon
	= <i>Papilio thunbergii</i>			
	= <i>Papilio memnon thunbergi f. temp. gen. vern. mela</i>			
	= <i>Papilio memnon thunbergi</i> ab. takamukui			
<i>Papilio (Menelaides) oenomaus oenomaus</i> Godart, 1879	= <i>Papilio memnon thunbergi</i> ab. shikokuana			
	<i>oenomaus</i> <i>oenomaus</i>	Godart, 1879	Commun	Timor, Leti, Moa, Kissar, Romang Island Indonésie
	= <i>Papilio oenomaus</i>			
	= <i>Menelaides oenomaus</i>			
	= <i>Papilio deiphobus oenomaus</i>			
<i>Papilio (Menelaides) oenomaus subfasciatus</i> Rothschild, 1895	<i>subfasciatus</i> Rothschild, 1895			Wetar Indonésie
<i>Papilio (Menelaides) polymnestor parinda</i> (Moore, [1881])	<i>polymnestor</i> <i>parinda</i>	(Moore, [1881])		Sri Lanka
	= <i>Ilades parinda</i>			
	<i>polymnestor</i>	Cramer, [1775]	Commun	Sud et Côte est de l'Inde, Bengale, Côte est du Myanmar?
	= <i>Papilio polymnestor</i>			
	= <i>Papilio erythrotaeniata</i>			
<i>Papilio (Menelaides) polymnestor polymnestor</i> Cramer, [1775]	= <i>Menelaides polymnestor</i>			
	Groupe des <i>protenor</i>			Inde et Chine
<i>Papilio (Menelaides) alcmenor alcmenor</i> C. & R. Felder, 1865	<i>alcmenor</i> <i>alcmenor</i>	C. & R. Felder, 1865	Commun.	Népal, Kumaon, Assam, Sikkim Inde, Bhoutan, Myanmar, Nord de la Thaïlande, Laos, Vietnam
	= <i>Papilio alcmenor</i>			
	= <i>Menelaides alcmenor</i>			
	= <i>Papilio rhetenor</i>			
	= <i>Papilio rhetenor turificator</i>			
<i>Papilio (Menelaides) alcmenor erythrotaeniata</i> Wang & Niu, 2002	= <i>Papilio rhetenor pubillius</i>			
	= <i>Papilio rhetenor turificator f. albolunata</i>			
	= <i>Papilio rhetenor f. leucocelis</i>			
	= <i>Papilio icarius</i>			
	<i>erythrotaeniata</i>	Wang & Niu, 2002		Baoxing, Sichuan Chine
<i>Papilio (Menelaides) alcmenor irene</i> Joicey & Talbot, 1921	= <i>Papilio erythrotaeniata</i>			
	= <i>Menelaides alcmenor erythrotaeniata</i>			
	<i>irene</i>	Joicey & Talbot, 1921		Hainan Chine
	= <i>Papilio rhetenor irene</i>			
	<i>nausithous</i> Oberthür, 1918			Sichuan Chine
<i>Papilio (Menelaides) alcmenor nausithous</i> Oberthür, 1918				
<i>Papilio (Menelaides) alcmenor platenius</i> Fruhstorfer, 1908	<i>platenius</i>	Fruhstorfer, 1908		Ichang, Sichuan Chine
<i>Papilio (Menelaides) macilentus</i> Janson, 1877	= <i>Papilio rhetenor platenius</i>			
	<i>macilentus</i>	Janson, 1877	Pnc: <i>Citrus</i> , <i>Ruta graveolens</i> , <i>Zanthoxylum allanoides</i> , <i>Fagara mantschurica</i> , <i>F. allanoides</i> , <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Orixa japonica</i> , <i>Lobelia chinensis</i>	Commun
	= <i>Papilio scaevola</i>			
	= <i>Papilio tractipennis</i>			
	= <i>Princeps macilentus</i>			
<i>Papilio (Menelaides) protenor amaura</i> Jordan, 1909	= <i>Menelaides macilentus</i>			
	= <i>Papilio macilentus morpha vernalis minima</i>			
	<i>protenor</i> <i>amaura</i>	Jordan, 1909	Pnc: <i>Zanthoxylum nitidum</i> , <i>Z. piperitum</i> , <i>Citrus</i> sp.	Taiwan
	= <i>Papilio protenor amaurus</i>			
	= <i>Papilio protenor amaura m. ab. kagaribi</i>			
<i>Papilio (Menelaides) protenor demetrius</i> Stoll, [1782]	= <i>Papilio protenor amaura m. ab. tokionis</i>			
	<i>demetrius</i>	Stoll, [1782]		Honshu, Sikoku, Kyushu, Amami isles Japon, Ouest de la Chine, Corée
	= <i>Papilio demetrius</i>			
	= <i>Papilio carpenteri</i>			
	= <i>Papilio demetrius lenocius</i>			
<i>Papilio (Menelaides) protenor euprotenor</i> Fruhstorfer, 1908	= <i>Papilio demetrius demetrius f. nymphis</i>			
	= <i>Papilio demetrius morpha vernalis okabei</i>			
	<i>euprotenor</i>	Fruhstorfer, 1908		Assam, Sikkim Nord de l'Inde, Nord du Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, Hainan et Sud de la Chine
	= <i>Papilio protenor euanthes</i>			
	= <i>Papilio protenor sulpitius</i>			
<i>Papilio (Menelaides) protenor liukuensis</i> Fruhstorfer, [1899]	= <i>Papilio sulpitius</i>			
	<i>liukuensis</i>	Fruhstorfer, [1899]		Okinawa isles, Miyako isles, Iriomotejima island, Ishigakijima island, Yonagunijima island Japon
	= <i>Papilio demetrius sitalkes</i>			
	<i>protenor</i>	Cramer, [1775]	Commun	Cachemire, Sikkim, Assam Nord-ouest de l'Inde, Birmanie, Chine, Sud de la Corée, Japon, Riu-Kiu islands Japon
	= <i>Papilio protenor</i>			
<i>Papilio (Menelaides) thaiwanus</i> Rothschild, 1898	= <i>Menelaides protenor</i>			
	<i>thaiwanus</i>	Rothschild, 1898	Pnc: <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Zanthoxylum nitidum</i> , <i>Z. piperitum</i> , <i>Citrus</i> sp.	Commun
	= <i>Papilio protenor thaiwanus</i>			
	= <i>Papilio rhetenor annaeus</i>			
	= <i>Papilio thaiwanus</i> ab. watanabei			
	= <i>Menelaides thaiwanus</i>			
	<i>bootes</i>			
	<i>bootes</i> <i>bootes</i>	Westwood, 1842		Garhwal, Assam Inde, Bangladesh
	= <i>Papilio bootes</i>			
	= <i>Menelaides bootes</i>			
<i>Papilio (Menelaides) bootes dealbatus</i> Rothschild, 1895	<i>dealbatus</i>	Rothschild, 1895		Ichang, Ouest de la Chine
	= <i>Papilio janaka dealbatus</i>			
	<i>janaka</i>	Moore, 1857		Himalaya, Sikkim Hills Inde, Nord du Myanmar
	= <i>Papilio janaka</i>			
	= <i>Princeps janaka</i>			
<i>Papilio (Menelaides) bootes mindoni</i> Tytler, 1939	= <i>Papilio sikkimensis</i>			
	<i>mindoni</i> Tytler, 1939			Chudu Razi Hills Nord-est du Myanmar
<i>Papilio (Menelaides) bootes nigricans</i> Rothschild, 1895	<i>nigricans</i>	Rothschild, 1895		Tsekou, Ouest de la Chine
	= <i>Papilio echo</i>			
	= <i>Papilio bootes rubicundus</i>			
	= <i>Papilio mixta</i>			
	= <i>Menelaides bootes nigricans</i>			
<i>Papilio (Menelaides) bootes parcesquamata</i> Rosen, 1929	<i>parcesquamata</i>	Rosen, 1929		Yunnan, ...? Chine
	<i>xamunuensis</i>	Tateishi, 2001		Xan Neua, Xaysomboun Laos, Lao Cai, Ha Giang Vietnam
	Sous-genre : <i>Achillides</i> = <i>Harimala</i> = <i>Sarbaria</i> = <i>Pangeranopsis</i>	Hübner, [1819]		
	Groupe des <i>paris</i>			
<i>Papilio (Achillides) arcturus arcturulus</i> Fruhstorfer, 1901	<i>arcturus</i> <i>arcturulus</i>	Fruhstorfer, 1901		Sichuan Chine
	<i>Papilio (Achillides) arcturus arcturus</i> Westwood, 1842			
	<i>arcturus</i>	Westwood, 1842	Commun	Népal, Bhoutan, Naga Hills Inde à sud du Myanmar, Chiang Mai, Nan Nord de la Thaïlande, Xaignabouri Laos, Ha Giang Vietnam, sud-ouest de la Chine
	= <i>Papilio arcturus</i>			
	= <i>Princeps arcturus</i>			
<i>Papilio (Achillides) arcturus arius</i> Rothschild, 1908	= <i>Achillides arcturus</i>			
	= <i>Papilio arcturus</i> ab. <i>privatus</i>			
	= <i>Papilio arcturus dawna</i>			
	= <i>Achillides arcturus arcturus</i>			
	<i>arius</i>	Rothschild, 1908		Cachemire Nord-ouest de l'Inde, Pakistan
<i>Papilio (Achillides) bianor bianor</i> Cramer, [1777]	= <i>Achillides arcturus arius</i>			
	<i>bianor</i> <i>bianor</i>	Cramer, [1777]	Pnc: <i>Phellodendron sachalinense</i>	VI-VIII Commun
	= <i>Papilio bianor</i>			
	= <i>Princeps bianor</i>			
	= <i>Achillides bianor</i>			
<i>Papilio (Achillides) bianor ganesa</i> Doubleday, 1842	= <i>Papilio elegans</i>			
	= <i>Papilio pulcher</i>			
	= <i>Papilio longimacula</i>			
	= <i>Papilio bianor simoni</i>			
	= <i>Papilio bianor f. majalis</i>			
<i>Papilio (Achillides) bianor kotoensis</i> Sonan, 1927	= <i>Papilio bianor v. superans</i>			
	<i>ganesa</i>	Doubleday, 1842		Népal à Nord-est de l'Inde
	= <i>Papilio ganesa</i>			
	= <i>Papilio polycctor ganesa</i>			
	<i>kotoensis</i>	Sonan, 1927	Pnc: <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Zanthoxylum allanoides</i> , <i>Euodia melifolia</i> , <i>Orixa japonica</i> , <i>Phellodendron amurense</i> , <i>Poncirus trifoliata</i>	Koto-Sho, Botel, Tobago island Taiwan
<i>Papilio (Achillides) bianor mandschurica</i> Matsumura, 1927	= <i>Achillides bianor kotoensis</i>			
	<i>mandschurica</i>	Matsumura, 1927		Sud de l'Ussuri Russie
	= <i>Papilio maackii mandschurica</i>			

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018	
<i>Papilio (Achillides) bianor gladiator</i> Fruhstorfer, 1902	<i>gladiator</i> = <i>Papilio bianor</i> var. <i>gladiator</i> = <i>Papilio polycitor</i> var. <i>triumphator</i> = <i>Papilio polycitor</i> ganesa ab. <i>porphyria</i> = <i>Papilio polycitor</i> titus = <i>Papilio triumphator</i> ab. <i>mai</i> = <i>Papilio polycitor connectens</i> = <i>Papilio polycitor kingtungensis</i> = <i>Papilio polycitor triumphator</i> = <i>Papilio polycitor xiei</i>	Fruhstorfer, 1902	Sikkim, Sud de l'Assam Inde, Nord du Myanmar, Nan Nord-ouest de la Thaïlande, Xiang Khouane, Xaignabouri, Lak sao Thabok Laos, Phnom Penh Cambodge, Nord et centre du Vietnam, Mengla Yunnan Sud de la Chine
	<i>okinawensis</i> = <i>Papilio okiwanensis</i> = <i>Papilio bianor</i> junia	Fruhstorfer, 1898	Ishigakijima Island, Iriomotejima Island, Yonagunijima Island Yaeyama isles, Okinawa isles Japon
<i>Papilio (Achillides) bianor pavonis</i> Chou, Zang & Xie, 2000	<i>pavonis</i> = <i>Papilio pavonis</i>	Chou, Zang & Xie, 2000	Yunnan Chine
<i>Papilio (Achillides) bianor pinratanaï</i> Racheli & Cotton, 1983	<i>pinratanaï</i> = <i>Papilio polycitor pinratanaï</i>	Racheli & Cotton, 1983	Chantaburi Sud-est de la Thaïlande
<i>Papilio (Achillides) bianor stockleyi</i> Gabriel, 1936	<i>stockleyi</i> = <i>Papilio polycitor stockleyi</i> = <i>Achillides polycitor stockleyi</i>	Gabriel, 1936	Sud-ouest du Myanmar, Umphang, Tak Nord-ouest de la Thaïlande
<i>Papilio (Achillides) bianor thrasymedes</i> Fruhstorfer, 1909	<i>thrasymedes</i> = <i>Papilio polycitor thrasymedes</i> = <i>Papilio bianor formosanus</i> = <i>Papilio bianor takasago</i> = <i>Papilio bianor chengkon</i>	Fruhstorfer, 1909	Pnc: <i>Euodia meliifolia</i> , <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> , <i>Z. nitidum</i> , <i>Citrus</i> , <i>Rhus succedanea</i>
<i>Papilio (Achillides) bianor polycitor</i> Boisduval, [1836]	<i>polycitor</i> = <i>Papilio polycitor</i> = <i>Priniceps polycitor</i> = <i>Achillides polycitor</i> = <i>Sarbaria peeroza</i> = <i>Priniceps polycitor</i> = <i>Papilio polycitor</i> ab. <i>alarich</i> = <i>Papilio polycitor</i> ab.gen.vern. <i>peeroza</i> = <i>Papilio polycitor</i> ab.gen.aest. <i>polycitor</i> = <i>Achillides polycitor polycitor</i>	Boisduval, [1836]	Pnc: <i>Xanthoxylum alatum</i> , <i>Limonia acidissima</i> Commun
<i>Papilio (Achillides) bianor significans</i> Fruhstorfer, 1902	<i>significans</i> = <i>Papilio polycitor significans</i> = <i>Papilio polycitor significans</i>	Fruhstorfer, 1902	Tandong, Tenasserim, Sud et Centre du Myanmar
<i>Papilio (Achillides) dehaanii dehaanii</i> C. & R. Felder, 1864	<i>dehaanii dehaanii</i> = <i>Papilio dehaanii</i> = <i>Papilio lorquini</i> = <i>Papilio bianor</i> var. <i>japonica</i> = <i>Papilio allacmon</i> = <i>Papilio bianor dehaanii</i> ab.gen.vern. <i>japonicus</i> = <i>Papilio bianor dehaanii</i> ab.gen.aest. <i>dehaanii</i> = <i>Achillides bianor dehaanii</i> = <i>Papilio bianor nagasaki</i> = <i>Papilio bianor paradoxa</i> = <i>Papilio bianor sachalinensis</i> = <i>Papilio bianor nakacharae</i> = <i>Papilio bianor koreanus</i> = <i>Papilio dehaanii dehaanii</i> f. <i>doiï</i>	C. & R. Felder, 1864	Pnc: <i>Phellodendron sachalinense</i> VI-VIII Hokkaido, Honshu, Sikoku, Kyushu Japon, Corée, Sakhalin Island, Kuriles islands Russie
<i>Papilio (Achillides) dehaanii tokaraensis</i> Fujioka, 1975	<i>tokaraensis</i> = <i>Papilio bianor tokaraensis</i>	Fujioka, 1975	Nakanoshima Tokara Islands Japon
<i>Papilio (Achillides) dehaanii hachijonis</i> Matsumura, 1919	<i>hachijonis</i> = <i>Papilio bianor hachijonis</i> = <i>Papilio dehaanii utae</i>	Matsumura, 1919	Hachijo Island, Izu islands, Miyake Jima Japon
<i>Papilio (Achillides) ryukyuensis ryukyuensis</i> Fujioka, 1975	<i>ryukyuensis ryukyuensis</i> = <i>Papilio bianor ryukyuensis</i> = <i>Papilio dehaanii ryukyuensis</i>	Fujioka, 1975	Okinawa islands Japon
<i>Papilio (Achillides) ryukyuensis amamiensis</i> Fujioka, 1981	<i>amamiensis</i> = <i>Papilio bianor amamiensis</i> = <i>Papilio dehaanii amamiensis</i>	Fujioka, 1981	Amami island Japon
<i>Papilio (Achillides) dialis andronicus</i> Fruhstorfer, 1909	<i>dialis andronicus</i> = <i>Achillides dialis andronicus</i>	Fruhstorfer, 1909	Pnc: <i>Euodia meliifolia</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Rhus verniciflua</i> Taïwan
<i>Papilio (Achillides) dialis cataleucus</i> Rothschild, 1908	<i>cataleucus</i> = <i>Papilio dialis cateleucus</i>	Rothschild, 1908	Hainan Chine
<i>Papilio (Achillides) dialis dialis</i> Leech, 1893	<i>dialis</i> = <i>Papilio dialis</i> = <i>Papilio bianor syfianus</i> ab.m. <i>dialis</i> = <i>Achillides dialis</i>	Leech, 1893	peu commun Chia-ting-fu Chine
<i>Papilio (Achillides) doddsi</i> Janet, 1896	<i>doddsi</i> = <i>Papilio megei</i> = <i>Papilio dialis doddsi</i> = <i>Achillides doddsi</i> = <i>Papilio dialis schanus</i>	Janet, 1896	Sud de Shan States Myanmar, Thabok, Lak Sao Laos, Vinh Phu, Lam Dong Nord du Vietnam
<i>Papilio (Achillides) elephenor</i> Doubleday, 1845	<i>elephenor</i> = <i>Papilio elphenor</i> = <i>Achillides elephenor</i> = <i>Priniceps elephenor</i>	Doubleday, 1845	Rare Assam Inde, Sud de Shan States Myanmar, Nord de la Thaïlande
<i>Papilio (Achillides) hoppo</i> Matsumura, 1907	<i>hoppo</i> = <i>Priniceps hoppo</i> = <i>Achillides hoppo</i> = <i>Papilio hopponis</i>	Matsumura, 1907	Pnc: <i>Citrus</i> Commun, femelle plus rare Taïwan
<i>Papilio (Achillides) karna carnatus</i> Rothschild, 1895	<i>karna carnatus</i> = <i>Papilio arjuna carnatus</i> = <i>Achillides karna carnatus</i>	Rothschild, 1895	Borneo Malaisie et Indonésie
<i>Papilio (Achillides) karna discordia</i> de Nicéville, [1893]	<i>discordia</i> = <i>Papilio discordia</i>	de Nicéville, [1893]	Nord-est de Sumatra Indonésie
<i>Papilio (Achillides) karna irauana</i> Jumalon, 1975	<i>irauana</i> = <i>Achillides karna irauana</i>	Jumalon, 1975	Palawan Philippines
<i>Papilio (Achillides) karna karna</i> C. & R. Felder, 1864	<i>karna</i> = <i>Papilio karna</i> = <i>Papilio arjuna karna</i> = <i>Priniceps karna</i> = <i>Achillides karna</i>	C. & R. Felder, 1864	Pnc: <i>Euodia</i> , <i>Citrus</i> Mt. Gedé Ouest de Java Indonésie
<i>Papilio (Achillides) krishna charlesi</i> Fruhstorfer, 1902	<i>krishna charlesi</i> = <i>Papilio krishna mayumiæ</i>	Fruhstorfer, 1902	Hoang Lien Nord du Vietnam, Sud du Yunnan, Siao-Lou Sichuan, Ouest de la Chine
<i>Papilio (Achillides) krishna krishna</i> Moore, 1857	<i>krishna</i> = <i>Priniceps krishna</i> = <i>Achillides krishna</i> = <i>Priniceps krishna</i> = <i>Papilio krishna manipuri?</i> = <i>Achillides krishna krishna</i>	Moore, 1857	peu commun. Protégé en Inde Népal?, Bhoutan, Sikkim, Assam Inde, Manipur
<i>Papilio (Achillides) krishna orientis</i> Schäffler, 2004	<i>orientis</i> = <i>Achillides krishna orientis</i>	Schäffler, 2004	Ouest de Leshan Ouest du Sichuan Chine
<i>Papilio (Achillides) krishna thawgawa</i> Tytler, 1939	<i>thawgawa</i> = <i>Papilio krishna nu</i> = <i>Achillides krishna thawgawa</i>	Tytler, 1939	Nord de la Birmanie, Yunnan Chine
<i>Papilio (Achillides) maackii han</i> Yoshino, 1997	<i>maackii han</i> = <i>Achillides maackii han</i>	Yoshino, 1997	Mt. Wuyishan Fujiang prov., Zhejiang, Sichuan Chine
<i>Papilio (Achillides) maackii kitawakii</i> Shimogori & Fujioka, 1997	<i>kitawakii</i> = <i>Achillides maackii kitawakii</i>	Shimogori & Fujioka, 1997	Nord de Zayu, Est du Tibet
<i>Papilio (Achillides) maackii maackii</i> Ménétries, 1859	<i>maackii</i> = <i>Priniceps maackii</i> = <i>Achillides maacki</i> = <i>Papilio maacki</i> = <i>Papilio raddei</i> = <i>Papilio bianor maacki</i> = <i>Papilio bianor maacki</i> ab.gen.vern. <i>raddei</i> = <i>Papilio bianor maacki</i> ab.gen.aest. <i>maacki</i> = <i>Achillides maacki maacki</i>	Ménétries, 1859	Pnc: <i>Phellodendron amurenensis</i> , <i>P. amurense</i> , <i>Citrus</i> , <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> , <i>Euodia meliifolia</i> IV-IX Commun. Deux formes: forme de printemps plus petite et plus colorée avec des bandes vertes proéminentes, forme d'été plus large et sombre
<i>Papilio (Achillides) maackii shimogorii</i> Fujioka, 1997	<i>shimogorii</i> = <i>Achillides maackii shimogorii</i>	Fujioka, 1997	Mt. Omeishan Sichuan Chine
<i>Papilio (Achillides) maackii tutanus</i> Fenton, [1882]	<i>tutanus</i> = <i>Papilio dehaanii</i> var. <i>tutanus</i> = <i>Papilio maackii kurlensis</i>	Fenton, [1882]	Sakhalin, Khurile Islands Russie, Japon
<i>Papilio (Achillides) paris arjuna</i> Horsfield, 1828	<i>paris arjuna</i> = <i>Papilio arjuna</i>	Horsfield, 1828	Centre de Java Indonésie
<i>Papilio (Achillides) paris battacorum</i> Rothschild, 1908	<i>battacorum</i> = <i>Papilio arjuna battacorum</i>	Rothschild, 1908	Nord-est de Sumatra
<i>Papilio (Achillides) paris chinensis</i> Rothschild, 1895	<i>chinensis</i> = <i>Papilio paris chinensis</i> f. <i>gemmifera</i>	Rothschild, 1895	Sichuan Chine
<i>Papilio (Achillides) paris detanii</i> Shimogori, 1992	<i>detanii</i> = <i>Achillides paris detanii</i>	Shimogori, 1992	Mt. Idjen Est de Java Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018	
<i>Papilio (Achillides) paris gedeensis</i> Fruhstorfer, 1893	gedeensis = <i>Papilio arjuna</i> var. <i>gedeensis</i> = <i>Papilio arjuna</i> karna ab. <i>gedeensis</i> = <i>Papilio prillwitzii</i>	Fruhstorfer, 1893	Mt. Gedé Ouest de Java Indonésie
<i>Papilio (Achillides) paris hermosanus</i> Rebel, 1906	hermosanus = <i>Papilio polyctor hermosanus</i> = <i>Papilio paris hermosanus</i> ab. <i>divinitus</i> = <i>Papilio paris hermosanus</i> ab. <i>subdivinitus</i>	Rebel, 1906 Pnc: <i>Euodia leptota</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Centre et Sud de Taiwan
<i>Papilio (Achillides) paris nakaharai</i> Shirôzu, 1960	nakaharai Shirôzu, 1960		Nord de Taiwan , Japon
<i>Papilio (Achillides) paris neoparis</i> Fruhstorfer, 1908	neoparis Fruhstorfer, 1908		Kagi Taiwan
<i>Papilio (Achillides) paris paris</i> Linnaeus, 1758	paris = <i>Papilio paris</i> = <i>Princeps paris</i> = <i>Achillides paris</i> = <i>Papilio paris paris</i> f. <i>decorosa</i> = <i>Papilio paris splendorifer</i> = <i>Papilio paris majestatis</i> = <i>Papilio angelicae</i> = <i>Papilio reductomaculata</i> = <i>Papilio sumbingensis</i>	Linnaeus, 1758 Pnc: <i>Euodia leptota</i> , <i>Toddalia asiatica</i> , <i>Citrus</i>	Variable Népal , Sikkim Nord-ouest de l' Inde , Tenasserim Sud du Myanmar , Nord de la Thaïlande , Laos, Vietnam, Sud-ouest de la Chine , Hong kong
<i>Papilio (Achillides) paris tamilana</i> Moore, 1881	tamilana = <i>Papilio tamilana</i> = <i>Achillides paris tamilana</i>	Moore, 1881	Protégé Malabar Hills Sud de l' Inde
<i>Papilio (Achillides) paris tenggerensis</i> Fruhstorfer, 1893	tenggerensis = <i>Papilio arjuna</i> var. <i>tenggerensis</i> = <i>Achillides paris teggerensis</i>	Fruhstorfer, 1893	Tengger-Gebirge Est de Java Indonésie
<i>Papilio (Achillides) paris tissaphernes</i> Fruhstorfer, 1907	tissaphernes Fruhstorfer, 1907		Hainan Chine
<i>Papilio (Achillides) paris wittmanni</i> Schäffler, 2004	wittmanni Schäffler, 2004		Renshou, Est du Sichuan Chine
Groupe des palinurus			
<i>Papilio (Achillides) palinurus adventus</i> Fruhstorfer, 1903	palinurus <i>adventus</i> Fruhstorfer, 1903		Nias Indonésie
<i>Papilio (Achillides) palinurus aufryae</i> Abang & Page, 2006	aufryae Abang & Page, 2006		Banggi Malaisie
<i>Papilio (Achillides) palinurus auffenbergi</i> Späth, 1992	auffenbergi = <i>Achillides palinurus auffenbergi</i>	Späth, 1992	Simeulue Indonésie
<i>Papilio (Achillides) palinurus palinurus</i> Fabricius, 1787	palinurus = <i>Papilio palinurus</i> = <i>Princeps palinurus</i> = <i>Achillides palinurus</i> = <i>Papilio palinurus tubero</i> var. <i>solinus</i> = <i>Papilio brama</i> = <i>Papilio regulus</i> = <i>Papilio palinurus nikagoras</i> = <i>Papilio palinurus tubero</i> = <i>Princeps palinurus palinurus</i> = <i>Achillides palinurus palinurus</i>	Fabricius, 1787 Pnc: <i>Evodia</i>	Commun Sud du Myanmar , Nakhon Sri Thammarat, Satun, Yala Sud de la Thaïlande , Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie , Padang, Ouest de Sumatra , Borneo
<i>Papilio (Achillides) palinurus vega</i> Shimogori, 1993	vega Shimogori, 1993		Tanahmasa Island Batu Islands Indonésie
<i>Papilio (Achillides) daedalus daedalus</i> C. & R. Felder, 1861	daedalus <i>daedalus</i> = <i>Papilio daedalus</i> = <i>Achillides daedalus</i> = <i>Papilio palinurus daedalus</i> = <i>Achillides palinurus daedalus</i>	C. & R. Felder, 1861 Pnc: <i>Evodia</i>	Commun Nord, centre et Sud des Philippines
<i>Papilio (Achillides) daedalus angustatus</i> Staudinger, 1888	angustatus = <i>Papilio daedalus</i> var. <i>angustatus</i> = <i>Achillides daedalus angustatus</i> = <i>Papilio palinurus angustatus</i> = <i>Achillides palinurus angustatus</i>	Staudinger, 1888	Palawan, Balabac, Calamian, Cuyo, Busuanga, Dumaran Philippines
<i>Papilio (Achillides) daedalus selma</i> Koçak, 1996	selma Koçak, 1996		Philippines
<i>Papilio (Achillides) daedalus nymphodorus</i> Fruhstorfer, 1909	nymphodorus = <i>Papilio palinurus</i> var. <i>nymphodorus</i>	Fruhstorfer, 1909	Basilan, Archipel Sulu Philippines
<i>Papilio (Achillides) blumei blumei</i> Boisduval, 1836	blumei <i>blumei</i> = <i>Papilio blumei</i> = <i>Princeps blumei</i> = <i>Achillides blumei</i> = <i>Achillides blumei blumei</i>	Boisduval, 1836 Pnc: <i>Evodia</i> , <i>Toddalia</i>	Commun Nord, centre et Sud-est du Sulawesi Indonésie
<i>Papilio (Achillides) blumei fruhstorferi</i> Röber, 1897	fruhstorferi = <i>Papilio fruhstorferi</i> = <i>Achillides blumei furhstorferi</i>	Röber, 1897	Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Papilio (Achillides) buddha</i> Westwood, 1872	buddha = <i>Princeps buddha</i> = <i>Achillides buddha</i>	Westwood, 1872 Pnc: <i>Xanthoxylum rheisa</i>	pas rare. Protégé Nord de l' Inde
<i>Papilio (Achillides) crino</i> Fabricius, 1792	crino = <i>Papilio crino</i> var. <i>montanus</i> = <i>Papilio crino</i> ab. m. <i>montanus</i> = <i>Princeps crino</i> = <i>Achillides crino</i> = <i>Harimala montanus</i>	Fabricius, 1792 Pnc: <i>Chloroxylum swietenia</i>	Commun Sud de l'Inde à Bengale Inde , Sri Lanka
Groupe des peranthus			
<i>Papilio (Achillides) chikae chikae</i> Igarashi, 1965	chikae <i>chikae</i> = <i>Papilio chikae</i> = <i>Princeps chikae</i> = <i>Achillides chikae</i> = <i>Achillides chikae chikae</i>	Igarashi, 1965	Protégé, Cites annexe I Mont Saint-Thomas Nord de Luzon Philippines
<i>Papilio (Achillides) chikae hermeli</i> (Nuyda, 1992)	hermeli = <i>Achillides chikae hermeli</i> = <i>Papilio hermeli</i> = <i>Achillides hermeli</i>	(Nuyda, 1992)	Mt. Halcon Nord de Mindoro Philippines
<i>Papilio (Achillides) lorquinianus albertisi</i> Oberthür, 1880	lorquinianus <i>albertisi</i> = <i>Papilio d'albertisi</i>	Oberthür, 1880	localisé et peu commun Kapaur, Andai, Ouest de l'Irian Indonésie
<i>Papilio (Achillides) lorquinianus boanoensis</i> Kariya, 1992	boanoensis = <i>Papilio lorquinianus mizukoshii</i>	Kariya, 1992	Boano island, Moluques Indonésie
<i>Papilio (Achillides) lorquinianus esmeae</i> Parrot, 1985	esmeae Parrot, 1985		Morotoi Indonésie
<i>Papilio (Achillides) lorquinianus gelia</i> Jordan, 1909	gelia Jordan, 1909		Bachan Indonésie
<i>Papilio (Achillides) lorquinianus lorquinianus</i> C. & R. Felder, 1865	lorquinianus = <i>Papilio lorquinianus</i> = <i>Papilio lorquinianus apollodorus</i> = <i>Papilio lorquinianus dewaro</i> = <i>Princeps lorquinianus</i> = <i>Achillides lorquinianus</i>	C. & R. Felder, 1865	localisé et peu commun Ternate, Halmahera, Waigeu, Arfak Indonésie
<i>Papilio (Achillides) lorquinianus ochoco</i> Shimogori, 1997	ochoco = <i>Papilio lorquinianus ochotica</i>	Shimogori, 1997	Yapen, Nord-ouest de l'Irian Indonésie
<i>Papilio (Achillides) lorquinianus philippus</i> Wallace, 1865	philippus = <i>Papilio philippus</i> = <i>Achillides lorquinianus philippus</i>	Wallace, 1865	Ceram Indonésie
<i>Papilio (Achillides) neumoegei</i> Honrath, 1890	neumoegei = <i>Papilio maremba</i> = <i>Harimala maremba</i> = <i>Princeps neumoegei</i> = <i>Achillides neumoegei</i>	Honrath, 1890	peu commun Sumba, Sumbawa Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus adamantius</i> C. & R. Felder, 1865	peranthus <i>adamantius</i> = <i>Papilio adamantius</i> = <i>Papilio macedon</i> = <i>Achillides peranthus adamantius</i>	C. & R. Felder, 1865	Nord du Sulawesi Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus baweanus</i> Hagen, 1896	baweanus = <i>Papilio peranthus</i> var. <i>baweanus</i> = <i>Achillides peranthus baweanus</i>	Hagen, 1896	Île Bawean Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus fannius</i> Fruhstorfer, 1909	fannius Fruhstorfer, 1909		Sumbawa Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus fulgens</i> Röber, 1891	fulgens = <i>Papilio peranthus</i> var. <i>fulgens</i>	Röber, 1891	Lombok, Solor, Adonara islands Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus insulicola</i> Rothschild, 1896	insulicola = <i>Papilio adamantius insulicola</i>	Rothschild, 1896	Sud du Sulawesi, Selayar Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus intermedius</i> Snellen, 1890	intermedius = <i>Papilio peranthus</i> var. <i>intermedius</i> = <i>Achillides peranthus intermedius</i>	Snellen, 1890	Tanadjampea, Bonerate, Kalao Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus kinesias</i> Fruhstorfer, 1909	kinesias Fruhstorfer, 1909		Flores Indonésie
<i>Papilio (Achillides) peranthus kransi</i> Jurriaanse & Lindemans, 1920	kransi = <i>Achillides peranthus kransi</i>	Jurriaanse & Lindemans, 1920	Buton Island Sulawesi Indonésie

Auteur: Dominiek PRUVOT	août 2018				
<i>Papilio (Achillides) peranthus peranthus</i> Fabricius, 1787	<i>peranthus</i> = <i>Papilio peranthus</i> = <i>Papilio peranthus</i> ab. <i>phoebus</i> = <i>Princeps peranthus</i> = <i>Achillides peranthus</i>	Fabricius, Pnc: <i>Micromelum</i> 1787	Commun	Java Indonésie	
<i>Papilio (Achillides) peranthus sumie</i> Shimogori, 1992	<i>sumie</i> Shimogori, 1992			Jatirsiri island (île au Sud de Borneo) Indonésie	
<i>Papilio (Achillides) peranthus transiens</i> Fruhstorfer, 1898	<i>transiens</i> Fruhstorfer, 1898			Bali, Alor, Pantar Lesser Sunda Island	
<i>Papilio (Achillides) peranthus wangiwangiensis</i> Kitahara, 1989	<i>wangiwangiensis</i> = <i>Achillides peranthus wangiwangiensis</i>	Kitahara, 1989		Wangiwangi island Tukangbesi islands Indonésie	
<i>Papilio (Achillides) pericles hekaton</i> Fruhstorfer, 1909	<i>pericles hekaton</i> Fruhstorfer, 1909			Leti Indonésie	
<i>Papilio (Achillides) pericles hermogenes</i> Fruhstorfer, 1909	<i>hermogenes</i> Fruhstorfer, 1909			Selaru Indonésie	
<i>Papilio (Achillides) pericles olympiodorus</i> Fruhstorfer, 1909	<i>olympioidorus</i> Fruhstorfer, 1909			Babber Indonésie	
<i>Papilio (Achillides) pericles pericles</i> Wallace, 1865	<i>pericles</i> Wallace, 1865 = <i>Princeps pericles</i> = <i>Achillides pericles</i>		peu commun	Timor Indonésie, Pulau	
	Groupe des <i>ulysses</i>				
<i>Papilio (Achillides) montrouzieri</i> Boisduval, 1859	<i>montrouzieri</i> = <i>Papilio chaudiroi</i> = <i>Papilio ulysses</i> var. <i>ulyssinus</i> = <i>Papilio ulysses</i> var. <i>ulyssinus</i> ab. <i>ulyssellus</i> = <i>Papilio westwoodi</i> = <i>Princeps montrouzieri</i> = <i>Papilio montrouzieri</i> ab.m. <i>ulyssellus</i> = <i>Papilio montrouzieri</i> ab. <i>westwoodi</i> = <i>Achillides montrouzieri</i>	Boisduval, 1859	Pnc: <i>Zeridium pseudobtusifolium</i> , <i>Achronymchia laevis</i>	pas rare	Grande Terre, Îles de la Loyauté Nouvelle-Calédonie France
<i>Papilio (Achillides) syfanius albosyfanus</i> Shimogori & Fujioka, 1997	<i>syfanius albosyfanus</i> = <i>Papilio maackii albosyfanus</i> = <i>Achillides maackii albosyfanus</i>	Shimogori & Fujioka, 1997			Likiang Nord du Yunnan Chine
<i>Papilio (Achillides) syfanius albimaculata</i> Rober, 1908	<i>albimaculata</i> Rober, 1908				Sud du Yunnan Chine
<i>Papilio (Achillides) syfanius kongaensis</i> (Yoshino, 1997)	<i>kongaensis</i> = <i>Achillides syfanius kongaensis</i>	(Yoshino, 1997)			Mt. Kongashan, Luting county, Sichuan Chine
<i>Papilio (Achillides) syfanius sichuanica</i> Schäffler, 2004	<i>sichuanica</i> = <i>Achillides syfanius sichuanica</i>	Schäffler, 2004			Ouest de Leshan, Est du Sichuan Chine
<i>Papilio (Achillides) syfanius syfanius</i> Oberthür, 1886	<i>syfanius</i> = <i>Papilio syfanius</i> = <i>Papilio bianor syfanius</i> = <i>Achillides syfanius</i> = <i>Achillides syfanius syfanius</i>	Oberthür, 1886		Localisé et assez rare	Ta-Tsien-Lou, Nord du Yunnan Chine
<i>Papilio (Achillides) ulysses ambiguus</i> Rothschild, 1895	<i>ulysses ambiguus</i> = <i>Papilio ulysses kalinikos</i> = <i>Papilio ulysses marius</i>	Rothschild, 1895			Nouvelle Bretagne, Nouvelle Irlande Archipel Bismarck, Mioko Nouveau Lauenburg Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses agasophus</i> Fruhstorfer, 1903	<i>agasophus</i> Fruhstorfer, 1903				Fergusson Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses altovolensis</i> Schäffler & Schmidbauer, 2004	<i>altovolensis</i> = <i>Achillides ulysses altovolensis</i>	Schäffler & Schmidbauer, 2004			Arlak Mts. Irian Jaya Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses ambelauensis</i> Schäffler & Schmidbauer, 2004	<i>ambelauensis</i> = <i>Achillides ulysses ambelauensis</i>	Schäffler & Schmidbauer, 2004			Île Ambelau Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses ampelius</i> Rothschild, 1908	<i>ampelius</i> Rothschild, 1908				Buru Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses autolyucus</i> C. & R. Felder, 1865	<i>autolyucus</i> = <i>Papilio autolyucus</i> = <i>Papilio penelope</i>	C. & R. Felder, 1865			Ouest de l'Irian Indonésie à Papouasie Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses calypso</i> Schäffler & Schmidbauer, 2004	<i>calypso</i> = <i>Achillides ulysses calypso</i>	Schäffler & Schmidbauer, 2004			Île Salawati Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses denticulatus</i> Joicey & Talbot, 1916	<i>denticulatus</i> = <i>Papilio denticulatus</i>	Joicey & Talbot, 1916			Biak Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses dirce</i> Jordan, 1909	<i>dirce</i> = <i>Papilio dirce</i>	Jordan, 1909			Misool Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses dohertius</i> Rothschild, 1898	<i>dohertius</i> Rothschild, 1898				Obi Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses eugenius</i> Fruhstorfer, 1909	<i>eugenius</i> = <i>Papilio ulysses eugenius f. principalis</i> = <i>Papilio ulysses eugenius f. roxane</i>	Fruhstorfer, 1909			Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses gabrielis</i> Rothschild, 1898	<i>gabrielis</i> = <i>Achillides ulysses gabrielis</i>	Rothschild, 1898			Îles de l'Amirauté Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses georgius</i> Rothschild, 1908	<i>georgius</i> = <i>Papilio ulysses rothschildianus</i>	Rothschild, 1908			Guizo, New Georgia Group Îles Salomons
<i>Papilio (Achillides) ulysses irisae</i> Späth, 1992	<i>irisae</i> = <i>Achillides ulysses irisae</i>	Späth, 1992			Manipa Island Moluques Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses jennifeae</i>	<i>jennifeae</i> = <i>Achillides ulysses jennifeae</i>	Jakusch, 2007			Schleinitz Mts., Nouvelle Irlande Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses joesa</i> Butler, 1869	<i>joesa</i> = <i>Papilio joësa</i> = <i>Papilio ulysses joësa</i>	Butler, 1869			Cape York à McKay, Queensland Australie
<i>Papilio (Achillides) ulysses karkarensis</i> Schäffler & Schmidbauer, 2004	<i>karkarensis</i> = <i>Achillides ulysses karkarensis</i>	Schäffler & Schmidbauer, 2004			Karkar island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses melanotica</i> Hagen, 1897	<i>melanotica</i> = <i>Papilio ulysses autolyucus ab. melanotica</i>	Hagen, 1897			Moluques, Salawati Sorong Indonésie?
<i>Papilio (Achillides) ulysses morotaiacus</i> Rothschild, 1908	<i>morotaiacus</i> = <i>Achillides ulysses morotaiacus</i>	Rothschild, 1908			Morotai Island Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses nigerrimus</i> Ribbe, 1898	<i>nigerrimus</i> = <i>Papilio ulysses</i> var. <i>nigerrimus</i> = <i>Papilio ulysses nigerrimus f.f. nigerrimus</i> = <i>Papilio ulysses nigerrimus f.f. cyanippe</i>	Ribbe, 1898			Bougainville Papouaise-Nouvelle-Guinée, Shortland Islands Îles Salomon
<i>Papilio (Achillides) ulysses orsippus</i> Godman & Salvin, 1888	<i>orsippus</i> = <i>Papilio orsippus</i> = <i>Papilio ulysses orsippus f.f. hilaria</i> = <i>Papilio ulysses orsippus f.f. penthina</i>	Godman & Salvin, 1888			Guadalcanal, Choïseul, Santa Isabel, Île Floride Îles Salomon
<i>Papilio (Achillides) ulysses oxyartes</i> Fruhstorfer, 1909	<i>oxyartes</i> = <i>Achillides ulysses oxyartes</i>	Fruhstorfer, 1909			Aru Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses physkon</i> Fruhstorfer, 1909	<i>physkon</i> Fruhstorfer, 1909				Waigeu Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses reikoeae</i> Kariya, 1988	<i>reikoeae</i> Kariya, 1988				Manipa Island Moluques Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses taxiles</i> Fruhstorfer, 1909	<i>taxiles</i> Fruhstorfer, 1909				Milne Bai Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses telegonus</i> C. & R. Felder, 1860	<i>telegonus</i> = <i>Papilio telegonus</i>	C. & R. Felder, 1860			Bachan, Ternate, Halmahera Indonésie
<i>Papilio (Achillides) ulysses telemachus</i> Montrouzier, 1856	<i>telemachus</i> = <i>Papilio telemachus</i>	Montrouzier, 1856			Trobriand, Fergusson, Goodenough Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses telephanes</i> Fruhstorfer, 1902	<i>telephanes</i> Fruhstorfer, 1902				Kiriwina et Fergusson Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Papilio (Achillides) ulysses ulysses</i> Linnaeus, 1758	<i>ulysses</i> = <i>Papilio ulysses</i> = <i>Papilio diomedes</i> = <i>Princeps ulysses</i> = <i>Achillides ulysses</i> = <i>Achillides ulysses ulysses</i>	Linnaeus, 1758	Pnc: <i>Citrus limon</i> , <i>C. ardisi</i> , <i>C. siensis</i> , <i>Evodia</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Acradenia euodiformis</i> , <i>Acronymchia vestita</i> , <i>Euodia bonwickii</i> , <i>E. elleryana</i> , <i>E. micrococca</i> , <i>E. vitiflora</i> , <i>Evodiella muelleri</i> , <i>Geijera paniculata</i> , <i>G. salicifolia</i> , <i>Halfordia scleroxyla</i>	Commun	Ceram, Ambon Indonésie
	Sous-genre : <i>Heraclides</i> = <i>Calaides</i> = <i>Priamides</i> = <i>Troilides</i> = <i>Thoas</i>	Hübner, [1819]			
	Groupe des <i>anchisiades</i>				
<i>Papilio (Heraclides) anchisiades anchisiades</i> Esper, 1788	<i>anchisiades anchisiades</i> = <i>Papilio anchisiades</i> = <i>Papilio isidorus</i> = <i>Papilio pompeius</i> = <i>Heraclides isidorus</i> = <i>Priamides anchisiades</i> = <i>Heraclides anchisiades</i> = <i>Papilio hipponous</i> = <i>Papilio archelaus</i> = <i>Papilio theramenes</i> = <i>Heraclides matusiki</i> = <i>Heraclides anchisiades anchisiades</i> = <i>Priamides anchisiades anchisiades</i>	Esper, Pnc : <i>Citrus limon</i> , 1788 <i>Casimiroa edulis</i>	commun	Venezuela, Colombie, Guyana, Suriname, Guyane française, Pérou, Sud et Centre du Brésil	
<i>Papilio (Heraclides) anchisiades capys</i> Hübner, [1809]	<i>capys</i> = <i>Papilio capys</i> = <i>Papilio evander</i> = <i>Heraclides anchisiades capys</i>	Hübner, [1809]			Bolivie, Est et Sud du Brésil, Nord de l'Argentine, Paraguay

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
Papilio (Heracles) anchisiades idaeus Fabricius, 1793		idaeus = Papilio idaeus = Papilio pandion = Papilio anchisiades var. pandion = Papilio pandonius = Heracles anchisiades idaeus = Papilio ideus	Fabricius, 1793 Pnc: Casimiroa edulis , Zanthoxylum , Citrus	Texas USA , Mexique à Colombie et Nord-ouest du Venezuela
Papilio (Heracles) anchisiades lamasi (Brown, 1994)		lamasi = Heracles anchisiades lamasi = Priamides anchisiades lamasi	(Brown, 1994)	Versant ouest des Andes du Sud de la Colombie et de l' Equateur
Papilio (Heracles) anchisiades philastrius Fruhstorfer, 1915		philastrius = Heracles anchisiades philastrius	Fruhstorfer, 1915	Trinidad
Papilio (Heracles) chiansiades chiansiades Westwood, 1872		chiansiades chiansiades = Papilio chiansiades = Heracles chiansiades chiansiades = Priamides chiansiades chiansiades	Westwood, 1872	Localisé et commun Equateur, Pérou
Papilio (Heracles) chiansiades dospassosi Rütimeyer, 1969		dospassosi = Papilio dospassosi = Heracles chiansiades dospassosi = Priamides chiansiades dospassosi	Rütimeyer, 1969	Putomayo River Colombie
Papilio (Heracles) chiansiades maroni Moreau, 1923		maroni = Papilio maroni = Heracles maroni = Heracles chiansiades maroni	Moreau, 1923	rare Guyana , Saint-Laurent-du-Maroni Guyane française , Suriname , Venezuela ?
Papilio (Heracles) chiansiades mossi (Brown, 1994)		mossi = Heracles chiansiades mossi	(Brown, 1994)	Ouest de l'Amazone à Rio Madeira, Utinga Parà Brésil
Papilio (Heracles) epenetus Hewitson, 1861		epenetus = Heracles epenetus = Priamides epenetus	Hewitson, 1861	peu commun Ouest de l' Equateur
Papilio (Heracles) erostratus erostratinus Vásquez, 1947		erostratus erostratinus = Papilio erostratus f. erostratinus = Heracles erostratus erostratinus	Vásquez, 1947	Est du Mexique
Papilio (Heracles) erostratus erostratus Westwood, 1847		erostratus = Papilio erostratus = Priamides erostratus = Heracles erostratus = Papilio rhetus = Heracles erostratus erostratus	Westwood, 1847	Sud-est et Sud-ouest du Mexique , Guatémala , Honduras à El Salvador
Papilio (Heracles) erostratus vazquezae Beutelspacher, 1986		vazquezae = Heracles erostratus vazquezae	Beutelspacher, 1986	rare Sud-ouest du Mexique
Papilio (Heracles) hyppason Cramer, [1775]		hyppason = Papilio hyppason = Papilio amosis = Papilio hyppason var. paraensis = Papilio hyppasonides = Papilio hyppason f. ptilon = Papilio hyppason rousseau-decellei = Papilio hyppason ab. unimacula = Papilio hyppason f. modestior = Heracles hyppason = Trollides hyppason	Cramer, [1775]	commun Suriname , Parà Brésil , Guyane française , Pérou , Bolivie , Venezuela , Equateur
Papilio (Heracles) isidorus autana (Racheli & Racheli, 1995)		isidorus autana = Heracles isidorus autana	(Racheli & Racheli, 1995)	Los Andes, Barinitas, Barinas Venezuela
Papilio (Heracles) isidorus brises Rothschild & Jordan, 1906		brises = Papilio rhodostictus nymphus orientalis = Heracles isidorus brises	Rothschild & Jordan, 1906	Versant est des Andes Colombie
Papilio (Heracles) isidorus flavescens Oberthür, 1879		flavescens = Papilio isidorus flavescens = Papilio isidorus var. leucostictus = Papilio ceus = Heracles isidorus flavescens = Priamides isidorus flavescens	Oberthür, 1879	Est des Andes de l' Equateur et du Nord du Pérou
Papilio (Heracles) isidorus isidorus Doubleday, 1846		isidorus = Papilio isidorus = Heracles isidorus = Papilio isidorus chironis = Papilio isidorus f. pseudoflavescens = Heracles isidorus isidorus	Doubleday, 1846	Est des Andes du centre du Pérou à la Bolivie
Papilio (Heracles) isidorus nymphus Rothschild & Jordan, 1906		nymphus = Papilio rhodostictus nymphus = Papilio isidorus var. leleargei = Papilio metrobates = Papilio rhodostictus nymphus occidentalis = Heracles isidorus nymphus	Rothschild & Jordan, 1906	Vallées centrales de la Colombie
Papilio (Heracles) isidorus pacificus Rothschild & Jordan, 1906		pacificus = Papilio rhodostictus pacificus = Heracles isidorus pacificus = Priamides isidorus pacificus	Rothschild & Jordan, 1906	Est du Panama à versant ouest des Andes de la Colombie et de l'Ouest de l' Equateur
Papilio (Heracles) isidorus rhodostictus Butler & Druce, 1874		rhodostictus = Papilio rhodostictus = Papilio rhodostictus rhodostictus = Heracles rhodostictus = Heracles isidorus rhodostictus	Butler & Druce, 1874	Pnc: Citrus , Zanthoxylum Costa Rica , Ouest du Panama
Papilio (Heracles) isidorus tingo (Racheli & Racheli, 1995)		tingo = Heracles isidorus tingo	(Racheli & Racheli, 1995)	Rio Huambo, Rodriguez de Mondoza, Amazonas Pérou
Papilio (Heracles) oxynius (Geyer, [1827])		oxynius = Laerlias oxynius = Papilio augustus = Papilio oxynius f. ochracea = Papilio oxynius f. f. niveomarginatus = Heracles oxynius	(Geyer, [1827])	Très rare Cuba
Papilio (Heracles) pelaus atkinsi Bates, 1935		pelaus atkinsi = Heracles pelaus atkinsi = Priamides pelaus atkinsi	Bates, 1935	Localisé et peu commun Cuba
Papilio (Heracles) pelaus imerius Godart, 1819		imerius = Papilio imerius = Papilio augias = Heracles pelaus imerius = Priamides pelaus imerius	Godart, 1819	Localisé et peu commun Haïti , République dominicaine
Papilio (Heracles) pelaus pelaus Fabricius, 1775		pelaus = Papilio pelaus = Papilio ornofagus = Heracles pelaus pelaus	Fabricius, 1775	Localisé et rare Jamaïque
Papilio (Heracles) pelaus puertoricensis (Möhn, 1999)		puertoricensis = Heracles pelaus puertoricensis = Priamides pelaus puertoricensis	(Möhn, 1999)	Porto Rico , Saint Croix îles Vierges USA
Papilio (Heracles) rogeri pharnaces Doubleday, 1846		rogeri pharnaces = Papilio pharnaces = Papilio phanostictus = Papilio polycharmus = Papilio pharnaces f. paucimaculata = Papilio pharnaces f. dissimilis = Priamides pharnaces = Heracles pharnaces = Heracles rogeri pharnaces	Doubleday, 1846	Sud du Texas USA , Mexique à Nord-ouest du Guatémala
Papilio (Heracles) rogeri rogeri Boisduval, 1836		rogeri = Papilio rogeri = Heracles rogeri = Heracles rogeri rogeri	Boisduval, 1836	Honduras , Yucatan Mexique
		Groupe des thoas		
Papilio (Heracles) andraemon andraemon (Hübner, [1823])		andraemon andraemon = Heracles andraemon = Papilio andraemon hernandezii = Heracles andraemon andraemon	(Hübner, [1823])	commun Jamaïque , Cuba , Little Cayman et Cayman Brac îles Caïmans Royaume-Uni
Papilio (Heracles) andraemon bonhotiei Sharpe, 1900		bonhotiei = Heracles andraemon bonhotiei	Sharpe, 1900	Sud de la Floride USA , Bahamas
Papilio (Heracles) andraemon tailori Rothschild & Jordan, 1906		tailori = Heracles andraemon tailori	Rothschild & Jordan, 1906	Grand Cayman îles Caïmans Royaume-Uni

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018			
<i>Papilio (Heracles) androgeus androgeus</i> Cramer, [1775]	<i>androgeus androgeus</i> = <i>Papilio androgeus</i> = <i>Papilio amosus</i> ? = <i>Calaisdes androgeus</i> = <i>Heracles androgeus</i> = <i>Papilio androgeus bagous</i> = <i>Papilio androgeus orestes</i> = <i>Papilio polycæon</i> = <i>Papilio piranthus</i> = <i>Papilio androgeus androgeus f. mira</i> = <i>Papilio androgeos f. feyeri</i> = <i>Papilio androgeus var. fassli</i> = <i>Papilio androgeus androgeus ab. decellei</i> = <i>Papilio hibisci</i> = <i>Papilio altheae</i> = <i>Papilio acanthus</i> = <i>Papilio androgeos</i> = <i>Heracles androgeus androgeus</i> = <i>Calaisdes androgeus androgeus</i>	Cramer, [1775]	Pnc: <i>Citrus sinensis</i>	commun	Suriname, Colombie, Equateur, Bolivie, Amazonas, Pará, Mato Grosso Brésil, Guyane française, Pérou
<i>Papilio (Heracles) androgeus epidaurus</i> Godman & Salvin, 1890	<i>epidaurus</i> = <i>Papilio epidaurus</i> = <i>Papilio androgeus epidaurus f. ochracea</i> = <i>Heracles androgeus epidaurus</i> = <i>Calaisdes androgeus epidaurus</i>	Godman & Salvin, 1890	Pnc: <i>Zanthoxylum elephanatiasus</i> , <i>Citrus reticulata</i>		Floride USA, Est du Mexique à Ouest de l'Equateur , Cuba, Grandes Antilles
<i>Papilio (Heracles) androgeus laodocus</i> (Fabricius, 1793)	<i>laodocus</i> = <i>Papilio laodocus</i> = <i>Papilio androgeus laodocus f. limbatus</i> = <i>Papilio androgeus laodocus f. vollmanni</i> = <i>Heracles androgeus laodocus</i>	(Fabricius, 1793)			Minas Gerais, Paraná Brésil, Paraguay, Argentine
<i>Papilio (Heracles) aristodemus aristodemus</i> Esper, 1794	<i>aristodemus aristodemus</i> = <i>Papilio aristodemus</i> = <i>Heracles aristodemus</i> = <i>Calaisdes aristodemus</i> = <i>Papilio crespontinus</i> = <i>Papilio daphnis</i> = <i>Heracles aristodemus aristodemus</i>	Esper, 1794	Pnc: <i>Amyris elemifera</i> , <i>Zanthoxylum fagara</i>		Haiti, République dominicaine, Porto Rico, île Mona, Floride USA
<i>Papilio (Heracles) aristodemus bjorndalae</i> Clench, 1978	<i>bjorndalae</i> = <i>Heracles aristodemus bjorndalae</i>	Clench, 1978		Protégé: CITES appendice I	Mayaguana et Inagua Islands Sud-est des Bahamas, îles Turques-et-Caïques Royaume-Uni
<i>Papilio (Heracles) aristodemus majasi</i> (Miller, 1987)	<i>majasi</i> = <i>Heracles aristodemus majasi</i>	(Miller, 1987)			Crooked Island, Acklin Island Centre des Bahamas
<i>Papilio (Heracles) aristodemus ponceanus</i> Schaus, 1911	<i>ponceanus</i> = <i>Papilio ponceana</i> = <i>Papilio aristodemus driophilus</i> = <i>Heracles aristodemus ponceanus</i>	Schaus, 1911			Sud-est de la Floride USA, Nord des Bahamas
<i>Papilio (Heracles) aristodemus temenes</i> Godart, 1819	<i>temenes</i> = <i>Heracles aristodemus temenes</i>	Godart, 1819			Cuba
<i>Papilio (Heracles) aristor</i> Godart, 1819	<i>aristor</i> = <i>Heracles aristor</i> = <i>Calaisdes aristor</i>	Godart, 1819		très rare	Haiti (éteint), République dominicaine
<i>Papilio (Heracles) astyalus anchicayaensis</i> Constantino, Le Crom & Salazar, 2002	<i>astyalus anchicayaensis</i> = <i>Heracles astyalus anchicayaensis</i>	Constantino, Le Crom & Salazar, 2002			Colombie
<i>Papilio (Heracles) astyalus astyalus</i> Godart, 1819	<i>astyalus</i> = <i>Papilio astyalus</i> = <i>Calaisdes astyalus</i> = <i>Heracles astyalus</i> = <i>Papilio lycophron</i> = <i>Heracles lycophron</i> = <i>Papilio mentor</i> = <i>Papilio pirithous</i> = <i>Papilio oebalus</i> = <i>Papilio drepanon</i> = <i>Papilio lycophron drepanon</i> = <i>Papilio lycophron ab. delunensis</i> = <i>Papilio lycophron f.f. paulina</i> = <i>Papilio lycophron lycophron f. therstoides</i> = <i>Papilio lycophron pirithous ab. suffusa</i> = <i>Heracles astyalus astyalus</i>	Godart, 1819		Localisé mais commun	Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, Bolivie
<i>Papilio (Heracles) astyalus bajaensis</i> Brown & Faulkner, 1992	<i>bajaensis</i> = <i>Papilio astyalus occidentalis</i> = <i>Heracles astyalus occidentalis</i> = <i>Heracles astyalus bajaensis</i>	Brown & Faulkner, 1992			Baja California et Ouest du Mexique
<i>Papilio (Heracles) astyalus hippomedon</i> (C. & R. Felder, 1859)	<i>hippomedon</i> = <i>Papilio hippomedon</i> = <i>Papilio theophron</i> = <i>Papilio astyalus hippomedon f. iraidari</i> = <i>Papilio astyalus hippomedon f. taini</i> = <i>Heracles astyalus hippomedon</i>	(C. & R. Felder, 1859)			Panama, Colombie, Venezuela, Guyana, Guyane française
<i>Papilio (Heracles) astyalus pallas</i> Gray, [1853]	<i>pallas</i> = <i>Papilio pallas</i> = <i>Papilio hozaus</i> = <i>Heracles astyalus pallas</i>	Gray, [1853]			Sud duTexas USA, Est du Mexique à Nord du Costa Rica
<i>Papilio (Heracles) astyalus phanias</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>phanias</i> = <i>Papilio lycophron phanias</i> = <i>Papilio lycophron brunneus</i> = <i>Heracles astyals phanias</i> = <i>Calaisdes astyals phanias</i> = <i>Heracles astyalus phanias</i>	Rothschild & Jordan, 1906		commun	Pérou, Equateur, Bolivie, Goiás Brésil
<i>Papilio (Heracles) caiguanabus</i> Poey, [1852]	<i>caiguanabus</i> = <i>Papilio numicus</i> = <i>Heracles caiguanabus</i>	Poey, [1852]		très rare	Cuba
<i>Papilio (Heracles) crespontes</i> Cramer, [1777]	<i>crespontes</i> = <i>Heracles oxilus</i> = <i>Papilio crespontes ab. lurida</i> = <i>Papilio thoas crespontes ab. luxuriosus</i> = <i>Papilio crespontes ab. intacta</i> = <i>Papilio crespontes var. maxwelli</i> = <i>Papilio crespontes tr.f. forsythae</i> = <i>Papilio crespontes f. melanurus</i> = <i>Papilio crespontes pennsylvanica</i> = <i>Heracles crespontes</i>	Cramer, [1777]	Pnc: <i>Citrus sinensis</i> , <i>C. limon</i> , <i>C. aurantium</i> , <i>C. grandis</i> , <i>Zanthoxylum fagara</i> , <i>Z. americanum</i> , <i>Z. clava-herculis</i> , <i>Z. hirsutum</i> , <i>Ptelea trifoliata</i> , <i>Ruta graveolens</i> , <i>Casimiroa edulis</i> , <i>Dictamnus albus</i> , <i>Amyris elemifera</i> , <i>Phellodendron amurense</i>	<i>Le Grand porte-queue</i> V-VII, VII-IX et IX	Sud-ouest de l'Ontario Canada, Centre et Est des USA, Cuba
<i>Papilio (Heracles) homothoas</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>homothoas</i> = <i>Heracles homothoas</i>	Rothschild & Jordan, 1906			Costa Rica, Panama, Nord de la Colombie, Ciudad Bolivar, Lower Orinoco Nord du Venezuela
<i>Papilio (Heracles) machaonides</i> Esper, 1796	<i>machaonides</i> = <i>Papilio lycoræus</i> = <i>Heracles machaonides</i>	Esper, 1796			Haiti, République dominicaine, Porto Rico, îles Caimans Royaume-Uni
<i>Papilio (Heracles) melonius</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>melonius</i> = <i>Papilio thoas melonius</i> = <i>Heracles melonius</i>	Rothschild & Jordan, 1906		peu commun	Jamaïque
<i>Papilio (Heracles) ornythion</i> Boisduval, 1836	<i>ornythion</i> = <i>Calaisdes ornythion</i> = <i>Heracles ornythion</i>	Boisduval, 1836	Pnc: <i>Citrus</i>		Sud duTexas, Sud de l'Arizona USA, Yucatan Mexique, Guatemala, Honduras
<i>Papilio (Heracles) paeon escomeli</i> Cockerell, 1927	<i>escomeli</i> = <i>Heracles paeon escomeli</i>	Cockerell, 1927			Est de Andes Pérou à Chili
<i>Papilio (Heracles) paeon paeon</i> Boisduval, 1836	<i>paeon</i> = <i>Papilio paeon</i> = <i>Papilio peon peon perugino</i> = <i>Heracles paeon marxi</i> = <i>Heracles paeon paeon</i>	Boisduval, 1836		commun	Est des Andes Colombie à Bolivie
<i>Papilio (Heracles) paeon thrason</i> C. & R. Felder, 1865	<i>thrason</i> = <i>Papilio thrason</i> = <i>Heracles paeon thrason</i>	C. & R. Felder, 1865			Nord du Yucatan Mexique à Nord du Venezuela et Ouest du Pérou
<i>Papilio (Heracles) rumiko</i> (Shiraiwa & Grishin, 2014)	<i>rumiko</i> = <i>Heracles rumiko</i> = <i>Papilio crespontes f. melanurus</i>	(Shiraiwa & Grishin, 2014)	Pnc: <i>Zanthoxylum fagara</i> , <i>Ptelea trifoliata</i> , <i>Amyris texana</i> , <i>Casimiroa greggi</i> , <i>Ruta graveolens</i> , <i>Citrus</i>		Californie à Texas Sud-ouest des USA, Mexique, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panama
<i>Papilio (Heracles) thersites</i> Fabricius, 1775	<i>thersites</i> = <i>Papilio palamedes</i> = <i>Papilio acamas</i> = <i>Heracles thersites</i>	Fabricius, 1775	Pnc: <i>Citrus</i>		Jamaïque
<i>Papilio (Heracles) thoas autocles</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>thoas autocles</i> = <i>Papilio thoas autocles f. nigro-caudata</i> = <i>Papilio thoas autocles ab. nigrimarginata</i> = <i>Papilio thoas autocles f. ochracea</i> = <i>Heracles thoas autocles</i>	Rothschild & Jordan, 1906			Texas USA, Mexique à Panama

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018		
<i>Papilio (Heracles) thoas brasiliensis</i> Rothschild & Jordan, 1906	brasiliensis = <i>Papilio thoas impunctata</i> = <i>Papilio thoas brasiliensis</i> ab. completa = <i>Papilio thoas brasiliensis</i> ab. reducta = <i>Heracles thoas brasiliensis</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Rio de Janeiro, Mato Grosso Brésil, Uruguay, Paraguay
<i>Papilio (Heracles) thoas cinyras</i> Ménétriés, 1857	cinyras = <i>Papilio cinyras</i> = <i>Papilio lampedon</i> = <i>Papilio cinyras</i> ab. ridens = <i>Papilio thoas flavibrunneus</i> = <i>Papilio thoas chamadus</i> = <i>Papilio thoas cyniras</i> = <i>Heracles thoas cyniras</i> = <i>Heracles thoas cinyras</i>	Ménétriés, 1857		Amazonas Brésil, Equateur, Pérou, Bolivie
<i>Papilio (Heracles) thoas nealces</i> Rothschild & Jordan, 1906	nealces = <i>Heracles thoas nealces</i>	Rothschild & Jordan, 1906	Pnc: <i>Piper</i>	Panama à Venezuela, Trinidad, Colombie, Ouest de l'Equateur, Nord-ouest du Pérou
<i>Papilio (Heracles) thoas oviedo</i> Gundlach, 1866	oviedo = <i>Papilio oviedo</i> = <i>Papilio epitheas</i> = <i>Heracles thoas oviedo</i>	Gundlach, 1866		Cuba
<i>Papilio (Heracles) thoas thoantiades</i> Burmeister, 1878	thoantiades = <i>Papilio thoantiades</i> = <i>Papilio thoas thoantinides</i> = <i>Papilio euclides</i> = <i>Papilio thoas brasiliensis</i> ab. ochracea = <i>Heracles thoas thoantiades</i>	Burmeister, 1878		Argentine, Uruguay
<i>Papilio thoas thoas</i> Linnaeus, 1771	thoas = <i>Papilio thoas</i> = <i>Heracles thoas</i> = <i>Papilio archimedes</i> ? = <i>Heracles thoas thoas</i>	Linnaeus, 1771	Pnc: <i>Zanthoxylum</i> , <i>Citrus limon</i> , <i>Ptelea</i> , <i>Ruta graveolens</i> , <i>Piper</i> , <i>Monniera trifolia</i> ?	commun Suriname, Guyane, Guyane française, Parà Brésil
	Groupe des torquatus		Pnc: <i>Citrus</i>	
<i>Papilio (Heracles) garleppi garleppi</i> Staudinger, 1892	garleppi garleppi = <i>Papilio garleppi</i> = <i>Heracles garleppi</i> = <i>Heracles garleppi garleppi</i>	Staudinger, 1892		rare et localisé San Mateo, Rio Juntas, Versant est des Andes Bolivie
<i>Papilio (Heracles) garleppi interruptus</i> Staudinger, 1892	interruptus = <i>Papilio garleppi</i> var. <i>interruptus</i> = <i>Heracles garleppi interruptus</i>	Staudinger, 1892		Sao Paulo do Olivença, Shanusi, Chanchamayo Pérou, Amazonas Brésil
<i>Papilio (Heracles) garleppi lecerfi</i> (K. Brown & Lamas, 1994)	lecerfi = <i>Heracles garleppi lecerfi</i> = <i>Papilio garleppi</i> var. <i>insidiosus</i> = <i>Papilio garleppi insidiosus</i>	(K. Brown & Lamas, 1994)		Guyane, Guyane française, Suriname
<i>Papilio (Heracles) hectorides</i> Esper, 1794	hectorides = <i>Papilio argentus</i> = <i>Papilio torquatinus</i> = <i>Papilio pandrosus</i> = <i>Papilio lysthous</i> = <i>Papilio torquatinus</i> ab. <i>melania</i> = <i>Papilio hectorides</i> f. f. <i>catamelas</i> = <i>Papilio hectorides agordus</i> = <i>Papilio hectorides lysirte</i> = <i>Papilio mezentius</i> = <i>Menelaides chirodamas</i> = <i>Heracles hectorides</i>	Esper, 1794		localement commun Argentine, Paraguay, Uruguay, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná Brésil
<i>Papilio (Heracles) himeros baia</i> Rothschild & Jordan, 1906	himeros baia = <i>Papilio himeros bahia</i> = <i>Heracles himeros</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Bahia Brésil
<i>Papilio (Heracles) himeros himeros</i> Hopffer, 1866	himeros = <i>Papilio himeros</i> = <i>Papilio mentor</i> = <i>Papilio herodotus</i> = <i>Papilio lycophron</i> var. <i>minor</i> = <i>Heracles himeros himeros</i>	Hopffer, 1866		rare et très localisé Minas Gerais, Rio de Janeiro Brésil
<i>Papilio (Heracles) lamarchei</i> Staudinger, 1892	lamarchei = <i>Heracles lamarchei</i>	Staudinger, 1892		Andes du Sud du Pérou, Ouest de la Bolivie, Argentine
<i>Papilio (Heracles) tasso</i> Staudinger, [1884]	tasso = <i>Heracles tasso</i>	Staudinger, [1884]		Croisement entre <i>Papilio torquatus polybius</i> et <i>P. himeros himeros</i> Brésil, Pérou
<i>Papilio (Heracles) torquatus jeani</i> (Brown & Lamas, 1994)	torquatus jeani = <i>Heracles torquatus jeani</i> = <i>Papilio orchamus</i> = <i>Papilio torquatus orchamus</i>	(Brown & Lamas, 1994)		rare Nord de la Colombie, Ouest du Venezuela
<i>Papilio (Heracles) torquatus leptalea</i> Rothschild & Jordan, 1906	leptalea = <i>Heracles torquatus leptalea</i> = <i>Trollides torquatus leptalea</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Versant ouest des Andes Ouest de l'Equateur
<i>Papilio (Heracles) torquatus mazai</i> Beutelspacher, 1977	mazai = <i>Papilio torquatus tolus</i> f. <i>semimaculata</i> = <i>Papilio torquatus atsukoae</i> = <i>Heracles torquatus mazai</i>	Beutelspacher, 1977		Localisé Sud de Veracruz Mexique à Est d'El Salvador
<i>Papilio (Heracles) torquatus polybius</i> Swainson, 1823	polybius = <i>Papilio polybius</i> = <i>Trollides tros</i> = <i>Papilio trojanus</i> = <i>Papilio torquatus polybius</i> f. f. <i>albosignata</i> = <i>Heracles torquatus polybius</i>	Swainson, 1823		Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso Brésil, Paraguay, Argentine
<i>Papilio (Heracles) torquatus tolmidès</i> Godman & Salvin, 1890	tolmidès = <i>Papilio tolmidès</i> = <i>Heracles torquatus tolmidès</i>	Godman & Salvin, 1890	Pnc: <i>Citrus</i>	peu commun Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panama
<i>Papilio (Heracles) torquatus tolus</i> Godman & Salvin, 1890	tolus = <i>Papilio tolus</i> = <i>Papilio torquatus tolus</i> f. <i>prorsus maculata</i> = <i>Papilio torquatus tolus</i> f.f. <i>semipunctata</i> = <i>Heracles torquatus tolus</i>	Godman & Salvin, 1890		Nord-Est du Mexique à Yucatan à centre de Veracruz Mexique, Sud d'El Salvador
<i>Papilio (Heracles) torquatus torquatus</i> Cramer, [1777]	torquatus = <i>Papilio torquatus</i> = <i>Heracles torquatus</i> = <i>Trollides torquatus</i> = <i>Princeps caudius</i> = <i>Papilio patros</i> = <i>Papilio torquatus</i> var. <i>flavida</i> = <i>Papilio torquatus torquatus</i> f. <i>theras</i> = <i>Papilio torquatus torquatus</i> f. <i>cleolas</i> = <i>Papilio torquatus</i> var. <i>dubia</i> = <i>Papilio torquatus</i> ab. <i>modestus</i> = <i>Papilio garleppi interruptus</i> f.f. <i>xanthica</i> = <i>Papilio torquatus torquatus</i> ab. <i>leo</i> = <i>Heracles torquatus torquatus</i> = <i>Trollides torquatus torquatus</i>	Cramer, [1777]		commun Venezuela, Guyane, Guyane française, Suriname, Amazonas Brésil, Equateur, Pérou, Bolivie
	Groupe des ?			
<i>Papilio (Heracles) peleides</i> ? Esper, 1793	peleides ? Esper, 1793			Connu uniquement par une illustration originale d'Esper
	Sous-genre : Pterourus = <i>Jasoniades</i> = <i>Euphoeades</i> = <i>Caudati</i>	Scopoli, 1777		
	= <i>Pyrrhosticta</i> = <i>Motasiona</i>			
	Groupe des troilus			
<i>Papilio (Pterourus) palamedes leontis</i> Rothschild & Jordan, 1906	palamedes leontis = <i>Pterourus palamedes leontis</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Nuevo Leon, Tamaulipas Nord-est du Mexique
<i>Papilio (Pterourus) palamedes palamedes</i> Drury, [1773]	palamedes = <i>Papilio palamedes</i> = <i>Papilio flavomaculatus</i> = <i>Pterourus palamedes</i> = <i>Papilio chalcas</i> = <i>Papilio calchas</i> = <i>Papilio chalcus</i> = <i>Pterourus palamedes palamedes</i>	Drury, [1773]	Pnc: <i>Persea borbonia</i> , <i>P. borbonia pubescens</i> , <i>Sassafras albidum molle</i>	Commun Sud du Maryland, Floride, Sud du Texas USA
<i>Papilio (Pterourus) troilus texanus</i> Ehrmann, 1900	troilus texanus = <i>Papilio troilus</i> var. <i>texanus</i> = <i>Papilio troilus fakahatchensis</i> = <i>Pterourus troilus texanus</i>	Ehrmann, 1900		Sud de la Floride USA

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018						
Papilio (Pterourus) troilus troilus Linnaeus, 1758	troilus = Papilio troilus = Pterourus troilus = Papilio ilioneus = Papilio troilus var. radiatus = Papilio anethi = Papilio troilus troilus ab. flava = Papilio troilus troilus ab. addenda = Papilio troilus troilus ab. oblitterata = Papilio troilus troilus ab. berioi = Papilio troilus radiatus = Papilio troilus ilioneus = Pterourus troilus troilus	Linnaeus, 1758 Pnc: Sassafras albidum molle, Linderia benzoin, Cinnamomum camphora, Persea borbonia, Liriodendron tulipifera, Magnolia virginiana, Prunus persica?, P. serotina?, Pyrus arbutifolia?, Cercis canadensis?, Syringa vulgaris?, Zanthoxylum americanum?, Z. fraxineum?, Z. clava-herculis?	V-VI et VII-VIII Copie les Battus		Est des USA , Sud-ouest de l'Ontario Canada		
	Groupe des glaucus						
Papilio (Pterourus) appalachiensis (Pavulaan & Wright, 2002)	appalachiensis = Pterourus appalachiensis	(Pavulaan & Wright, 2002)			Sud des Appalaches Est des USA		
Papilio (Pterourus) canadensis Rothschild & Jordan, 1906	canadensis = Papilio glaucus canadensis = Pterourus glaucus canadensis = Papilio arcticus = Papilio deficiens = Papilio canadensis f. borealis = Papilio canadensis	Rothschild & Jordan, 1906 Pnc: Prunus cerasus, P. serotina, P. virginiana, P. persica, Amelanchier canadensis, Crataegus, Malus pumila, Sorbus americana, Populus balsamifera, P. tremuloides, P. grandidentata, Betula alba, B. lenta, B. allegheniensis, B. papyfera, Corylus, Alnus rugosa, Acer, Carya, Ulmus, Tilia americana, Fraxinus americana, F. pennsylvanica	La Papillon tigré du Canada V-VII		Alaska USA à Nord de la Nouvelle-Angleterre, Terre Neuve Canada		
Papilio (Pterourus) esperanza Beutelspacher, 1975	esperanza = Heraclesides esperanza = Pterourus esperanza	Beutelspacher, 1975			Protégé	Nord-est d'Oaxaca Mexique	
Papilio (Pterourus) eurymedon Lucas, 1852	eurymedon = Papilio antinous = Papilio albanus = Papilio lewisii = Papilio eurymedon ab. subnigrata = Papilio eurymedon f. albanus ab. cocklei = Papilio eurymedon f. albanus tr.f. columbiana = Papilio eurymedon albanus = Pterourus eurymedon	Lucas, 1852 Pnc: Prunus emarginata, P. virginiana, P. virginiana demissa, P. ilicifolia, P. persica, P. domestica, Malus pumila, Holodiscus discolor, Amelanchier alnifolia?, Crataegus rivularis, C. douglasii, Ceanothus fendleri, C. velutinus, C. prostratus, C. sanguineus, Rhamnus crocea, R. californica, R. californica rubra, Alnus rura, Salix?, Ribes inerme?	IV-VII Commun		Sud de la Colombie britannique, Sud-ouest de l'Alberta Canada , Washington, Nevada, Californie Ouest des USA , Nord de la Baja California Mexique		
Papilio (Pterourus) alexiaries alexiaries Hopffer, 1866	alexiaries alexiaries = Papilio alexiaries = Papilio glaucus alexiaries = Pterourus glaucus alexiaries	Hopffer, 1866			peu commun	Montagnes au Nord de Veracruz Mexique	
Papilio (Pterourus) alexiaries garcia Rothschild & Jordan, 1906	garcia = Papilio glaucus garcia = Pterourus glaucus garcia	Rothschild & Jordan, 1906				Montagnes du Nord-est du Mexique , Ouest du Texas USA	
Papilio (Pterourus) glaucus glaucus Linnaeus, 1758	glaucus glaucus = Papilio glaucus = Pterourus glaucus = Papilio glaucus ab. ehmanni = Papilio antiochus = Papilio turnus = Papilio alcidamus = Papilio glaucus turnus = Papilio turnus ab. fletcheri = Papilio glaucus ab. delunaris = Papilio glaucus ab. perfulva = Papilio glaucus turnus ab. imperfecta = Papilio glaucus turnus ab. wheeleri = Papilio glaucus turnus ab. paupercula = Papilio turnus ab. niger = Papilio glaucus f. turnus tr.f. dietzi = Papilio glaucus f. turnus tr.f. gerhardi = Papilio glaucus f. nigra = Papilio lauri = Pterourus glaucus glaucus	Linnaeus, 1758 Pnc: Prunus serasus, P. domestica, P. americana, P. serotina, P. pennsylvanica, P. virginiana, P. perica, Crataegus, Malus pumila, Cydonia oblongas, Populus tremuloides, P. deltoides, Carpinus aroliniana Alnus incana, Carya, Tilia americana, Catalpa bignonioides, Liriodendron tulipifera, Magnolia acuminatus, M. virginiana, Cinnamomum camphora, Linderia benzoin, Sassafras albidum molle, Styrax americana?, Fraxinus americana, F. nigra, F. caroliniana, F. pennsylvanica lanceolata, Syringa vulgaris, Ptelea trifoliata, Zanthoxylum americanum, Quercus velutina?		Commun	Centre, Est et Sud des USA , Sud de l'Ontario Canada , Jamaïque		
Papilio (Pterourus) glaucus maynardi Gauthier, 1984	maynardi = Papilio turnus maynardi = Papilio glaucus australis	Gauthier, 1984				Centre et Sud de la Floride USA	
Papilio (Pterourus) multicaudata grandiosus Austin & Emmel, 1998	multicaudata grandiosus = Pterourus multicaudata grandiosus	Austin & Emmel, 1998				Centre du Mexique à Guatémala	
Papilio (Pterourus) multicaudata multicaudata Kirby, 1884	multicaudata = Papilio multicaudata = Papilio multicaudatus = Pterourus multicaudatus = Pterourus multicaudata = Papilio daunus = Papilio daunus ab. ragani = Papilio multicaudatus multicaudatus = Pterourus multicaudata multicaudata	Kirby, 1884 Pnc: Prunus virginiana, P. virginiana demissa, P. americana, P. emarginata, P. cerasus, P. capuli, P. ilicifolia?, Amelanchier, Vauquelina californica, Fraxinus oregonius, F. latifolia, F. anomala, F. viridis, F. pennsylvanica lanceolata, Ligustrum lucidum, L. vulgare, Ptelea trifoliata, P. trifoliata angustifolia, P. baldwinii, P. crenulata, Platanus racemosa	V-VI		Sud de la Colombie britannique, Sud de l'Alberta, Sud-ouest du Saskatchewan Canada , Sud-ouest des USA à Centre du Mexique		
Papilio (Pterourus) multicaudata pusillus Austin & Emmel, 1998	pusillus = Papilio multicaudatus pusillus	Austin & Emmel, 1998				Nord-ouest des USA à Baja California Mexique	
Papilio (Pterourus) pilumnus Boisduval, [1836]	pilumnus = Pterourus pilumnus	Boisduval, [1836] Pnc: Litsea				Arizona, Texas USA , Mexique à Guatémala , El Salvador	
Papilio (Pterourus) rutulus Lucas, 1852	rutulus = Papilio rutulus var. hospitonia = Papilio rutulus tr.f. fannyae = Papilio rutulus var. ammoni = Papilio rutulus var. arizonensis = Papilio nitulus = Papilio glaucus rutulus = Pterourus rutulus = Papilio rutulus ammoni = Papilio rutulus arizonensis = Pterourus glaucus rutulus	Lucas, 1852 Pnc: Prunus cerasus, P. domestica galatensis, P. americana, P. virginiana, P. persica, P. emarginata, P. ilicifolia, P. armenica, P. caroliniana, Malus pumila, Rubus?, Populus balsamifera, P. tremuloides, P. trichocarpa, P. angustifolia, Salix lasiolepis, S. lasiandra, S. scouleriana, S. exigua, S. babylonica, S. hookeriana, Betula papyrifera commutata, Alnus tenuifolia, A. viridis, A. crispa, Acer, Ulmus, Platanus racemosa, Magnolia?, Persea americana, Fraxinus, Syringa vulgaris, Ptelea baldwinii, Quercus chrysolepis	V-VIII		Ouest des USA à Sud de la Colombie britannique Canada , Nord de la Baja California Mexique		
	Groupe des zagreus						
Papilio (Pterourus) neyi bedoci Le Cerf, 1925	neyi bedoci = Papilio ascolius bedoci = Pterourus neyi bedoci	Le Cerf, 1925				Guyane française, Amapa Brésil	
Papilio (Pterourus) neyi josianeae (Möhn, 2001)	josianeae = Pterourus neyi josianeae = Pyrrhosticta neyi josianeae	(Möhn, 2001)				Pebas, Loreto Pérou	
Papilio (Pterourus) neyi neyi Niepelt, 1909	neyi = Papilio neyi = Pterourus neyi = Pyrrhosticta neyi = Pterourus neyi neyi	Niepelt, 1909				Zarayayillo Equateur, Nord-est du Pérou	
Papilio (Pterourus) zagreus ascolius C. & R. Felder, 1864	zagreus ascolius = Papilio ascolius = Pyrrhosticta ascolius = Pterourus zagreus ascolius	C. & R. Felder, 1864			peu commun	Equateur, Sud de Santa Marta à Magdalena valley Nord de la Colombie, Panama?	
Papilio (Pterourus) zagreus bachus (C. & R. Felder, 1865)	bachus = Papilio bachus = Papilio oberthuri = Pyrrhosticta bachus = Pterourus zagreus bachus	(C. & R. Felder, 1865)				Colombie, Equateur?	
Papilio (Pterourus) zagreus batesi (Racheli & Racheli, 1996)	batesi = Pterourus zagreus batesi = Pyrrhosticta zagreus batesi	(Racheli & Racheli, 1996)				Nord du Pérou	
Papilio (Pterourus) zagreus baueri (Möhn, 2001)	baueri = Pterourus zagreus baueri = Pyrrhosticta zagreus baueri	(Möhn, 2001)				Cutua, Tefé Est de l'Amazonas Brésil	

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018		
<i>Papilio (Pterourus) zagreus chrysoxanthus</i> Fruhstorfer, 1915	chrysoxanthus = <i>Papilio zimmermanni</i> = <i>Papilio zagreus</i> ab. <i>flavus</i> = <i>Papilio zagreus zagreus</i> f. <i>feminina</i> = <i>Pterourus zagreus chrysoxanthus</i> = <i>Pyrrhosticta zagreus chrysoxanthus</i>	Fruhstorfer, 1915		Centre du Pérou, Sud du Pérou, Bolivie
<i>Papilio (Pterourus) zagreus chrysomelus</i> Rothschild & Jordan, 1906	chrysomelus = <i>Papilio bachus chrysomelus</i> = <i>Papilio bachus belsazar</i> = <i>Papilio zagreus bacchus</i> f. <i>lathyi</i> = <i>Papilio bachus chrysomelus</i> ab. <i>clarius</i> = <i>Papilio bacchus chrysomelus</i> f. <i>silenus</i> = <i>Pterourus zagreus chrysomelus</i> = <i>Pyrrhosticta bachus chrysomelus</i> = <i>Pterourus bachus chrysomelus</i> = <i>Pyrrhosticta bachus belsazar</i> = <i>Pterourus bachus belsazar</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Pérou, Colombie, Equateur
<i>Papilio (Pterourus) zagreus daguanus</i> Rothschild & Jordan, 1906	daguanus = <i>Papilio ascolius daguanus</i> = <i>Pterourus zagreus daguanus</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Choco Ouest de la Colombie
<i>Papilio (Pterourus) zagreus nigroapicalis</i> (Bollino & Sala, 1998)	nigroapicalis = <i>Pterourus zagreus nigroapicalis</i> = <i>Pterourus zagreus marcapataensis</i> = <i>Pyrrhosticta zagreus marcapataensis</i>	(Bollino & Sala, 1998)		Kosnipata, Rio Marcapata Sud du Pérou central
<i>Papilio (Pterourus) zagreus rosenbergi</i> Druce, 1903	rosenbergi = <i>Papilio rosenbergi</i> = <i>Papilio ascolius rosenbergi</i> = <i>Pyrrhosticta zagreus rosenbergi</i> = <i>Pterourus zagreus rosenbergi</i>	Druce, 1903		Sud-ouest de la Colombie et Ouest de l'Equateur
<i>Papilio (Pterourus) zagreus zagreus</i> Doubleday, 1847	zagreus = <i>Papilio zagreus</i> = <i>Pyrrhosticta zagreus</i> = <i>Pterourus zagreus</i> = <i>Papilio zagreus motilones</i> = <i>Pyrrhosticta zagreus motilones</i> = <i>Pterourus zagreus zagreus</i>	Doubleday, 1847		Venezuela, Colombie, Bolivie, Amazonas Brésil
<i>Papilio (Pterourus) zagreus zalates</i> Godman & Salvin, 1890	zalates = <i>Papilio zalates</i> = <i>Papilio ascolius zalates</i> = <i>Pterourus zagreus zalates</i>	Godman & Salvin, 1890		Centre du Panama, Nicaragua, Costa Rica
	Groupe des scamander	Pnc: Lauracées		
<i>Papilio (Pterourus) birchallii birchallii</i> Hewitson, 1863	birchallii birchallii = <i>Papilio birchallii</i> = <i>Pterourus birchallii</i> = <i>Papilio birchallii birchallii</i> = <i>Pterourus birchallii birchallii</i>	Hewitson, 1863	rare	Sud-est du Panama à Centre et Ouest de la Colombie
<i>Papilio (Pterourus) birchallii bryki</i> Strand, 1930	bryki = <i>Papilio birchallii devriesi</i> = <i>Papilio birchallii godmani</i> = <i>Pterourus birchallii bryki</i>	Strand, 1930	Pnc: <i>Hernandia didymantha</i> très rare	Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chiriqui Centre du Panama
<i>Papilio (Pterourus) hellanichus</i> Hewitson, 1868	hellanichus = <i>Pterourus hellanichus</i>	Hewitson, 1868	peu commun	Uruguay, Nord-est de l'Argentine, Rio Grande do Sul Brésil
<i>Papilio (Pterourus) scamander grayi</i> Boisduval, 1836	scamander grayi = <i>Papilio grayi</i> = <i>Papilio scamander</i> var. <i>lombardi</i> = <i>Papilio grayi</i> var. <i>boisduvali</i> = <i>Papilio dechaufouri</i> = <i>Papilio scamander grayi</i> f.f. <i>leucomelas</i> = <i>Papilio scamander grayi</i> f.f. <i>laticlavus</i> = <i>Pterourus scamander grayi</i> = <i>Pyrrhosticta scamander grayi</i>	Boisduval, 1836		Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo Brésil
<i>Papilio (Pterourus) scamander joergenseni</i> Röber, 1925	joergenseni = <i>Papilio stewarti</i> = <i>Papilio argentinus</i> = <i>Pterourus scamander joergenseni</i> = <i>Pyrrhosticta scamander joergenseni</i>	Röber, 1925		Versant est des Andes Bolivie et Nord-ouest de l'Argentine
<i>Papilio (Pterourus) scamander scamander</i> (Boisduval, 1836)	scamander = <i>Papilio scamander</i> = <i>Pyrrhosticta scamander</i> = <i>Pterourus scamander</i> = <i>Papilio eurymander</i> = <i>Papilio scamander eurymander</i> f.f. <i>arlequina</i> = <i>Pterourus scamander scamander</i>	(Boisduval, 1836)	commun	Rio Grande do Sul, Bahia? Brésil
<i>Papilio (Pterourus) xanthopleura</i> Godman & Salvin, 1868	xanthopleura = <i>Papilio xanthopleura</i> var. <i>diaphora</i> = <i>Papilio diaphora</i> = <i>Pterourus xanthopleura</i>	Godman & Salvin, 1868	rare	Pérou, Amazonas Brésil
	Groupe des homerus	Pnc: Lauracées		
<i>Papilio (Pterourus) cacticus cacticus</i> Lucas, 1852	cacticus cacticus = <i>Papilio cacticus</i> = <i>Pyrrhosticta cacticus</i> = <i>Pterourus cacticus</i> = <i>Papilio zaddachii</i> = <i>Papilio cacticus cacticus</i> f. <i>f. nais</i> = <i>Papilio apollinaris</i> = <i>Papilio cacticus</i> f. <i>derufa</i> = <i>Papilio cacticus</i> f. <i>candida</i> = <i>Pterourus cacticus cacticus</i>	Lucas, 1852	peu commun	Andes Centre et Est de la Colombie à Ouest du Venezuela
<i>Papilio (Pterourus) cacticus inca</i> Rothschild & Jordan, 1906	inca = <i>Papilio cacticus inca</i> f. <i>f. peruviana</i> = <i>Pterourus cacticus inca</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Centre du Pérou
<i>Papilio (Pterourus) cacticus mendozaensis</i> Bollino & Sala, 1994	mendozaensis = <i>Pterourus cacticus mendozaensis</i>	Bollino & Sala, 1994		Pérou
<i>Papilio (Pterourus) cacticus nesrinae</i> Koçak, 1983	nesrinae = <i>Papilio cacticus orientalis</i> = <i>Papilio cacticus nesrinae</i> f. <i>jordani</i> = <i>Pterourus cacticus nesrinae</i>	Koçak, 1983		Andes Ouest de la Colombie
<i>Papilio (Pterourus) cacticus upanensis</i> Talbot, 1929	upanensis = <i>Papilio cacticus</i> f. <i>ramona</i> = <i>Pterourus cacticus upanensis</i> = <i>Pyrrhosticta cacticus upanensis</i>	Talbot, 1929		Est de l'Equateur
<i>Papilio (Pterourus) cleotas</i> G. Gray, 1832	cleotas = <i>Papilio cleotas</i> = <i>Papilio lycortas</i> = <i>Papilio cleotas cleotas</i> f. <i>adaea</i> = <i>Papilio coreobus</i> f. <i>coreobusellus</i> = <i>Pyrrhosticta cleotas</i> = <i>Papilio cleotas cleotas</i> = <i>Pterourus menatius cleotas</i>	G. Gray, 1832		Santa Catarina, Rio de Janeiro Brésil, Argentine
<i>Papilio (Pterourus) coreobus coreobus</i> C. & R. Felder, 1861	coreobus = <i>Papilio coreobus</i> = <i>Papilio clearchus</i> = <i>Papilio philocleon</i> = <i>Papilio cleotas coreobus</i> f. <i>dione</i> = <i>Pterourus coreobus</i> = <i>Papilio cleotas coreobus</i> = <i>Pterourus menatius coreobus</i> = <i>Papilio scamander coreobus</i>	C. & R. Felder, 1861		Colombie, Merida Venezuela
<i>Papilio (Pterourus) coreobus laetitia</i> Butler, 1872	laetitia = <i>Papilio laetitia</i> = <i>Papilio archytas</i> = <i>Papilio cleotas archytas</i> f. <i>panthias</i> = <i>Papilio cleotas archytas</i> = <i>Pterourus menatius laetitia</i> = <i>Pyrrhosticta menatius laetitia</i>	Butler, 1872		Cartago, Sud du Costa Rica, Ouest du Panama
<i>Papilio (Pterourus) coreobus syndemis</i> (Tyler, Brown & Wilson, 1994)	syndemis = <i>Pterourus menatius syndemis</i> = <i>Papilio phaeton</i> = <i>Papilio phaeton</i> = <i>Papilio cleotas phaeton</i> = <i>Papilio cleotas phaeton</i> f. <i>syndemis</i>	(Tyler, Brown & Wilson, 1994)		Colombie, Brésil
<i>Papilio (Pterourus) coreobus vulneratus</i> Butler, 1872	vulneratus = <i>Papilio vulneratus</i> = <i>Papilio victorinus vulneratus</i> = <i>Pterourus menatius vulneratus</i>	Butler, 1872	Pnc: <i>Persea americana</i>	Cartago, Nord du Costa Rica

Auteur: Dominick PRUVOT août 2018				
<i>Papilio (Pterourus) diazi</i> Racheli & Sbordonì, 1975	<i>diazi</i> Racheli & Sbordonì, 1975	Croisement entre <i>Papilio menatius morelius</i> et <i>P. garamas garamas</i>	Tepoztlàn, Morelos Mexique	
<i>Papilio (Pterourus) euterpinus</i> Godman & Salvin, 1868	<i>euterpinus</i> = <i>Papilio euterpinus</i> var. <i>eburneus</i> = <i>Pyrrhosticta euterpinus</i> = <i>Papilio euterpinus euterpinus</i> = <i>Papilio euterpinus eburneus</i> = <i>Pterourus euterpinus</i>	Godman & Salvin, 1868	très localisé	Nord du Pérou, Sud de la Colombie, Equateur
<i>Papilio (Pterourus) garamas abderus</i> Hopffer, 1856	<i>garamas abderus</i> = <i>Papilio abderus</i> = <i>Papilio garamas abderus f. f. ameries</i> = <i>Pterourus garamas abderus</i>	Hopffer, 1856		Est du Mexique
<i>Papilio (Pterourus) garamas baroni</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>baroni</i> = <i>Papilio abderus baroni f. morenoi</i> = <i>Pterourus garamas baroni</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Sud-ouest du Mexique
<i>Papilio (Pterourus) garamas electryon</i> Bates, 1864	<i>electryon</i> = <i>Papilio electryon</i> = <i>Pterourus garamas electryon</i>	Bates, 1864		Chiapas Sud-est du Mexique à Vallées centrales du Guatemala, Honduras, El Salvador
<i>Papilio (Pterourus) garamas garamas</i> (Geyer, [1829])	<i>garamas</i> = <i>Euphoeades garamas</i> = <i>Pyrrhosticta garamas</i> = <i>Pterourus garamas</i> = <i>Papilio geramas</i> = <i>Heracides asclepius</i> = <i>Papilio cincinnatus</i> = <i>Papilio asclepius concinnatus</i> = <i>Papilio garamas garamas f. amisa</i> = <i>Papilio garamas ab. homeroides</i> = <i>Papilio garamas garamas f. splendida</i> = <i>Papilio garamas garamas f. ampliata</i> = <i>Pterourus garamas garamas</i>	(Geyer, [1829])	très commun	Centre et Ouest du Mexique
<i>Papilio (Pterourus) garamas syedra</i> Godman & Salvin, 1878	<i>syedra</i> = <i>Papilio syedra</i> = <i>Pterourus garamas syedra</i>	Godman & Salvin, 1878		Ouest du Panama, Costa Rica
<i>Papilio (Pterourus) homerus</i> Fabricius, 1793	<i>homerus</i> = <i>Papilio homerus ab. takanoi</i> = <i>Pyrrhosticta homerus</i> = <i>Pterourus homerus</i>	Fabricius, 1793		Jamaïque
<i>Papilio (Pterourus) lemoulti</i> Rousseau-Decelle, 1933	<i>lemoulti</i> = <i>Papilio cleotas lemoulti</i> = <i>Papilio cleotas lemoulti f. luteovirens</i> = <i>Papilio cleotas lemoulti f.f. horizonicus</i> = <i>Pterourus menatius lemoulti</i>	Rousseau-Decelle, 1933		Venezuela
<i>Papilio (Pterourus) menatius coelebs</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>menatius coelebs</i> = <i>Papilio aristeus coelebs</i> = <i>Pterourus menatius coelebs</i> = <i>Pyrrhosticta menatius coelebs</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Amazonas Pérou
<i>Papilio (Pterourus) menatius ctesiades</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>ctesiades</i> = <i>Papilio aristeus ctesiades</i> = <i>Papilio aristeus dysmias</i> = <i>Pterourus menatius ctesiades</i> = <i>Pyrrhosticta menatius ctesiades</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Pérou, Amazonas, São Paulo Brésil
<i>Papilio (Pterourus) menatius eurotas</i> C. & R. Felder, 1862	<i>eurotas</i> = <i>Papilio eurotas</i> = <i>Papilio bitias</i> = <i>Papilio aristeus vilcanotus</i> = <i>Papilio aristeus huambensis</i> = <i>Papilio aristeus melini</i> = <i>Papilio aristeus f. bitias</i> = <i>Papilio menatius bitias</i> = <i>Papilio ctesias</i> = <i>Papilio lacordairei</i> = <i>Papilio aristeus bitias f. therapes</i> = <i>Papilio bitias var. marcus</i> = <i>Pterourus menatius eurotas</i> = <i>Pyrrhosticta menatius eurotas</i>	C. & R. Felder, 1862		Equateur, Pérou
<i>Papilio (Pterourus) menatius lenaeus</i> Doubleday, 1846	<i>lenaeus</i> = <i>Papilio lenaeus</i> = <i>Papilio lenaeus ab. aymara</i> = <i>Papilio aristeus lenaeus f. interrupta</i> = <i>Papilio lenaeus f. heteromorpha</i> = <i>Papilio lenaeus f. recidivus</i> = <i>Papilio lenaeus f. atavus</i> = <i>Papilio lenaeus ab. rupestris</i> = <i>Papilio aristeus var. lenaeus f. monochroma</i> = <i>Papilio lenaeus ab. cellamaculosa</i> = <i>Papilio lenaeus ab. austerus</i> = <i>Papilio aristeus lenaeus</i> = <i>Pterourus menatius lenaeus</i> = <i>Pyrrhosticta menatius lenaeus</i>	Doubleday, 1846		Rio Songo, Yungas Bolivie, Pérou
<i>Papilio menatius menatius</i> (Hübner, [1819])	<i>menatius</i> = <i>Calades menatius</i> = <i>Pyrrhosticta menatius</i> = <i>Pterourus menatius</i> = <i>Papilio aristeus</i> = <i>Papilio coristheus</i> = <i>Papilio ctesias var. bari</i> = <i>Papilio felcis</i> = <i>Papilio aristeus aristeus</i> = <i>Pterourus menatius menatius</i>	(Hübner, [1819])		Guyane française, Suriname
<i>Papilio (Pterourus) victorinus morelius</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>victorinus morelius</i> = <i>Papilio victorinus morelius</i> = <i>Papilio victorinus morelius f.f. amphisinus</i> = <i>Pterourus menatius morelius</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Ouest du Mexique
<i>Papilio (Pterourus) victorinus victorinus</i> Doubleday, 1844	<i>victorinus</i> = <i>Papilio victorinus</i> = <i>Papilio helleri</i> = <i>Papilio amphissus</i> = <i>Papilio victorinus f. eritromaculata</i> = <i>Pyrrhosticta menatius victorinus</i> = <i>Papilio victorinus victorinus</i> = <i>Pterourus menatius victorinus</i>	Doubleday, 1844		Est du Mexique à Nicaragua
<i>Papilio (Pterourus) warscewiczii jelskii</i> Oberthür, 1881	<i>warscewiczii jelskii</i> = <i>Papilio jelskii</i> = <i>Papilio warscewiczii jelskii</i> = <i>Pterourus warscewiczii jelskii</i> = <i>Pyrrhosticta warscewiczii jelskii</i>	Oberthür, 1881		Sud-est de l'Equateur, Nord-ouest du Pérou
<i>Papilio (Pterourus) warscewiczii mercedes</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>mercedes</i> = <i>Papilio warscewiczii mercedes</i> = <i>Pterourus warscewiczii mercedes</i>	Rothschild & Jordan, 1906		Est et Centre du Pérou
<i>Papilio (Pterourus) warscewiczii warscewiczii</i> Hopffer, 1865	<i>warscewiczii</i> = <i>Papilio warscewiczii</i> = <i>Papilio warscewiczii</i> = <i>Pyrrhosticta warscewiczii</i> = <i>Pterourus warscewiczii</i> = <i>Papilio soratensis</i> = <i>Papilio warscewiczii warscewiczii</i> = <i>Pterourus warscewiczii warscewiczii</i>	Hopffer, 1865		Bolivie, Sud-est du Pérou
	Hybrides naturels			
<i>Papilio (Pterourus) cephalus</i> Godman & Salvin, 1890	<i>cephalus</i> Godman & Salvin, 1890	Croisement entre <i>Papilio menatius laetitia</i> et <i>P. garamas syedra</i>		Volcan de Chiriqui Panama
<i>Papilio (Pterourus) judicael</i> Oberthür, 1888	<i>judicael</i> Oberthür, 1888	Croisement entre <i>Papilio menatius eurotas</i> et <i>P. warscewiczii jelskii</i>		Pérou

Troidini Talbot, 1939	Tribu des: Troidini Talbot, 1939			
Euryades C. & R. Felder, 1864	Euryades C. & R. Felder, 1864			
<i>Euryades corethrus</i> (Boisduval, 1836)	<i>corethrus</i> = <i>Papilio corethrus</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Aristolochia sessilifolia</i> , <i>A. timbriata</i>	E T
				Misiones, Corrientes, Entre-Rios Nord de l'Argentine, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Sud-est du Brésil, Paraguay, Uruguay

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018	
Euryades duponchelii (Lucas, 1839)	duponchelii (Lucas, 1839) Pnc: Aristolochia = Papilio duponchelii = Euryades reevei = Euryades duponchelii var. straminea = Euryades duponchelii	Santa Catarina, Rio Grande do Sul Brésil, Tucuman Nord de l'Argentine, Paraguay, Uruguay, Bolivie
Cressida Swainson, [1832]	Cressida = Eurycus Swainson, [1832]	
Cressida cressida cressida (Fabricius, 1775)	cressida cressida (Fabricius, 1775) Pnc: Aristolochia holtzei, A. pubera, A. thozetii = Papilio cressida = Cressis heliconides = Papilio harmonia = Papilio harmonides = Eurycus cressida cassandra = Eurycus cressida intermedius = Eurycus cressida f. androgyne = Eurycus cressida kuhni	Territoire du Nord, Port Darwin, Eureka, Cape York à Sydney, Thursdays Island Australie
Cressida cressida insularis (Fruhstorfer, 1909)	insularis (Fruhstorfer, 1909)	Tanimbar, Babar, Romang, Leti, Moa Indonésie
Cressida cressida troilus (Butler, 1876)	troilus (Butler, 1876) = Eurycus troilus	Papouasie-Nouvelle-Guinée
Parides Hübner, [1819]	Parides = Proncus = Hectorides = Endopogon Hübner, [1819] = Ascanides = Blakea Groupe des ascanius	
Parides agavus (Drury, [1782])	agavus (Drury, [1782]) Pnc: Aristolochia triangularis, A. fimbriata = Papilio agavus = Papilio dombaei = Papilio agavus ab. aurimaculatus = Papilio agavus ab. furvescens	XII-I et V-IX espèce de forêts tropicales montagneuses à basse altitude Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná Brésil, Paraguari, Caaguazú, Guairá Paraguay, Corrientes, Formosa, Misiones Nord de l'Argentine
Parides alopius (Godman & Salvin, 1890)	alopius (Godman & Salvin, 1890) Pnc: Aristolochia sp. = Papilio alopius = Papilio lopiusa = Parides alopius ab. tepoztecatl	V-VI et VII-X espèce de forêts mixtes de pins et chênes et de montagne (au dessus de1200m) Sud de l'Arizona USA, Guadalajara Jalisco, Tepoztlán, Cuernavaca Morelos, Mexcala Guerrero, La Paz Sinaloa, Vran Ceboyuro Nayarit, Durango, Chihuahua, Michoacan Ouest du Mexique
Parides ascanius (Cramer, 1775)	ascanius (Cramer, 1775) Pnc: Aristolochia macroura = Papilio ascanius = Papilio orophobus = Papilio neascanius	espèce de milieux cotiers marécageux Ararua, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Cachoeira da Macaé, Poco das Antas Rio de Janeiro Brésil
Parides bunichus almas Casagrande & Mielke, 2007	bunichus almas Casagrande & Mielke, 2007 Pnc: Aristolochia sp.	XII-II espèce d'habitats semi arides entre 1300-1600 m Pico das Almas, Rio de Contas, Montagne de Sincorá, Chapada Diamantina Bahia Brésil
Parides bunichus bunichus Hübner, [1821]	bunichus Hübner, [1821] Pnc: Aristolochia melastoma, A. arcuata, A. littoralis = Menelaides bunichus = Papilio ascalus	Toute l'année espèce de côtes montagneuses sèches jusqu'à 1200 m Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná Brésil
Parides bunichus chamissonia (Eschscholtz, 1821)	chamissonia (Eschscholtz, 1821) Pnc: Aristolochia sp. = Papilio chamissonia = Papilio echedorus = Papilio eurydorus = Parides chamissonia	VIII-IX espèce d'habitats secs en zones côtières Thereseopolis, Florianopolis Santa Catarina Brésil
Parides bunichus damocrates (Guenée, 1872)	damocrates (Guenée, 1872) Pnc: Aristolochia sp. = Papilio damocrates = Parides perrhebus damocrates = Papilio archimides	XII-IV et VII-IX espèce d'habitats arides de l'intérieur des terres Misiones, Puerto Vitoria, Entre Rios, Corrientes, Santa Fé, Buenos Aires Argentine, Paysandu, Colonia, Montevideo Uruguay
Parides bunichus diodorus (Hopffer, 1865)	diodorus (Hopffer, 1865) Pnc: Aristolochia sp. = Papilio diodorus = Papilio campeiro = Papilio chamissonia diodorus = Parides diodorus = Battus diodorus	VIII-IX espèce d'habitats arides de l'intérieur des terres Goiás, Bahia, Minas Gerais Brésil
Parides bunichus perrhebus (Boisduval, 1836)	perrhebus (Boisduval, 1836) Pnc: Aristolochia fimbriata, A. brasiliensis = Papilio perrhebus = Parides perrhebus = Parides perrhebus perrhebus	XII-IV et VII-IX espèce d'habitats arides de l'intérieur des terres São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Brésil, Guairá, Paraguari Paraguay, Misiones Nord de l'Argentine
Parides gundlachianus alayoi Hernández, Alayón & Smith, 1995	gundlachianus alayoi Hernández, Alayón & Smith, 1995 Pnc: Aristolochia sp.	I-II et VI-VII espèce de forêts saisonnières de moussons en zone montagneuse Pan de Azúcar, La Pimentia, Pons, Matahambre, Cueva de los Indios, Hoyo de Fania Province de Pinar del Rio Ouest de Cuba
Parides gundlachianus gundlachianus (C. & R. Felder, 1864)	gundlachianus (C. & R. Felder, 1864) Pnc: Aristolochia sp. = Papilio gundlachianus = Papilio columbus = Papilio grotei = Papilio gundlachianus f. unipunctus = Papilio gundlachianus f. pauperimus = Battus gundlachianus var. calzadillae	I-II et VI-VII espèce de forêts saisonnières de moussons en zone montagneuse Maisi, Boca de Jaucó, Baracoan Yunque de Baracoa Guantanamo, Cupeyal, Gibara, Moa, Mayarí, Loma el Pilon Holguin, Manzanillo Gramma, Sardinero, Punta el gato, Sierra Maestra, Pico Turquino, Hongsolongo Santiago de Cuba Est de Cuba
Parides montezuma montezuma (Westwood, 1842)	montezuma montezuma (Westwood, 1842) Pnc: Aristolochia grandiflora, A. acanthophylla, A. foetida, A. orbicularis, A. micrantha = Papilio montezuma	Toute l'année espèce de zones ouvertes buissonneuses ou cultivées Jalisco, Nayarit, Colima, Morelos, Guerrero, Michoacan, Oaxaca Mexique
Parides montezuma tulana (Reakirt, 1863)	tulana (Reakirt, 1863) Pnc: Aristolochia grandiflora, A. acanthophylla, A. foetida, A. orbicularis, A. micrantha = Papilio tulana	Toute l'année espèce de zones ouvertes buissonneuses ou cultivées Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Yucatan Mexique, Cayo Belize, Escuintla, El Progreso, Quezaltenango Guatemala, San Salvador, La Libertad El Salvador, Cortés Honduras, Matagalpa, Chinandega, Managua, Rivas, Granada, Masaya Nicaragua, Guanacaste, San José Costa Rica
Parides phalaecus nieva Möhn, 1999	phalaecus nieva Möhn, 1999	V-X espèce de haute montagne forestière (1700-3000 m) Rio Nieva, Laguna de Pomacochas Amazonas Nord du
Parides phalaecus phalaecus (Hewitson, 1869)	phalaecus (Hewitson, 1869) Pnc: Aristolochia weberbaueri = Papilio phalaecus	V-X espèce de haute montagne forestière (1500-3000 m) Buenaventura El Oro, El Monje Loja, El Tampo, San Francisco, Valladolid Zamora-Chinchipe Sud de l'Equateur
Parides photinus (Doubleday, 1844)	photinus (Doubleday, 1844) Pnc: Aristolochia grandiflora, A. asclepiodifolia = Papilio photinus = Papilio dars = Papilio thyodilus = Papilio photinus f. escalantei = Parides photinus ab. dars	V-XI espèce de forêts mixtes de pins et chênes Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Colima, Chiapas, Morelos, Guerrero, Oaxaca Mexique, Corosal, Cayo Belize, Verapaz, Sacatepequez Guatemala, Sonsonate, Cuscatlan, La Libertad El Salvador, Honduras, Jinotega, Matagalpa, Chinandega, León, Managua, Carazo, Granada, Masaya Nicaragua, Guanacaste, San José, Puntarenas Costa Rica
Parides proneus (Hübner, [1831])	proneus (Hübner, [1831]) Pnc: Aristolochia melastoma = Hectorides proneus = Papilio phryneus = Papilio fallax = Battus proneus	II-VI espèce de forêts tropicales montagneuses à basse altitude São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná Brésil
	Groupe des klagesi	
Parides klagesi (Ehrmann, 1904)	klagesi (Ehrmann, 1904) = Papilio klagesi	VII-XI espèce de forêts saisonnières de moussons Jabillar, Suapure, Caura River, El Pao, Rio Caroni Bolivar Sud-est du Venezuela, Santo Antonio do Tauá Pará, Montes Auroes Maranhão Brésil
	Groupe des chabrias	
Parides chabrias chabrias (Hewitson, 1852)	chabrias (Hewitson, 1852) Pnc: Aristolochia burchelli, A. didyma = Papilio chabrias = Papilio nymphas = Papilio chabrias var. olivencia = Papilio chabrias ab. aloisi = Papilio chabrias ab. subaloi = Papilio chabrias ab. continua	V-VII espèce de forêts tropicales Rio Madeira, tefe, São Paulo de Olivença Amazonas, Rio Tonantins Manicoré, Rio Jurua Acre Brésil, Napo, Pastaza Equateur, Loreto, Junin, San Martin, Ucayali Pérou, Amazonas Venezuela, Amazonas Meta, Guaviare Colombie

Auteur: Dominiek PRUVOT		août 2018					
Parides burchellanus burchellanus (Westwood, 1872)	<i>burchellanus</i>	<i>burchellanus</i> = <i>Papilio burchellanus</i> = <i>Papilio socama</i> = <i>Battus bruchellanus</i> = <i>Parides bruchellanus</i>	(Westwood, 1872)	Pnc: <i>Aristolochia melastoma?</i> , <i>A. chamissonia?</i>	II-III et VI-VIII	espèce de galeries forestières et le long des rives abruptes jusqu'à 700 m d'altitude	Pujol, Rio Maranhao, Anapolis Nord des Goiás, Tenénite Distrito Federal Brésil
Parides burchellanus jaguarae (Foetterle, 1902)		<i>jaguarae</i> = <i>Papilio jaguarae</i> = <i>Papilio numa</i> = <i>Parides panthonus jaguarae</i> = <i>Battus panthonus jaguarae</i> = <i>Parides panthonus numa</i> = <i>Parides burchellanus jaguarae</i>	(Foetterle, 1902)	Pnc: <i>Aristolochia chamissonia</i>	X	espèce de galeries forestières le long des rives abruptes et de gorges profondes forestières	Fazenda, Jaguará, Rio das Velhas Minas Gerais, Batatais, Casa Branca São Paulo Brésil
Parides echemon echemon (Hübner, [1813])	<i>echemon</i>	<i>echemon</i> = <i>Princeps echemon</i> = <i>Princeps echelus</i> = <i>Papilio spartacus</i> = <i>Papilio echelus</i> var. <i>spartacus</i>	(Hübner, [1813])	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales	Obidos, Juruti, Santarém, Ilha de Colares, Altamira, Rio Arapiuns, Rio Xingu, Rio Tapajos, Belém Parà, Maranhão Brésil
Parides echemon empistocles Küppers, 1975		<i>empistocles</i> Küppers, 1975		Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales jusqu'à 500 m d'altitude	Iberia, Puerto Maldonado, San Lorenzo Madre de Dios, Yahumayo Puno Sud-est du Pérou, Rondônia Brésil , Rio Chiririri Cochabamba, Trinidad Beni Bolivie
Parides echemon ergeteles (Gray, [1853])		<i>ergeteles</i> = <i>Papilio ergeteles</i> = <i>Papilio echelus</i> var. <i>echephron</i> = <i>Papilio polyphron</i> = <i>Papilio echion</i> = <i>Papilio pisander</i> = <i>Parides echemon pisander</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales	Bolivar Venezuela , Annai Rupununi, Camaria Mazaruni-Potaro, Rio Demerara Demerara Ouest Centre Berbice Guyana , Suriname , Saint-Laurent-du-Maroni, Cayenne Guyane française , Obidos, Juruti, Santarém, Rio Arapiuns Parà Brésil
Parides eurimedes antheas (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>eurimedes</i>	<i>antheas</i> = <i>Papilio arcas antheas</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1600 m	Pereira Risaralda, Cali, Calima Valley Valle del Cauca, Cauca Valley, Popayán, Lomites, Jumbo Cauca, Tolima, Antioquia, Quindio Colombie
Parides eurimedes arriphus (Boisduval, 1836)		<i>arriphus</i> = <i>Papilio arriphus</i> = <i>Papilio alcamedes</i> = <i>Papilio arcas</i> var. <i>mabillei</i> = <i>Papilio agathokles</i> = <i>Parides arcas arriphus</i> = <i>Parides eurimedes agathokles</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Aristolochia pilosa</i> , <i>A. odoratissima</i> , <i>A. nummularifolia</i>		espèce de forêts tropicales et de moussons	Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Huila, Tolima, Bolivar, Santander, Magdalena Centre de la Colombie
Parides eurimedes emilius Constantino, 1999		<i>emilius</i> Constantino, 1999		Pnc: <i>Aristolochia tonduzii</i> , <i>A. pilosa</i>		espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1200 m	Bacori-Santa Cecilia Risaralda, Rio Tababro-Anchicaya, Rio Calima, Alto Anchicaya Valle del Cauca, Buga Valley Antioquia, Buenavista, Guarato, Bajo Rio San Juan, Rio Abila Choco Ouest de la Colombie
Parides eurimedes eurimedes Stoll, [1782]		<i>eurimedes</i> = <i>Papilio eurimedes</i> = <i>Papilio arcas</i> = <i>Papilio arcas arcas</i> = <i>Parides arcas</i>	Stoll, [1782]	Pnc: <i>Aristolochia pilosa</i> , <i>A. odoratissima</i>		espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1500 m d'altitude	Cucuta, Santa Marta, Magdalena, Bolivar, Cesar, Norte de Santander, La Guajira Nord de la Colombie , Trujillo, Aragua, Caracas, Portuguesa, Tachira, Merida, Miranda, Carabobo, Distrito Federal, Barinas, Zulia Nord du Venezuela
Parides eurimedes mylotes (Bates, 1861)		<i>mylotes</i> = <i>Papilio mylotes</i> = <i>Papilio docimus</i> = <i>Papilio caleli</i> = <i>Papilio tonila</i> = <i>Papilio aristomenes</i> = <i>Parides arcas mylotes</i>	(Bates, 1861)	Pnc: <i>Aristolochia grandiflora</i>		espèce de forêts tropicales et de moussons	Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatan Sud du Mexique, Cayo, Western District, Toledo, Stann Creek Belize , Suchitepéquez, Retalhuleu, San Juan, Baja Vera Paz, Izabal, Sacatepéquez, Quezaltenango Guatemala , Sonsonate, Cuscatlan, La Libertad, Los Chorrros El Salvador , Cortés, Atlantida Honduras , Matagalpa, Masaya, Managua, Carzo, Granada, Chontales, Rivas, Jinotega, Zelaya Nicaragua , Limon, Carillo, Alahuela, Guanacaste, San José Costa Rica
Parides eurimedes mycale (Godman & Salvin, 1890)		<i>mycale</i> = <i>Papilio mycale</i> = <i>Parides arcas mycale</i>	(Godman & Salvin, 1890)	Pnc: <i>Aristolochia tonduzii</i> , <i>A. pilosa</i>	V-VII	espèce de forêts tropicales et de moussons	Peninsula de Osa, Golfo, La Sirena Puntarenas Sud du Costa Rica , Bugaba, Boquete, Brava Island, Cebaco Island Chiriqui, Farfan, Gambia Colon, Purmula San Blas Panama , Serrania del Darien, Baudo Choco, Urabá Antioquia Nord de la Colombie
Parides eurimedes timias (Gray, [1853])		<i>timias</i> = <i>Papilio timias</i> = <i>Parides timias timias</i> = <i>Papilio timias potone</i> = <i>Parides timias potone</i> = <i>Papilio timaculatus</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	V-VII	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1200 m	Tumaco Nariño Colombie , Tonchigue, San Lorenzo Esmeraldas, Celica, Taguaza, Santo Domingo, Alluriquin Pichincha, Huigra, Naranjapata, Chimbo Chimboraazo, Paramba Imbabura, La Chirima Bolivar, Playas de Juan Montalvo, Babahoyo Los Rios, Cojimies Manabi, Bucay, La Puntilla, Palmar, Naranjal Guyas, Arenillas El Oro Ouest de l' Equateur , Tumbes Pérou
Parides lysander brissonius (Hübner, [1819])	<i>lysander</i>	<i>brissonius</i> = <i>Priamides brissonius</i> = <i>Papilio pompejus</i> = <i>Papilio phymichus</i> = <i>Papilio lysander</i> ab. <i>stramineus</i> = <i>Papilio lysander isanae</i> = <i>Papilio lysander f. extensa</i> = <i>Papilio lysander f. reducta</i>	(Hübner, [1819])	Pnc: <i>Aristolochia sprucei</i> , <i>A. elegans</i> , <i>A. ruiziana</i> , <i>A. leuconeura</i>		espèce de forêts tropicales entre 80 m et 1200 m	Bolivar Venezuela , Tefé, Jutai, Vila Nova, São Gabriel, Tonantins, Tapurucua Amazonas, Rio Branco, Rio Jurua Brésil , Rio Guayabero Meta, Mocoa Putumayo, Rio Jacula Nariño Colombie , Napo, Pastaza, Sucumbios, Orellana, Morona Santiago, Tungurahua, Zamora-Chinchipe Equateur , Ucayali, Loreto, Huanuco, San Martin, Amazonas, Junin, Cuzco, Madre de Dios Pérou , Bolivie?
Parides lysander lysander (Cramer, 1775)		<i>lysander</i> = <i>Papilio lysander</i> = <i>Papilio euristeus</i> = <i>Papilio arbates</i> = <i>Papilio meleander</i> = <i>Papilio eurymas</i> = <i>Papilioanaximander</i> = <i>Papilio horracki</i> = <i>Papilio citrulli</i> = <i>Papilio scaevola</i> = <i>Parides lysander</i> var. <i>bati</i> = <i>Papilio kysander f. f. arbates</i>	(Cramer, 1775)	Pnc: <i>Aristolochia huberiana?</i>		espèce de forêts tropicales et de moussons	Caño Guayo Delta Amacuro, El Varado, Santa Elena Bolivar Venezuela , Rio Berbice Berbice-Courentyne, Bartica, Kaieteur Falls Mazaruni-Potaro Rio Demerara, Fort Akayma Demerara, Mabarama Nord-West Guyana , Paramaibo, Niew Amsterdam Commewijne, Bernarddorp Parà, Sarakreck, Berg en Dal Est Brokopondo Suriname , St-Laurent-du-Maroni, Cayenne Guyane française , Parà Brésil
Parides lysander mattogrossensis (Talbot, 1928)		<i>mattogrossensis</i> = <i>Papilio lysander mattogrossensis</i> = <i>Parides lysander mattogrossensis</i>	(Talbot, 1928)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de gorges forestières tropicales	Melguirra, Burily, Cuiabá, Diamantino, Alto Rio Arinos Matto Grosso, Arquemes, Candelas do Jamari Rondônia Brésil
Parides lysander orinocoensis Constantino, Le Crom & Salazar, 2002		<i>orinocoensis</i> Constantino, Le Crom & Salazar, 2002		Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales jusqu'à 100 m	Meta, Arauca, Vichada Colombie
Parides lysander parsodes (Gray, [1853])		<i>parsodes</i> = <i>Papilio parsodes</i> = <i>Papilio sonor</i> = <i>Papilio antalcidas</i> = <i>Papilio lysander</i> ab. <i>antalcidas</i> = <i>Papilio lysander</i> ab. <i>antalcidae</i> = <i>Parides lysander antalcidas</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristobchia huberiana</i>		espèce de galeries forestières tropicales entre 300 m et 750 m d'altitude	Obidos, Itaituba, Rio Xingu, Rio Tocantins, Igarapé, Belém, Altamira, Ilha de Colres, Santarém Parà Brésil

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018				
Parides neophilus anaximenes (C. & R. Felder, 1862)	neophilus anaximenes = <i>Papilio anaximenes</i> = <i>Papilio neophilus ecbolius</i> f.f. rosissima = <i>Papilio neophilus olivencius</i> f. rosissima	(C. & R. Felder, 1862)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 650 m d'altitude et de zones cultivées	Rio Huambo, Amazonas, Juanjui, Rioja, Tarapoto San Martin, Rio Huallaga, Tongo Maria Huanuco Pérou
Parides neophilus consus (Rothschild & Jordan, 1906)	consus = <i>Papilio neophilus consus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de galeries forestières et savanes jusqu'à 1200 m d'altitude	Buena Vista, Santa Cruz de la Sierra, Encorado, Rio Grande Santa Cruz, Rio Unduma, Coroico, Caranavi, Mapiri, Ixiamas La Paz, Rio Chipiriri, Rio Chaparé, Villa Tunari, Cristal Mayu Cochabamaba Bolivie
Parides neophilus ecbolius (Rothschild & Jordan, 1906)	ecbolius = <i>Papilio neophilus ecbolius</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de galeries forestières tropicales	Obidos, Igarapé, Santarém, Juruty, Utinga, Rio Arapiuns, Belém, Rio Tapajos Pará, Rio Madeira, Huamita, Labrea Amazonas, Porto Velho, Ariquemes Rondônia, Maranhão
Parides neophilus eurybates (Gray, [1853])	eurybates = <i>Papilio eurybates</i> = <i>Papilio eupales</i> = <i>Papilio eurybates</i> f. autumnalis = <i>Battus neophilus eurybates</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de galeries forestières de basses montagnes	Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Ouest de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul Brésil , Puerto Suarez, Azuazegui Santa Cruz Bolivie , Sapucay, Paraguari, Villarrica Guaira Paraguay , Puerto Iguazu Misiones Argentine
Parides neophilus napoensis Varea de Luque, 1975	napoensis = <i>Battus neophilus napoensis</i>	Varea de Luque, 1975	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales	Puerto Napo, Rio Napo, Rio Topo, Tena, Rio Latas Napo, El Corazon, Rio Verde Esmeraldas, Pastaza Est de l' Equateur
Parides neophilus neophilus (Geyer, [1837])	neophilus = <i>Priamides neophilus</i>	(Geyer, [1837])	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales et de moussons	El Manteco, El Dorado, Suapare, La Vuelta, Corosito, Rio Caura, El Pao, Aguas Negras, Alto caroni Bolivar, Amazonas Venezuela , Annaí Rupununi, Bartica, Tumatumari Mazaruni-Potaro, Rios Demerara Demerara Ouest centre Berbice Guyana , Marowijne, Albina Suriname , Saint-Laurent-du-Maroni, Cayenne Guyane française , Obidos Pará Brésil
Parides neophilus olivencius (Bates, 1861)	olivencius = <i>Papilio olivencius</i> = <i>Papilio neophilus olivencius</i> = <i>Papilio aeneides olivencius</i> = <i>Papilio schuppi</i>	(Bates, 1861)	Pnc: <i>Aristolochia colombiana</i>	espèce de forêts tropicales juqu'à 1000 m	Yávita Amazonas Venezuela , Meta, Cundinamarca, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Caquetá Colombie , Iquitos, Rio Cachiycaco, Pebas, Carabajal, Yurimaguas Loreto, Pucllipa, Yarinacocha, Rio Juruá Uacayali, Satipo, Shima, La Merced, Chanchamayo Junin, Puerto Maldonao, San Lorenzo, Manú Madre de Dios, Pilcopata, Carabaya Puno, Cosñipata, Quincemil Cuzco Pérou , São Paulo de Olivença, Rio Uaupés, Nova Olinda do Norte, São Gabriel Amazonas Brésil
Parides neophilus parianus (Rothschild & Jordan, 1906)	parianus = <i>Papilio neophilus parianus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia trilobata</i>	espèce de forêts de moussons	Port of Spain, Caparo, Maraval SaintGeorge Trinidad , Sucre, Monagas, Bolivar, Delta Amacuro, Amazonas Venezuela
Parides orellana (Hewitson, 1852)	orellana = <i>Papilio orellana</i>	(Hewitson, 1852)	Pnc: <i>Aristolochia barbata</i> ?	V-VII et XI-XII	Colonia Florencia Caquetá, Uribe, Papamene Meta, Rio Guainia, El Carmen Guainia, Miyu Amazonas Colombie , Mera Pastaza, Puerto Misahualli Napo Equateur , Venezuela , Rio Nanay, Mishana, Callicebus, Iquitos, Canallo Cocha Pérou , Rio Negro, Tefé, Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, São Paulo de Olivença, Tanantins Amazonas, Candeias do Jamari Rondônia Brésil
Parides panthonus phylarchus (Hopffer, 1866)	panthonus phylarchus = <i>Papilio phylarchus</i> = <i>Parides panthonus barbotini</i>	(Hopffer, 1866)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	II-XI	Saint-Georges de l'Oyapock Guyane française , Rio Amapari Amapá Brésil
Parides panthonus panthonus (Cramer, 1780)	panthonus = <i>Papilio panthonus</i> = <i>Papilio pompeius</i>	(Cramer, 1780)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	II-XI	New Amsterdam Berbice-Courentyne, Bartica Mazaruni-Potaro, Demerara River, Parika Pouest de Demerara Guyana , Paramaribo, Niew Amsterdam Commewijne Suriname , Cayenne, Mana, matoury, Rio Sinnamary, Iracoubo, St-Laurent-du-Maroni Guyane française
Parides tros danunciae Mielke, Casagrande & Mielke, 2000	tros danunciae	Mielke, Casagrande & Mielke, 2000	Pnc: <i>Aristolochia triangularis</i>	IV-V et VIII-IX	Marumbi, Castellhanos, Guaratuba Paraná, Joinville Santa Catarina Sud du Brésil
Parides tros tros (Fabricius, 1793)	tros = <i>Papilio tros</i> = <i>Battus tros</i> = <i>Papilio dardanus</i> = <i>Papilio opleus</i>	(Fabricius, 1793)	Pnc: <i>Aristolochia rumicifolia</i> , <i>A. cynanchifolia</i>	IV-V et VIII-IX	Santa Teresa Espirito Santo, Guanabara, Pedra Blanca, Rubiao, Covanca, Tres Rios Rio de Janeiro, Rio Salimões, Boraceia São Paulo Brésil
Parides zacynthus polymetus (Godart, 1819)	zacynthus polymetus = <i>Papilio sesoimetus</i> = <i>Papilio zacynthus polymetus</i> = <i>Papilio orsilus</i>	(Godart, 1819)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts côtières et de bosquets marécageux de basses terres	Rio Grande do Norte, Recife Pernambuco, Campina Grande, João Pessoa Paraíba, Jequié, Lençois Bahia Brésil
Parides zacynthus zacynthus (Fabricius, 1793)	zacynthus = <i>Papilio zacynthus</i> = <i>Papilio dimas</i>	(Fabricius, 1793)	Pnc: <i>Aristolochia macroura</i> , <i>A. odora</i> , <i>A. ruminifolia</i>	espèce de forêts côtières et de bosquets marécageux de basses terres	Anchieta Espirito Santo, Itapaterininga São Paulo, Barra de São Joao Rio de Janeiro, Pontal do Paraná Paraná, Joinville Santa Catarina Brésil
	Groupe des sesostris				
Parides sesostris sesostris (Cramer, [1779])	sesostris sesostris = <i>Papilio sesostris</i> = <i>Papilio tullus</i> = <i>Papilio lycomes</i> = <i>Papilio sesostrellana</i> = <i>Papilio sesostris</i> ab. <i>pseudozestos</i>	(Cramer, [1779])	Pnc: <i>Aristolochia barbata</i> , <i>A. bicolor</i>	III-V et VII-XII	Apure, Amazonas, Bolivar Venezuela , Mazaruni-Potaro, Demerara-Essequibo, Rupununi Guyana , Paramaibo, Coronie, Saramaca, Marowijne Suriname , Saint-Laurent-du-Maroni, Cayenne Guyane française , Amazonas, Caquetá, Vaupés, Meta, Arauca, Guaviare, Putuayo, Vichada Colombie , Napo, Tungurahua, Pastaza, Orellana, Zamora-Chinchipe Equateur , Loreto, San Martin, Huanuco, Ucayali, Pasco, Junin, Madre de Dios, Cuzco, Puno Pérou , Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre Brésil
Parides sesostris tarquinius (Boisduval, 1836)	tarquinius = <i>Papilio tarquinius</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Aristolochia trianae</i> , <i>A. sprucei</i>	III-V et VII-XII	Panamá, Bugaba, Chiriqui, Gamboa, Boca del Toto, Colon, Darien, Veraguas, Coclé Panama , Aragua, Barinas, Trujillo, Tachira, Merida, Carabobo Venezuela , Mazaruni-Potaro, Demerara-Essequibo, Rupununi Guyana , Naño, Cauca, Cordoba, Sucre, Magdalena, César, Santander, Antioquia, Boyaca, Choco, Risaralda, Bolivar, Cundinamarca Colombie , Guayas, Esmeraldas, Imbabura Ouest de l' Equateur
Parides sesostris trinitensis Brown, 1994	trinitensis Brown, 1994		Pnc: <i>Aristolochia grandiflora</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 800 m d'altitude	Point Fortin, La Brea, Pitch Lake, Silverstream Saint Patrick, Port of Spain Saint George Trinidad

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Parides anchises orinocensis</i> (Rousseau-Decelle, 1960)	<i>orinocensis</i> = <i>Papilio anchises orinocensis</i> = <i>Papilio anchises orinocensis f. smaragdalis</i> = <i>Papilio anchises orinocensis f. melania</i>	(Rousseau-Decelle, 1960)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de zones sèches Tucupita Delta Amacuro Nord-est du Venezuela
<i>Parides anchises osyris</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>osyris</i> = <i>Papilio osyris</i> = <i>Papilio xenares</i> = <i>Papilio toxaris</i> = <i>Papilio severus</i>	(C. & R. Felder, 1861)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de zones sèches Ciudad Bolívar Bolivar, San Estéban, Puerto Cabello Carabobo, Nigua Yaracuy, Joaquin de Navay, Rio Negro, Santa Ana, La Cuchilla Táchira, Santa Lucia Miranda, Maracay, Rancho Grande Aragua, Carayaca Distrito Federal Venezuela
<i>Parides anchises serapis</i> (Boisduval, 1836)	<i>serapis</i> = <i>Papilio serapis</i> = <i>Papilio anchises serapis</i> = <i>Papilio thrasybulus</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de zones sèches Rio Frio, Cerro Patrona, Atanquez, El Congo Magdalena, La Copa, Cartagena Atlantico, Marta, Nevada, Perija Sierras Nord de la Colombie , La Fria, La Flautera, Hacienda la Libertad, Rio Caliche Tachira, El Tucuco Zulia, Caño Tigre Merida Merida Venezuela
<i>Parides anchises stilbon</i> (Kollar, 1839)	<i>stilbon</i> = <i>Papilio stilbon</i>	(Kollar, 1839)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de galeries forestières humides Joinville Santa Catarina, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre Rio Grande do Sul Sud-est du Brésil
<i>Parides anchises thelios</i> (Gray, [1853])	<i>thelios</i> = <i>Papilio thelios</i> = <i>Papilio hierocles</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts de moussons Belém, Marajao, Santarém, Rio Xingu, Amparo, Santo Antônio do Tauá, Ilha de Colares Pará Brésil
<i>Parides anchises zygm</i> Salazar, 2001	<i>zygm</i> = <i>Papilio anchises</i> var. <i>isis</i>	Salazar, 2001	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de zones sèches Santa Marta, Rio Frio Département de Magdalena, Manaure Département de Guajira Nord de la Colombie
<i>Parides cutorina</i> (Staudinger, 1898)	<i>cutorina</i> = <i>Papilio cutorina</i> = <i>Papilio cutorina f. dilutus</i> = <i>Papilio mazeppa</i>	(Staudinger, 1898)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	V-VII et XI-I espèce de forêts tropicales jusqu'à 600 m d'altitude Rio Jacula Nariño, Rio Putumayo Amazonas Colombie , Tena, Rio Talaq Napo, Sarayacu Pastaza, Coca Orellana Est de l' Equateur , Rio Chuchurras Junin, Rio Cachiayaco, Iquitos, Contanama, Picuroyacu, Momon River, Pebas Loreto Nord du Pérou , Itaituba Pará, Tabatinga, Vila Nova, São Paulo de Olivença, San Felipe, Tonantins Amazonas, Rio Jurua Acre Brésil
<i>Parides erithalion blanca</i> Racheli & Möhn, 2001	<i>erithalion blanca</i> Racheli & Möhn, 2001	Pnc: Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>		espèce de biotopes xérothermiques semi-arides jusqu'à 1900 m d'altitude Abancay Apurimac Pérou
<i>Parides erithalion browni</i> Le Crom, Constantino & Salazar, 2002	<i>browni</i> = <i>Parides erithalion metaensis</i> = <i>Parides erithalion metae</i>	Le Crom, Constantino & Salazar, 2002	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1300 m d'altitude Guayabetal Cundinamarca, Rio Negro, Buena Vista, Villavicencio Meta Colombie
<i>Parides erithalion callegarii</i> Racheli & Racheli, 1996	<i>callegarii</i> = <i>Parides erithalion callegariorum</i>	Racheli & Racheli, 1996	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 2000 m d'altitude Salpö, La Merced, Chanchamayo, San Ramon, Rio Ancayo, Rio Perené Junin, Oxapampa, Pozuzo Pasco Pérou
<i>Parides erithalion cauca</i> (Oberthür, 1879)	<i>cauca</i> = <i>Papilio erithalion cauca</i>	(Oberthür, 1879)	Pnc: <i>Aristolochia ringens</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 1700 m d'altitude Pereira Risaralda, Valle de l' Cauca Cauca Valley, Cali Colombie
<i>Parides erithalion chocoensis</i> Le Crom, Constantino & Salazar, 2002	<i>chocoensis</i> Le Crom, Constantino & Salazar, 2002	Pnc: <i>Aristolochia cordiflora</i> , <i>A. gigantea</i> , <i>A. ringens</i>		espèce de forêts tropicales jusqu'à 1500 m d'altitude Bilacö, Rio Tatabro, Rio Bravo, Rio calima Valle del Cauca, Santa Cecilia Risaralda, Pizarro, tado, San José del Palmar Ouest de la Colombie
<i>Parides erithalion chinchipensis</i> (Joicey & Talbot, 1918)	<i>chinchipensis</i> = <i>Papilio erlases chinchipensis</i> = <i>Papilio melsheimeri</i> = <i>Parides erlases chinchipensis</i>	(Joicey & Talbot, 1918)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1500 m d'altitude Puyo Pastaza Equateur? , Jaen, Charapé, Rio Tabaconas, Rio Chinchipe, San Ignacio Cajamarca, Rio Huambo, Bagua Grande, Rodriguez de Mendoza Amazonas, Jorge Chavez San Martin Pérou
<i>Parides erithalion erithalion</i> (Boisduval, 1836)	<i>erithalion</i> = <i>Papilio erithalion</i> = <i>Papilio pyrochles</i> = <i>Papilio phaenon</i>	(Boisduval, 1836)	Pnc: <i>Aristolochia ringens</i> , <i>A. cordiflora</i> , <i>A. tonduzii</i>	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1900 m d'altitude Darien, Comara de San Blas, Panamá Panama , Antioquia, Cundinamarca, santander, Boyacá, Caldas, Bolivar, Sierra Santa Marta Colombie
<i>Parides erithalion erlases</i> (Gray, [1853])	<i>erlases</i> = <i>Papilio erlases</i> = <i>Papilio cyphotes</i> = <i>Papilio ab. graphiticus</i> = <i>Parides erlases</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 800 m d'altitude Rio Carabaya, Rio Inambarito Puno Sud du Pérou , Caranavi, Yungas de La Paz, Rio San Pablo La Paz, Chaparé, Rio Chipiriri, Rio Cristal Mayo Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Rio grande Santa Cruz Nord de la Bolivie , Itapuá Paraguay , Tartagal Salta, Tucumán, Formosa, Jujuy, Misiones Nord de l' Argentine
<i>Parides erithalion guillerminae</i> Pischedda & Racheli, 1986	<i>guillerminae</i> = <i>Parides erlases guillerminae</i>	Pischedda & Racheli, 1986	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 1000 m d'altitude Rio Illicullin, Rio Pununo, Rio Talaq, Archidona, Puerto Napo, Puni Cotona, Atahualpa, tena, Misahualli Napo, Macas Morona-Santiago Equateur , Pérou?
<i>Parides erithalion keithi</i> Racheli, 1991	<i>keithi</i> Racheli, 1991	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	I-IV et VIII-IX	espèce de forêts tropicales jusqu'à 1200 m d'altitude La Flautera, San Cristobal, San Joaquin de Navay, Palmira Tachira, Caño Tigre, La Victoria, Mucuchachi Mérida, Barinas, Zulia Venezuela
<i>Parides erithalion kruegeri</i> (Niepelt, 1927)	<i>kruegeri</i> = <i>Papilio erithalion kruegeri</i> = <i>Papilio lacydes</i> ab. <i>krügeri</i>	(Niepelt, 1927)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 1500 m d'altitude Rio Caquetá Amazonas, Rio Caquetá Mocoa Putumayo, Rio jacula Nariño Sud de la Colombie , El Reventador Sucumbios, Rio Chaluia Napo Equateur?
<i>Parides erithalion lacydes</i> (Hewitson, 1869)	<i>lacydes</i> = <i>Papilio lacydes</i> = <i>Papilio erithalion</i> ab. <i>equestris</i> = <i>Papilio erlases lacydes f.f. parvifascia</i> = <i>Parides erlases lacydes</i>	(Hewitson, 1869)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 1900 m d'altitude Rio Topo, Rio Blanco, Rio Zuñac, Rio Estancias, Rio Engaño, Machay, Santa Inez, Baños Tungurahua, Puyo, Mera Pastaza, Sabanilla, Macas, Sucua Morona-Santiago, Loja, Zamora Zamora-Chinchipe Equateur
<i>Parides erithalion palmasensis</i> Brown, 1994	<i>palmasensis</i> = <i>Parides erithalion palmensis</i>	Brown, 1994	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 1400 m d'altitude Celica, Union del Toachi, La Palma, Alluriquin, Santo Domingo Pichincha, Santa María, Quevedo Los Rios, La Chima Bolivar, Zaruma El Oro Equateur
<i>Parides erithalion polyzelus</i> (C. & R. Felder, 1865)	<i>polyzelus</i> = <i>Papilio polyzelus</i> = <i>Papilio alector</i> = <i>Papilio candezei</i> = <i>Papilio polyzelus</i> ab. <i>albipunctus</i> = <i>Papilio polyzelus f. geminatus</i> = <i>Papilio polyzelus polyzelus f. bipunctus</i> = <i>Battus iphidamas f. distinctus</i> = <i>Parides polyzelus</i>	(C. & R. Felder, 1865)	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1200 m d'altitude Sierra de Los Tuxtla, Dos, san Pedro de Soteapan, Amates, Catemaco veracruz, X-Can Quintana Roo, Sierra de Juarez, Orizaba Oaxaca, Tapachula Chiapas, Puebla, Tabasco Mexique , Cayo, Western District, Toledo, Augustine, melinda, Stann Creek Belize , Suchitepéquez, San Juan, Baja Vera Paz, Quezaltenango Guatemala , La Libertad, Los Chorros El Salvador , San Pedro Sula, Cortés Honduras , Zelaya Nicaragua
<i>Parides erithalion racheliorum</i> Lamas, 1998	<i>racheliorum</i> Lamas, 1998	Pnc: <i>Aristolochia sp.</i>		espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 2000 m d'altitude Campo Arniño, Colcabamba Huanacavelica Pérou
<i>Parides erithalion sadyattes</i> (Druce, 1874)	<i>sadyattes</i> = <i>Papilio sadyattes</i> = <i>Papilio erithalion sadyattes</i> = <i>Papilio phormisius</i>	(Druce, 1874)	Pnc: <i>Aristolochia constricta?</i>	VII-VIII espèce de bordures de forêts tropicales primaires et secondaires jusqu'à 900 m d'altitude Matagalpa, Masaya Nicaragua , Carillo, Hda. El Rodeo San José, Turrialba cartago, san Miguel, La selva Heredia, Rio San Lorencito, Cariblanco, San Ramón de Dos Rios, Colonia del Socorro Alajuela, Monteverde Guanacaste, Quebrada Molinete, Cerro Tortuguero, Amubí, Agua Fria, Cuatro Esquinas Limon Nord du Costa Rica

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018			
<i>Parides erithalion smalli</i> Brown, 1994	<i>smalli</i> Brown, 1994	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales et de moussons	Guapilés Limón, Heredia Tabarcia San José, Cachi Cartago, Osa Peninsula, Jaco Puntarenas Sud du Costa Rica , Boquete, Bugaba Chiriqui, Veraguas, Cébaco Island Veraguas, Gamboa, Piña forest Canal Zone Panama
<i>Parides erithalion trichopus</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>trichopus</i> = <i>Papilio polyzelus trichopus</i> = <i>Parides polyzelus trichopus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 800 m d'altitude	Venustano, Carranza Nayarit, Guadalajara, El Agostadero Jalisco, Comala Colima, Patzcuaro Michoacan, Acapulco, Acahuizotla Guerrero, Tepoatlan Morelos Ouest du Mexique
<i>Parides erithalion xanthias</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>xanthias</i> = <i>Papilio erlaces xanthias</i> = <i>Papilio luctuosa</i> = <i>Papilio erlaces douglasi</i> = <i>Parides erlaces xanthias</i> = <i>Parides erlaces douglasi</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1800 m d'altitude	Tarapoto, Roque San martin, Pozuzo, Cushi pasco, Tingo Maria, Rio Monzon Huanuco Pérou
<i>Parides erithalion yaminahua</i> Pischedda & Racheli, 1987	<i>yaminahua</i> = <i>Parides erlaces yaminahua</i>	Pischedda & Racheli, 1987	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales jusqu'à 1600 m d'altitude	Quincemil, Cardoc, Kosnipata, Marcapata, Rio Urubamba Cuzco, salvacion Madre de Dios Sud du Pérou , Acre Brésil? , La Paz Bolivie?
<i>Parides erithalion zeuxis</i> (Lucas, 1852)	<i>zeuxis</i> = <i>Papilio zeuxis</i> = <i>Parides rhesus</i> = <i>Papilio rhameses</i> = <i>Papilio rhameses</i> = <i>Papilio abilius</i> = <i>Papilio rhamses</i> = <i>Papilio eversmanni</i> = <i>Parides eversmanni</i>	(Lucas, 1852)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	I-IV et VIII-IX espèce de forêts tropicales jusqu'à 900 m d'altitude	Merida, Miranda, Valencia, Puerto Cabello Carabobo, Agua Clara, Cumana Sucre, Posoopo Barinas, Rancho Grande, Choroni, Maracay Aragua Nord du Venezuela
<i>Parides iphidamas ayabacensis</i> (Joicey & Talbot, 1918)	<i>iphidamas ayabacensis</i> = <i>Papilio iphidamas ayabacensis</i>	(Joicey & Talbot, 1918)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts sèches	Zaruma, Piñas El Oro Sud de l' Equateur , Ayabaca Mountains Piura, Rio Tabaconas, Jaen Cajamarca Nord du Pérou
<i>Parides iphidamas calogyna</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>calogyna</i> = <i>Papilio iphidamas calogyna</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	III-IV espèce de forêts tropicales jusqu'à 800 m d'altitude	Rio Chuchuvi, San Lorenzo, Cachabi Esmeraldas, Paramba Imbabura, Guayquichuma Loja, Celica, Pacto, Tinalandia, Las Palmas, Santo Domingo, Alluriquin, La Union del Toachi Pichincha, Quevedo Los Rios, Balzapamba Bolivar, Palmir Manabi, Chimbo Chimborazo Nord-Ouest de l' Equateur
<i>Parides iphidamas elatos</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>elatos</i> = <i>Papilio iphidamas elatos</i> = <i>Papilio erithalion cantinela</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia cordiflora</i> , <i>A. tonduzii</i>	espèce de forêts tropicales humides entre 1000 m et 1200 m d'altitude	Darien Panama , Popayan, Cauca Valley Cauca, Santa Rita Risaralda, Calima Valley, Rio Daqua, Daqua Valle Colombie
<i>Parides iphidamas gorgonae</i> (Vélez & Salazar, 1991)	<i>gorgonae</i> = <i>Papilio iphidamas gorgonae</i>	(Vélez & Salazar, 1991)	Pnc: <i>Aristolochia trianae?</i> , <i>A. tonduzii?</i>	espèce de forêts humides	île Gorgone Cauca Colombie
<i>Parides iphidamas iphidamas</i> (Fabricius, 1793)	<i>iphidamas</i> = <i>Papilio iphidamas</i> = <i>Papilio achelous</i> = <i>Papilio incandescens</i> = <i>Papilio iphidamas iphidamas f.f. poverella</i>	(Fabricius, 1793)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	III-IX espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1300 m d'altitude	Guerrero, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatan Sud-est du Mexique , Corozal, Cayo, Belize, Augustine Belize , Mirandilla, Vera Paz, Suchitepéquez, San Juan, Izabal, El Progreso Guatemala , La Libertad, Los Chorro, san Dalvador El Salvador , Cortès, San Pedro Sula, Islas de la Bahia Honduras , Matagalpa, Masaya, Managua, Carazo, Granada, Chontales, Rivas, Jinotega, Zelaya Nicaragua , San Vito, Limon, Carillo, Alajuela, Guanacaste, San José Costa Rica , Veraguas, Boquete Chiriqui Panama
<i>Parides iphidamas phalias</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>phalias</i> = <i>Papilio iphidamas phalias</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia maxima</i> , <i>A. pilosa</i> , <i>A. odoratissima</i> , <i>A. ringens</i>	espèce de forêts tropicales humides entre 200 m et 1400 m d'altitude	Magdalena Valley, Muzo Boyacá, Casabe Antioquia, La Palma, Cananche, Pacho Cundinamarca Centre de la Colombie
<i>Parides iphidamas teneates</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>teneates</i> = <i>Papilio iphidamas teneates</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia maxima</i> , <i>A. pilosa</i> , <i>A. odoratissima</i> , <i>A. ringens</i>	espèce de forêts tropicales	Riohacha Guajira, Onaca, Rio San Diego, Rio Guachaca Magdalena Nord-est de la Colombie , Cucuta, Sierra de Perija Zulia Nord-ouest du Venezuela
<i>Parides panares erythrus</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>panares erythrus</i> = <i>Papilio lycimenes erythrus</i> = <i>Parides lycimenes erythrus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia pilosa</i>	espèce de forêts tropicales	Veraguas, Coclé Panama , Antioquia, Casanaere, Magdalena Valley, Muzo, Purino Boyacá, Caldes, Pereira Risaralda, Calima Valley Valle del Cauca, Cauca Valley Cauca Colombie
<i>Parides panares lycimenes</i> (Boisduval, 1870)	<i>lycimenes</i> = <i>Papilio lycimenes</i> = <i>Parides lycimenes lycimenes</i> = <i>Papilio critobulus</i>	(Boisduval, 1870)	Pnc: <i>Aristolochia pilosa</i>	espèce de forêts tropicales jusqu'à 700 m d'altitude	San Vicente, Boca de Chajul, Chajul, Esmaptepec Chiapas, Mexique , Zacapa, Polochic, Alta Vera paz, Izabal, Tecpan, El Quiché Guatemala , El Salvador , Honduras , Cayo, Toledo, Stann Creek Belize , San Juan, Chontales, Zelaya Nicaragua , Limon, Carillo, Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste, San José Costa Rica , Chiriqui, Bocas de l Toro, Panamá Panama
<i>Parides panares panares</i> (Gray, [1853])	<i>panares</i> = <i>Papilio panares</i> = <i>Parides lycimenes septentrionalis</i> = <i>Parides septentrionalis</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristolochia maxima</i>	III-XI espèce de forêts tropicales et de moussons jusqu'à 1500 m d'altitude	Sierra de Juarez, Metates Oaxaca, Sierra de Los Tuxtías, catemaco Veracruz, Teapa Tabasco, Palenque Chiapas Sud-est du Mexique
<i>Parides panares paralius</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>paralius</i> = <i>Papilio lycimenes paralius</i> = <i>Papilio euryptolemus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales jusqu'à 700 m d'altitude	Lita Imbabura, San Lorenzo, Tonchigila Esmeraldas, Los Bancos, Tinalandia, Pacto Union Del Toachi, Celica Pichincha, Montañita, Guayaquil, Naranjal Guayas, Balzapamba, La Chima Bolivar, Los Rios, Naranjapata, Chimbo, Dos Puentes Chimborazo Equateur
<i>Parides panares rachelii</i> Brown, 1994	<i>rachelii</i> Brown, 1994	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales jusqu'à 700 m d'altitude	Zulia, Rio Naya, Rio Yasa, Sierra de Perija, El Tucuso Zulia, Mijagual Merida, Valencia, Bejuma, Rio Sarare Carabobo, Maracay, Choroni, Rancho Grande Aragua, Cordillera de la Costa Nord du Venezuela
<i>Parides panares tachira</i> Racheli, 1991	<i>tachira</i> Racheli, 1991	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales jusqu'à 1200 m d'altitude	Cesar, Norte de Santander Colombie , La Fria, San Juan de Colon, Rubio, San Cristobal, La Cuchilla Tachira, Merida, Rio Caliche Merida, Barinas Barinitas Sud-ouest du Venezuela
<i>Parides phosphorus gratianus</i> (Hewitson, 1861)	<i>phosphorus gratianus</i> = <i>Papilio gratianus</i> = <i>Papilio phosphorus</i> var. <i>colombianus</i>	(Hewitson, 1861)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	espèce de forêts tropicales jusqu'à 450 m d'altitude	Rio Canó, Villavicencio Meta, Cundinamarca, Caquetá, Serrania de la Macarena Putumayo Colombie
<i>Parides phosphorus laurae</i> Bollino & Costa, 2004	<i>laurae</i> Bollino & Costa, 2004	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales entre 800 m et 1200 m d'altitude	Rio Surukum, Santa Elena de Uairén, Elena Icabaru, Rio Caroni, Rio Caura Venezuela
<i>Parides phosphorus zopyron</i> Lamas, 1998	<i>zopyron</i> Lamas, 1998	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales jusqu'à 140 m d'altitude	Iquitos, Rio Nanay, Rio Sucusari Loreto Nord du Pérou

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018						
<i>Parides phosphorus phosphorus</i> (Bates, 1861)	<i>phosphorus</i> = <i>Papilio phosphorus</i>	(Bates, 1861)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	V-VII	espèce de forêts tropicales	Cafño Guayoa Delta Amacuro Venezuela , Ida Sabina, Rio Berbice Berbice-Curentyne, Rio Demerara Demerara-Berbice Guyana , Obidos, Rio Xingu, Itaituba, Santarém Pará, Manaus, Rio Maués Amazonas Brésil	
<i>Parides phosphorus vavi</i> Racheli, 1992	<i>vavi</i> Racheli, 1992		Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	IV et VIII	espèce de forêts tropicales entre 200 m et 1100 m d'altitude	Acre, Rondônia Brésil , Juanjui, Tarapoto, Rio Sabolo, Rio Shilcayo San Martin, Yurimaguas Loreto, Tingo Maria, Rio Pachitea Huanuco, Huancayo, Chanchamayo Junin, Iberia, Puerto Maldonado Madre de Dios, Illapani Cuzco, Puerto Davis, Quebrada, Samantoshuari Pasco Sud du Pérou , Farinas La Paz, Guayaramerim Beni Nord de la Bolivie	
<i>Parides vertumnus autumnus</i> (Staudinger, 1898)	<i>vertumnus autumnus</i> = <i>Papilio vertumnus</i> var. <i>autumnus</i>	(Staudinger, 1898)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.	I-III et VII-IX	espèce de forêts tropicales entre 300 m et 1200 m d'altitude	Satipo, Chanchamayo, Aloetra River, Shima, La Libertad, Rio Perené, Rio Toro Junin Pérou	
<i>Parides vertumnus bogotanus</i> (C. & R. Felder, 1864)	<i>bogotanus</i> = <i>Papilio vertumnus</i> var. <i>bogotanus</i> = <i>Papilio diceros</i> ab. <i>lineatransversa</i> = <i>Parides vertumnus</i> r. <i>astorius</i> = <i>Parides vertumnus astorius</i>	(C. & R. Felder, 1864)	Pnc: <i>Aristolochia elegans</i> , A. <i>odoratissima</i> , A. <i>acutifolia</i>		espèce de forêts tropicales jusqu'à 800 m d'altitude	Meta, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Amazonas Colombie , Napo, Orellana, Tungurahua, Pastaza, Morona Santiago, Zamor-Chinchipe Equateur , Amazonas, San martin, Ucayali, Loreto, Huanuco, Junin, Medre de Dios Nord-est du Pérou , Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso Brésil	
<i>Parides vertumnus cutora</i> (Gray, [1853])	<i>cutora</i> = <i>Papilio cutora</i> = <i>Papilio vertumnus cutora</i>	(Gray, [1853])	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales	Rio Arapiuns, Rio Tapajos, Juruty, Obidos, Santarém Pará, Nova Olinda do Norte, Rio Maués, Tefé Amazonas Brésil	
<i>Parides vertumnus pyrophanus</i> (Zikán, 1937)	<i>pyrophanus</i> = <i>Papilio vertumnus pyrophanus</i> = <i>Papilio diceros</i> f. <i>pyrophanus</i> = <i>Papilio vertumnus</i> f. <i>melanopterus</i> = <i>Papilio vertumnus vertumnalis</i>	(Zikán, 1937)	Pnc: <i>Aristolochia elegans</i> , A. <i>odoratissima</i> , A. <i>acutifolia</i>		espèce de forêts tropicales	Yávita Amazonas Venezuela , Mitu Vaupés, Puerto Inirida Guainia, Leticia Amazonas Colombie , São Gabriel da Cachoeira Amazonas Brésil	
<i>Parides vertumnus vertumnus</i> (Cramer, 1779)	<i>vertumnus</i> = <i>Papilio vertumnus</i> = <i>Papilio phronius</i> = <i>Papilio verus</i> = <i>Papilio cidius</i> = <i>Papilio vertumnus</i> ab. <i>latoplaga</i> = <i>Pharmacophagus vertumnus</i> ab. <i>latoplaga</i> = <i>Parides vertumnus</i> ab. <i>rubropuncta</i> = <i>Pharmacophagus vertumnus</i> ab. <i>rubropuncta</i> = <i>Papilio vertumnus pseudobogotanus</i> = <i>Parides vertumnus pseudobogotanus</i> = <i>Papilio diceros</i> f. <i>regularis</i> = <i>Papilio vertumnus diceros</i> f. <i>regularis</i> = <i>Papilio diceros</i> = <i>Papilio vertumnus inini</i> = <i>Parides erithalon inini</i> = <i>Papilio idalon</i>	(Cramer, 1779)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales jusqu'à 500 m d'altitude	Rio Claro, El Hormiguero, El Playon, Rio Caura Bolivar Venezuela , Rio Essequibo Mazaruni-Potaro, Demerara River, Rio Berbice Demerara-Berbice Guyana , Suriname , Saint-Laurent-du-Maroni, Cayenne Guyane française , Obidos Pará, Maranhão Brésil	
<i>Parides vertumnus yuracares</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>yuracares</i> = <i>Papilio vertumnus yuracares</i> = <i>Papilio vertumnus</i> f. <i>nigripalpus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp.		espèce de forêts tropicales jusqu'à 750 m d'altitude	Manú Madre de Dios Pérou , Caranavi, Mapiří La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Buenavista Santa Cruz, Chaparé, Rio Chipiriri, Villa Tunari Cochabamba Bolivie , Caceres, Rio Arinos, Rio Paraguai Mato Grosso Brésil	
<i>Pharmacophagus</i> Haase, 1891	<i>Pharmacophagus</i> Haase, 1891						
<i>Pharmacophagus antenor</i> (Drury, [1773])	<i>antenor</i> = <i>Papilio antenor</i> = <i>Papilio antenor</i> var. <i>gehleni</i> = <i>Papilio antenor</i> var. <i>albomaculata</i> = <i>Papilio antenor</i> f. <i>niger</i> = <i>Parides antenor</i>	(Drury, [1773])	Pnc: <i>Aristolochia acuminata</i>			Sud et Ouest de Madagascar	
<i>Byasa</i> Moore, 1882	<i>Byasa</i> = <i>Panosmia</i> Moore, 1882						
<i>Byasa adamsoni adamsoni</i> (Grose-Smith, 1886)	<i>adamsoni adamsoni</i> = <i>Papilio adamsoni</i> = <i>Polydorus adamsoni</i> = <i>Parides adamsoni</i> = <i>Papilio minereoides</i> = <i>Byasa minereoides</i> = <i>Atrophaneura adamsoni</i>	(Grose-Smith, 1886)				Tenasserim Sud-est du Myanmar , Chiang Mai, Nan, Phrae, Mukdahan, Chanthaburi, Phetchaburi Thaïlande , Laos, Cambodge , Bin Thuan Sud du Vietnam	
<i>Byasa adamsoni takakoe</i> Uehara, 2006	<i>takakoe</i> Uehara, 2006					Koh Samui, Surat Thani, Nakhon Sri Tammarat Sud de la Thaïlande	
<i>Byasa alcinous alcinous</i> (Klug, 1836)	<i>alcinous alcinous</i> = <i>Papilio alcinous</i> = <i>Parides alcinous alcinous</i> = <i>Papilio spathatus</i> = <i>Papilio haemotostictus</i> = <i>Tros alcinous</i> = <i>Atrophaneura alcinous</i> = <i>Papilio alcinous nagasakii</i> = <i>Papilio alcinous</i> f. <i>pacifica</i> = <i>Papilio alcinous</i> f. <i>vern. veris</i>	(Klug, 1836)	Pnc: <i>Aristolochia mandshuriensis</i>			Ouest de la Chine , Bhoutan , Sikkim, Manipur, Naga-Hills, Chin-Hills Inde , Honshu, Shikoku, Kiushiu, Tsusima island Japon	
<i>Byasa alcinous bradanus</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>bradanus</i> = <i>Parides alcinous bradanus</i> = <i>Atrophaneura alcinous bradanus</i>	(Fruhstorfer, 1908)				Ishigakijima island, Iriomotejima island, Yonagunijima island Japon	
<i>Byasa alcinous confusus</i> (Rothschild, 1895)	<i>confusus</i> = <i>Papilio alcinous menciis</i> f. <i>confusus</i> = <i>Papilio confusus</i> var. <i>decora</i> = <i>Byasa alcinous confusa</i> = <i>Papilio confusus</i> var. <i>parvummaculatus</i>	(Rothschild, 1895)	Pnc: <i>Aristolochia mandshuriensis</i>	V-VIII		Sud de l'Ussuri Russie , Taho, Tatsienkou, Wassekou Chine	
<i>Byasa alcinous loochooanus</i> (Rothschild, 1896)	<i>loochooanus</i> = <i>Papilio alcinous loochooanus</i> = <i>Papilio alcinous</i> var. <i>intermedia</i> = <i>Parides alcinous loochooanus</i> = <i>Atrophaneura alcinous loochooana</i>	(Rothschild, 1896)				Ishigaki-Sima Isles, Yayeyama, Amami isles, Loo Choo islands Okinawa isles Japon	
<i>Byasa alcinous mansonensis</i> (Fruhstorfer, 1901)	<i>mansonensis</i> = <i>Papilio alcinous mansonensis</i> = <i>Papilio alcinous</i> var. <i>nana</i> = <i>Byasa alcinous mansonensis</i> ab. <i>flaveolus</i> = <i>Byasa confusus mansonensis</i> = <i>Atrophaneura alcinous mansonensis</i>	(Fruhstorfer, 1901)	Pnc: <i>Aristolochia shimadai</i> , A. <i>ilukiensis</i> , A. <i>kankauensis</i> , A. <i>elegans</i> , A. <i>debilis</i> , A. <i>kaempferii</i> , A. <i>onoeti</i> , A. <i>tagala</i> , <i>Cocculus trilobus</i> , <i>Metaplexis chinensis</i>			Nord-est du Vietnam , Sud central et Sud-est de la Chine , Poli Taiwan	
<i>Byasa alcinous miyakoensis</i> (Omoto, 1960)	<i>miyakoensis</i> = <i>Atrophaneura alconous miyakoensis</i>	(Omoto, 1960)				Miyako isles Japon	
<i>Byasa alcinous yakushimana</i> (Esaki & Umeno, 1929)	<i>yakushimana</i> = <i>Atrophaneura alcinous yakushimana</i>	(Esaki & Umeno, 1929)				Tanegasima island, Yakushima island Japon	
<i>Byasa crassipes</i> (Oberthür, 1893)	<i>crassipes</i> = <i>Papilio crassipes</i> = <i>Polydorus crassipes</i> = <i>Parides crassipes</i> = <i>Tros crassipes</i> = <i>Atrophaneura crassipes</i>	(Oberthür, 1893)				Manipur, Sud de Shan States Nord-est de l' Inde , Myanmar , Chiang Mai Nord de la Thaïlande , Xam Neua Nord du Laos, Tam Dao Nord du Vietnam , Yunnan Chine	
<i>Byasa daemonius daemonius</i> Alphéraky, 1895	<i>daemonius daemonius</i> = <i>Papilio daemonius</i> = <i>Parides daemonius</i> = <i>Papilio alcinous plutonius</i> ab. <i>fatuus</i> = <i>Atrophaneura daemonius daemonius</i>	Alphéraky, 1895				Tibet, Montagnes de Kham, Batang, Ta-tsien-lu Chine	
<i>Byasa daemonius yunnana</i> (Oberthür, 1907)	<i>yunnana</i> = <i>Papilio daemonius</i> var. <i>yunnana</i> = <i>Papilio daemonius yunnana</i> = <i>Parides daemonius yunnana</i> = <i>Atrophaneura daemonius yunnana</i>	(Oberthür, 1907)				Tapintze Yunnan Chine	

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
Losaria coon doubledayi (Wallace, 1865)	doubledayi = <i>Papilio doubledayi</i> = <i>Papilio doubledayi</i> merguia = <i>Pachliopta coon doubledayi</i> = <i>Atrophaneura coon doubledayi</i> (Wallace, 1865) Pnc: <i>Thottea tomentosa</i> <td></td> <td>Phrae, Mukdaharn, Chanthaburi, Ranong, Nakhon Sri Thammarat, Phuket, Satun Thaïlande, Hinboun Laos, Cambodge, Vietnam, Langkawi Island, Péninsule malaise Malaisie</td>		Phrae, Mukdaharn, Chanthaburi, Ranong, Nakhon Sri Thammarat, Phuket, Satun Thaïlande , Hinboun Laos , Cambodge , Vietnam , Langkawi Island, Péninsule malaise Malaisie	
Losaria coon insperatus (Joicey & Talbot, 1921)	insperatus = <i>Papilio coon insperatus</i> = <i>Losaria coon insperata</i> = <i>Atrophaneura coon insperatus</i> (Joicey & Talbot, 1921) <td></td> <td>Hainan Chine</td>		Hainan Chine	
Losaria coon palembanganus (Rothschild, 1896)	palembanganus = <i>Papilio coon palembanganus</i> = <i>Atrophaneura coon palembanganus</i> (Rothschild, 1896) <td></td> <td>Upper Musi River, Palembang district, Sud de Sumatra Indonésie</td>		Upper Musi River, Palembang district, Sud de Sumatra Indonésie	
Losaria coon patianus (Fruhstorfer, 1898)	patianus = <i>Papilio coon patianus</i> = <i>Papilio coon</i> ab. <i>patianus</i> = <i>Atrophaneura coon patianus</i> (Fruhstorfer, 1898) <td></td> <td>North tip Java Indonésie</td>		North tip Java Indonésie	
Losaria coon sambilanga (Doherty, [1886])	sambilanga = <i>Papilio doubledaii</i> var. <i>sambilanga</i> = <i>Papilio doubledayi</i> sambilanga = <i>Atrophaneura coon sambilanga</i> (Doherty) <td></td> <td>Nicobars Inde</td>		Nicobars Inde	
Losaria neptunus dacasini (Schröder, 1976)	neptunus dacasini = <i>Pachliopta neptunus dacasini</i> = <i>Balignina neptunus dacasini</i> = <i>Atrophaneura neptunus dacasini</i> (Schröder, 1976) <td></td> <td>Palawan Philippines</td>		Palawan Philippines	
Losaria neptunus creber (van Eecke, 1914)	creber = <i>Papilio neptunus creber</i> = <i>Atrophaneura neptunus creber</i> (van Eecke, 1914) <td></td> <td>Sinabang, Sibigo</td>		Sinabang, Sibigo	
Losaria neptunus doris (Rothschild, 1908)	doris = <i>Papilio neptunus doris</i> = <i>Atrophaneura neptunus doris</i> (Rothschild, 1908) <td></td> <td>Nord de Borneo Malaisie, Brunei</td>		Nord de Borneo Malaisie , Brunei	
Losaria neptunus fehri (Honrath, 1892)	fehri = <i>Papilio neptunus</i> var. <i>fehri</i> = <i>Papilio neptunus</i> fehri = <i>Atrophaneura neptunus fehri</i> (Honrath, 1892) <td></td> <td>Nias Indonésie</td>		Nias Indonésie	
Losaria neptunus manasukkiti Cotton, Racheli & Sukhumalind,2005	manasukkiti Cotton, Racheli & Sukhumalind,2005 <td></td> <td>Sud du Myanmar, Kam Phuan, Muang Chone, Khlong Naka, Khao Pawta Ranong Province Sud de la Thaïlande</td>		Sud du Myanmar , Kam Phuan, Muang Chone, Khlong Naka, Khao Pawta Ranong Province Sud de la Thaïlande	
Losaria neptunus matbai Schröder & Treadaway, 1990	matbai = <i>Pachliopta neptunus matbai</i> = <i>Balignina neptunus matbai</i> = <i>Atrophaneura neptunus matbai</i> Schröder & Treadaway, 1990 <td></td> <td>Tawi-tawi, Sulu Archipel Philippines</td>		Tawi-tawi, Sulu Archipel Philippines	
Losaria neptunus neptunus (Guérin-Ménéville, 1840)	neptunus = <i>Papilio neptunus</i> = <i>Parides neptunus</i> = <i>Balignina neptunus</i> = <i>Polydorus neptunus</i> = <i>Papilio thetys</i> = <i>Parides neptunus neptunus</i> = <i>Atrophaneura neptunus neptunus</i> (Guérin-Ménéville, 1840) Pnc: <i>Thottea, Aristolochia</i> <td></td> <td>Sud de la Birmanie, Trang, Nakhon Sri Thammarat, Yala Sud de la Thaïlande, Langkawi Island, Penang Péninsule malaise Malaisie</td>		Sud de la Birmanie , Trang, Nakhon Sri Thammarat, Yala Sud de la Thaïlande , Langkawi Island, Penang Péninsule malaise Malaisie	
Losaria neptunus padanganus (Rothschild, 1908)	padanganus = <i>Papilio neptunus padanganus</i> = <i>Atrophaneura neptunus padanganus</i> (Rothschild, 1908) <td></td> <td>Simeulue Island, Ouest et Sud de Sumatra Indonésie</td>		Simeulue Island, Ouest et Sud de Sumatra Indonésie	
Losaria neptunus siborangitana Tsukada & Nishiyama, 1980	siborangitana = <i>Pachliopta neptunus siborangitana</i> = <i>Atrophaneura neptunus siborangitana</i> Tsukada & Nishiyama, 1980 <td></td> <td>Bandar Baru, Nord de Sumatra Indonésie</td>		Bandar Baru, Nord de Sumatra Indonésie	
Losaria neptunus sumatra (Hagen, 1894)	sumatrana = <i>Papilio neptunus</i> var. <i>sumatrana</i> = <i>Atrophaneura neptunus sumatrana</i> (Hagen, 1894) <td></td> <td>Nord de Sumatra Indonésie</td>		Nord de Sumatra Indonésie	
Losaria palu (Martin, 1912)	palu = <i>Papilio palu</i> = <i>Atrophaneura palu</i> = <i>Parides palu</i> (Martin, 1912) <td></td> <td>Palu district Centre du Sulawesi Indonésie</td>		Palu district Centre du Sulawesi Indonésie	
Losaria rhodifer (Butler, 1876)	rhodifer = <i>Papilio rhodifer</i> = <i>Atrophaneura rhodifer</i> = <i>Parides rhodifer</i> = <i>Pachliopta rhodifer</i> (Butler, 1876) Pnc: <i>Thottea tomentosa</i> <td>Rare</td> <td>Andamans islands Inde</td>	Rare	Andamans islands Inde	
Pachliopta Reakirt, [1865]	Pachliopta = Pachlioptera = Polydorus = Tros	Reakirt, [1865]		
Pachliopta adamas adamas (Zinken, 1831)	adamas adamas = <i>Papilio adamas</i> = <i>Papilio polydorus adamas</i> = <i>Pachliopta aristolochiae adamas</i> = <i>Atrophaneura adamas</i> (Zinken, 1831) <td></td> <td>Enganno, Java, Kangean, Bawean, Bali à Flores Indonésie</td>		Enganno, Java, Kangean, Bawean, Bali à Flores Indonésie	
Pachliopta adamas agricola Tsukada & Nishiyama, 1980	agricola = <i>Atrophaneura adamas agricola</i> Tsukada & Nishiyama, 1980 <td></td> <td>Tanahjampea Indonésie</td>		Tanahjampea Indonésie	
Pachliopta antiphus acuta (Druce, 1873)	antiphus acuta = <i>Papilio acuta</i> = <i>Papilio aristolochiae acutus</i> = <i>Papilio aristolochiae poseidippus</i> = <i>Pachliopta aristolochiae poseidippus</i> = <i>Atrophaneura antiphus acuta</i> (Druce, 1873) <td></td> <td>Mapun, Tawi-tawi, Sanga Sanga, Sibutu, Basilan Philippines</td>		Mapun, Tawi-tawi, Sanga Sanga, Sibutu, Basilan Philippines	
Pachliopta antiphus antiphulus (Fruhstorfer, 1904)	antiphulus = <i>Papilio aristolochiae antiphulus</i> = <i>Atrophaneura antiphus antiphulus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae antiphulus</i> (Fruhstorfer, 1904) <td></td> <td>Sulu, Jolo Philippines</td>		Sulu, Jolo Philippines	
Pachliopta antiphus antiphus (Fabricius, 1793)	antiphus = <i>Papilio antiphus</i> = <i>Papilio aristolochiae antiphus</i> = <i>Pachliopta aristolochiae antiphus</i> = <i>Papilio aristolochiae kameiros</i> = <i>Pachliopta antiphus</i> = <i>Atrophaneura antiphus antiphus</i> (Fabricius, 1793) Pnc: <i>Aristolochia</i> <td></td> <td>Sumatra, Nias, Natuna Island, Borneo, Tanahjampea Indonésie</td>		Sumatra, Nias, Natuna Island, Borneo, Tanahjampea Indonésie	
Pachliopta antiphus brevicauda (Staudinger, 1889)	brevicauda = <i>Papilio antiphus</i> var. <i>acuta</i> ab. <i>brevicauda</i> = <i>Papilio aristolochiae acutus</i> ab. <i>periphus</i> = <i>Pachliopta antiphus yoshikoe</i> = <i>Atrophaneura antiphus brevicauda</i> (Staudinger, 1889) <td></td> <td>Calamian, Busuanga, Cuyo, Dumarán, Palawan Philippines</td>		Calamian, Busuanga, Cuyo, Dumarán, Palawan Philippines	
Pachliopta antiphus elioti Page & Treadaway, 1995	elioti = <i>Atrophaneura antiphus elioti</i> Page & Treadaway, 1995 <td></td> <td>Bud Siasi, Siasi island Philippines</td>		Bud Siasi, Siasi island Philippines	
Pachliopta aristolochiae adaeus (Rothschild, 1908)	aristolochiae adaeus = <i>Papilio aristolochiae adaeus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae adaeus</i> (Rothschild, 1908) <td></td> <td>Ouest et Est de la chine</td>		Ouest et Est de la chine	
Pachliopta aristolochiae antissa (Jordan, 1908)	antissa = <i>Papilio aristolochiae antissa</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae antissa</i> (Jordan, 1908) <td></td> <td>Kangean island Indonésie</td>		Kangean island Indonésie	
Pachliopta aristolochiae aristolochiae (Fabricius, 1775)	aristolochiae = <i>Papilio aristolochiae</i> = <i>Polydorus aristolochiae</i> = <i>Papilio diphilus</i> = <i>Tros aristolochiae</i> = <i>Pachlioptera aristolochiae</i> = <i>Papilio aristolochiae formosensis</i> = <i>Papilio aristolochiae aphrodite</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae aristolochiae</i> (Fabricius, 1775) Pnc: <i>Thottea tomentosa</i> <td>Copié par <i>Papilio polytes f. pammon</i></td> <td>Inde</td>	Copié par <i>Papilio polytes f. pammon</i>	Inde	
Pachliopta aristolochiae asteris (Rothschild, 1908)	asteris = <i>Papilio aristolochiae asteris</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae asteris</i> (Rothschild, 1908) Pnc: <i>Aristolochia tagala</i> <td></td> <td>Ranong, Nakhon Sri Thamarat, Satun, Yala Thaïlande, Langkawi island, Péninsule malaise, Tioman, Aur Island Malaisie, Singapour</td>		Ranong, Nakhon Sri Thamarat, Satun, Yala Thaïlande , Langkawi island, Péninsule malaise, Tioman, Aur Island Malaisie , Singapour	
Pachliopta aristolochiae atavus Jan J.M. Moonen, 2016	atavus Jan J.M. Moonen, 2016 <td></td> <td>Bunguran Indonésie</td>		Bunguran Indonésie	
Pachliopta aristolochiae austrosundanus (Rothschild, 1895)	austrosundanus = <i>Papilio aristolochiae austrosundanus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae austrosundanus</i> (Rothschild, 1895) <td></td> <td>Sumbawa Indonésie</td>		Sumbawa Indonésie	
Pachliopta aristolochiae balinus (Fruhstorfer, 1908)	balinus = <i>Papilio aristolochiae balinus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae balinus</i> (Fruhstorfer, 1908) <td></td> <td>Bali Indonésie</td>		Bali Indonésie	
Pachliopta aristolochiae camorta (Moore, 1877)	camorta = <i>Papilio aristolochiae</i> var. <i>camorta</i> = <i>Papilio aristolochiae camorta</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae camorta</i> (Moore, 1877) <td></td> <td>Nicobar Island Inde</td>		Nicobar Island Inde	
Pachliopta aristolochiae ceylonica (Moore, 1881)	ceylonica = <i>Menelades ceylonicus</i> = <i>Papilio aristolochiae</i> ab. <i>ceylonicus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae ceylonica</i> (Moore, 1881) <td></td> <td>Sri Lanka</td>		Sri Lanka	

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018			
<i>Pachliopta aristolochiae floresianus</i> (Rothschild, 1908)	<i>floresianus</i> = <i>Papilio aristolochiae floresianus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae floresianus</i>	= (Rothschild, 1908)		Flores Indonésie
<i>Pachliopta aristolochiae goniopeltis</i> (Rothschild, 1908)	<i>goniopeltis</i> = <i>Papilio aristolochiae goniopeltis</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae goniopeltis</i>	(Rothschild, 1908)		Tenasserim Myanmar, Mae Hong Son, Chiang Mai, Nan, Sakhon Nakhon, Chanthaburi Thaïlande, Hinboun Laos, Cambodge, Lam Dong Vietnam, îles Andamans Inde, Hong Kong
<i>Pachliopta aristolochiae interpositus</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>interpositus</i> = <i>Papilio aristolochiae interpositus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae interposita</i>	(Fruhstorfer, 1904)	Pnc: <i>Aristolochia shimadai</i> , <i>A. kankauensis</i> , <i>A. cucubaifolia</i> , <i>A. kaol</i> , <i>A. elegans</i> , <i>A. tagala</i> , <i>A. Iukiuensis</i> , <i>A. fordiana</i> , <i>Thottea</i> sp.	ET Taiwan, Batanes Island Philippines, Amami isles, Okinawa isles, Miyako isles, Iriomotejima island, Ishigakijima island Japon
<i>Pachliopta aristolochiae jemajensis</i> Hanafusa, 1989	<i>jemajensis</i> Hanafusa, 1989			Letung, Jemaja island, Kep. Anambas Indonésie
<i>Pachliopta aristolochiae kondulana</i> (Evans, 1932)	<i>kondulana</i> = <i>Tros aristolochiae kondulana</i> = <i>Atrophaneura aristolochia kondulana</i>	(Evans, 1932)		Nicobars Isles Inde
<i>Pachliopta aristolochiae lombockensis</i> Rothschild, 1896	<i>lombockensis</i> = <i>Papilio aristolochiae lombockensis</i> = <i>Papilio aristolochiae lombockensis</i> f. askra = <i>Pachliopta adamas lombockensis</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae lombockenis</i>	Rothschild, 1896		Lombok Indonésie
<i>Pachliopta aristolochiae mamilius</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>mamilius</i> = <i>Papilio aristolochiae mamilius</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae mamilius</i>	(Fruhstorfer, 1908)		Engano Indonésie
<i>Pachliopta aristolochiae probus</i> (Fruhstorfer, 1911)	<i>probus</i> = <i>Papilio aristolochiae probus</i> = <i>Pachliopta adamas probus</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae probus</i>	(Fruhstorfer, 1911)		Bawean Indonésie
<i>Pachliopta aristolochiae sawi</i> (Evans, 1932)	<i>rhodopis</i> = <i>Papilio aristolochiae rhodopis</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae rhodopis</i>	(Rothschild, 1908)		Ryukyu islands Japon
	<i>sawi</i> = <i>Tros aristolochiae sawi</i> = <i>Atrophaneura aristolochiae sawi</i>	(Evans, 1932)		Nicobars Isles Inde
<i>Pachliopta atropos</i> (Staudinger, 1888)	<i>atropos</i> = <i>Papilio atropos</i> = <i>Papilio antiphus</i> var. <i>atropos</i> = <i>Pachlioptera atropos</i> = <i>Atrophaneura atropos</i>	(Staudinger, 1888)		Palawan, Busuanga, Balabac Philippines
<i>Pachliopta hector</i> (Linnaeus, 1758)	<i>hector</i> = <i>Papilio hector</i> = <i>Menelaides hector</i> = <i>Tros hector</i> = <i>Atrophaneura hector</i> = <i>Papilio hector heroicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Copié par <i>Papilio polytes f. romulus</i>	Bengale, Sud de Bihar, Orissa, Kerala Sud de l'Inde, Sri Lanka
<i>Pachliopta jophon</i> (Gray, [1853])	<i>jophon</i> = <i>Papilio jophon</i> = <i>Menelaides jophon</i> = <i>Tros jophon</i> = <i>Atrophaneura jophon</i> = <i>Pachlioptera jophon</i>	(Gray, [1853])		Sri Lanka, Ouest de Ghats Inde
<i>Pachliopta kotzebuea bilara</i> Page & Treadaway, 1995	<i>kotzebuea bilara</i> = <i>Pachliopta kotzebuea bilara</i> = <i>Atrophaneura kotzebuea bilara</i>	Page & Treadaway, 1995		Bilar, Bohol, Cebu Philippines
<i>Pachliopta kotzebuea calatangensis</i> Page & Treadaway, 2011	<i>calatangensis</i>	Page & Treadaway, 2011		? Philippines
<i>Pachliopta kotzebuea deseilus</i> (Fruhstorfer, 1911)	<i>deseilus</i> = <i>Papilio aristolochiae deseilus</i> = <i>Pachliopta aristolochiae deseilus</i> = <i>Atrophaneura kotzebuea deseilus</i>	(Fruhstorfer, 1911)		Mindoro, Marinduque, Masbate, Ticao, Panay, Negros, Sibuyan island Philippines
<i>Pachliopta kotzebuea kotzebuea</i> (Eschscholtz, 1821)	<i>kotzebuea</i> = <i>Papilio kotzebuea</i> = <i>Papilio antiphus kotzebueae</i> = <i>Pachliopta kotzebuea</i> = <i>Papilio aristolochiae kotzebueus</i> = <i>Atrophaneura kotzebuea kotzebuea</i>	(Eschscholtz, 1821)	Pnc: <i>Aristolochia</i>	Ouest et centre de Luzon Philippines
<i>Pachliopta kotzebuea mataconga</i> Page & Treadaway, 1995	<i>mataconga</i> = <i>Atrophaneura kotzebuea mataconga</i>	Page & Treadaway, 1995		San Pablo, Sud de Luzon Philippines
<i>Pachliopta kotzebuea nishiyamai</i> Fujioka, 1997	<i>nishiyamai</i> = <i>Pachliopta aristolochiae nushiyamai</i> = <i>Pachliopta kotzebuea asina</i>	Fujioka, 1997		Philippines
<i>Pachliopta kotzebuea philippus</i> (Semper, 1891)	<i>philippus</i> = <i>Papilio aristolochiae</i> var. <i>philippus</i> = <i>Menelaides aristolochiae</i> var. <i>philippus</i> = <i>Papilio aristolochiae philippus</i> = <i>Pachliopta aristolochiae philippus</i> = <i>Atrophaneura kotzebuea philippus</i>	(Semper, 1891)		Samar, Leyte, Dinagar, Mindanao, Panaon, Camiguin de Mindanao, Siargao, Homonhan, Sarangani Philippines
<i>Pachliopta kotzebuea tindongana</i> Page & Treadaway, 1995	<i>tindongana</i> = <i>Pachliopta kotzebuea tindongani</i> = <i>Atrophaneura kotzebuea tindongana</i>	Page & Treadaway, 1995		Sulong River, Sierra Madre Nord-est de Luzon, Babuyanes Philippines
<i>Pachliopta leytensis</i> (Murayama, 1978)	<i>leytensis</i> = <i>Pachliopta phegeus leytensis</i> = <i>Papilio phegeus</i> = <i>Atrophaneura buracki</i> = <i>Pachliopta phegeus</i> = <i>Pachlioptera phegeus</i> = <i>Atrophaneura leytensis</i>	(Murayama, 1978)		Bohol, Cebu, Dinagat, Sud de Leyte, Mindanao, Panaon, Samar, Siargao, Luzon Philippines
<i>Pachliopta liris aberrans</i> (Butler, 1883)	<i>liris aberrans</i> = <i>Papilio aberrans</i> = <i>Papilio liris</i> ab. <i>aberrans</i> = <i>Papilio liris aberrans</i> = <i>Atrophaneura liris aberrans</i>	(Butler, 1883)		Larat Timor
<i>Pachliopta liris deridderi</i> Neukirchen, 1992	<i>deridderi</i> = <i>Pachliopta liris deridderi</i>	Neukirchen, 1992		Serua island, Barat-Daya Group Indonésie
<i>Pachliopta liris gaetus</i> Fruhstorfer, 1908	<i>gaetus</i> = <i>Papilio liris gaetus</i> = <i>Pachliopta liris gaetus</i> = <i>Papilio liris gaetus</i> f. <i>pseudoliris</i> = <i>Papilio liris savuanus</i> ? = <i>Atrophaneura liris gaetus</i>	Fruhstorfer, 1908		Savu Island Indonésie
<i>Pachliopta liris liris</i> (Godart, 1819)	<i>liris</i> = <i>Papilio liris</i> = <i>Pachliopta liris</i> = <i>Pachlioptera liris</i> = <i>Papilio liris damaricus</i> = <i>Papilio liris vellicatus</i> = <i>Atrophaneura liris liris</i>	(Godart, 1819)		Timor, Damar, Roma island Indonésie, Nord-ouest de l'Australie?
<i>Pachliopta liris pallidus</i> (Rothschild, 1895)	<i>pallidus</i> = <i>Papilio liris pallidus</i> = <i>Atrophaneura liris pallidus</i>	(Rothschild, 1895)		Leti, Moa, Leti Island Group, Tanimbar Indonésie
<i>Pachliopta liris senescens</i> (Röber, 1891)	<i>senescens</i> = <i>Papilio liris</i> var. <i>senescens</i> = <i>Papilio liris senescens</i> = <i>Atrophaneura liris senescens</i>	(Röber, 1891)		Kisser
<i>Pachliopta liris wetterensis</i> (Rothschild, 1895)	<i>wetterensis</i> = <i>Papilio liris wetterensis</i> = <i>Atrophaneura liris wetterensis</i>	(Rothschild, 1895)		Wetar Island Indonésie
<i>Pachliopta mariae almae</i> (Semper, 1891)	<i>mariae almae</i> = <i>Papilio almae</i> = <i>Menelaides almae</i> = <i>Papilio mariae almae</i> = <i>Atrophaneura mariae almae</i>	(Semper, 1891)		Centre-est de Luzon, Polillo Philippines
<i>Pachliopta mariae camarines</i> (Schröder & Treadaway, 1978)	<i>camarines</i> = <i>Atrophaneura mariae camarines</i>	(Schröder & Treadaway, 1978)		Mt. Labo, Camarines Norte, Sud-est de Luzon Philippines
<i>Pachliopta mariae mariae</i> (Semper, 1878)	<i>mariae</i> = <i>Papilio mariae</i> = <i>Pachlioptera mariae</i> = <i>Pachliopta mariae</i> = <i>Atrophaneura mariae mariae</i>	(Semper, 1878)		Bohol, Cebu, Leyte, Mindanao, Panaon, Samar Philippines
<i>Pachliopta oreon</i> (Doherty, 1891)	<i>oreon</i> = <i>Papilio oreon</i> = <i>Menelaides oreon</i> = <i>Pachliopta oreon</i> = <i>Papilio godmani</i> = <i>Atrophaneura oreon</i>	(Doherty, 1891)		Sumba Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT août 2018		
<i>Pachliopta pandiyana</i> (Moore, 1881)	<i>pandiyana</i> (Moore, 1881) = <i>Papilio pandiyana</i> = <i>Papilio pandyanus</i> = <i>Polydorus lyphon pandiyana</i> = <i>Atrophaneura pandiyana</i> = <i>Pachloptera pandiyana</i>	Trivandrum, Kerala Sud de l'Inde
<i>Pachliopta phlegon</i> (C. & R. Felder, 1864)	<i>phlegon</i> (C. & R. Felder, 1864) = <i>Papilio phlegon</i> = <i>Papilio annae phlegon</i> = <i>Pachliopta annae phlegon</i> = <i>Atrophaneura phlegon</i>	Pnc: <i>Aristolochia</i> Ouest de Mindanao, Basilan Philippines
<i>Pachliopta polydorus aignanus</i> Rothschild, 1898	<i>polydorus aignanus</i> Rothschild, 1898 = <i>Papilio polydorus aignanus</i> = <i>Atrophaneura polydorus aignanus</i>	Saint Aignan Louisiades Islands Papousie-Nouvelle-guinée
<i>Pachliopta polydorus alboplagatus</i> (Joicey & Talbot, 1922)	<i>alboplagatus</i> (Joicey & Talbot, 1922) = <i>Papilio polydorus alboplagatus</i> = <i>Atrophaneura polydorus alboplagatus</i>	Sula Island Indonésie
<i>Pachliopta polydorus ackeryi</i> Fujioka, 1997	<i>ackeryi</i> Fujioka, 1997	Biak Indonésie
<i>Pachliopta polydorus aphnitis</i> (Fruhstorfer, 1913)	<i>aphnitis</i> (Fruhstorfer, 1913) = <i>Papilio polydorus aphnitis</i> = <i>Papilio polydorus aphnits</i> = <i>Atrophaneura polydorus aphnitis</i>	Goodenough Island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus asinius</i> (Fruhstorfer, 1904)	<i>asinus</i> (Fruhstorfer, 1904) = <i>Papilio polydorus asinius</i> = <i>Atrophaneura polydorus asinius</i>	Waigeu, Est de la Nouvelle-Guinée Indonésie
<i>Pachliopta polydorus auster</i> (van Eecke, 1915)	<i>auster</i> (van Eecke, 1915) = <i>Papilio polydorus auster</i> = <i>Atrophaneura polydorus auster</i>	Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus ceramites</i> (Fruhstorfer, 1915)	<i>ceramites</i> (Fruhstorfer, 1915) = <i>Papilio polydorus ceramites</i> = <i>Atrophaneura polydorus ceramites</i>	Kapaur, Ouest Irian Nouvelle Guinée Indonésie
<i>Pachliopta polydorus dampierensis</i> (Hagen, 1897)	<i>dampierensis</i> (Hagen, 1897) = <i>Papilio polydorus dampierensis</i> = <i>Atrophaneura polydorus dampierensis</i>	Dampier Island Australie
<i>Pachliopta polydorus godartianus</i> (Lucas, 1852)	<i>godartianus</i> (Lucas, 1852) = <i>Papilio godartianus</i> = <i>Papilio polydorus godartianus</i> ab. <i>plagiatus</i> = <i>Papilio polydorus plagiatus</i> = <i>Papilio polydorus godartianus</i> = <i>Atrophaneura polydorus godartianus</i>	Arfak, Peninsula Onin Indonésie, Stephansort Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus humboldti</i> (Rothschild, 1908)	<i>humboldtii</i> (Rothschild, 1908) = <i>Papilio polydorus humboldti</i> = <i>Atrophaneura polydorus humboldti</i>	Humboldt Bay Nouvelle Guinée Indonésie
<i>Pachliopta polydorus kajelanus</i> (Fruhstorfer, 1899)	<i>kajelanus</i> (Fruhstorfer, 1899) = <i>Papilio polydorus kajelanus</i> = <i>Atrophaneura polydorus kajelanus</i>	Kajeli, Buru Indonésie
<i>Pachliopta polydorus lascarus</i> Fruhstorfer, 1913	<i>lascarus</i> Fruhstorfer, 1913 = <i>Papilio polydorus lascarus</i> = <i>Atrophaneura polydorus lascarus</i>	Finschhafen Nord-est de la Nouvelle-Guinée Indonésie
<i>Pachliopta polydorus leodamas</i> (Wallace, 1865)	<i>leodamas</i> (Wallace, 1865) = <i>Papilio leodamas</i> = <i>Papilio polydorus neodamas</i> = <i>Atrophaneura polydorus leodamas</i>	Misool Indonésie
<i>Pachliopta polydorus mamberanus</i> (Toxopeus, 1950)	<i>mamberanus</i> (Toxopeus, 1950) = <i>Papilio polydorus mamberanus</i> = <i>Atrophaneura polydorus mamberanus</i>	Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus manus</i> (Talbot, 1932)	<i>manus</i> (Talbot, 1932) = <i>Papilio polydorus manus</i> = <i>Atrophaneura polydorus manus</i>	Manus Îles de l'Amirauté Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus meforanus</i> (Rothschild, 1908)	<i>meforanus</i> (Rothschild, 1908) = <i>Papilio polydorus meforanus</i> = <i>Atrophaneura polydorus meforanus</i>	Noemfoor Island, Geelvink Bay Papouasie Indonésie
<i>Pachliopta polydorus naissus</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>naissus</i> (Fruhstorfer, 1908) = <i>Papilio polydorus naissus</i> = <i>Papilio polydorus albosignatus</i> = <i>Papilio polydoru phalces?</i> = <i>Atrophaneura polydorus naissus</i>	Milne Bay, Collingwood Bay, Trobriand Island, Fergusson, D'Entrecasteaux Island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus novobritannicus</i> (Rothschild, 1895)	<i>novobritannicus</i> (Rothschild, 1895) = <i>Papilio polydorus novobritannicus</i> = <i>Atrophaneura polydorus novobritannicus</i> = <i>Pachliopta polydorus novobritannicus</i>	Nouvelle Bretagne Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus orinomus</i> (Rothschild, 1895)	<i>orinomus</i> (Rothschild, 1895) = <i>Papilio polydorus orinomus</i> = <i>Atrophaneura polydorus orinomus</i>	Aroa River Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus polydaemon</i> (Mathew, 1887)	<i>polydaemon</i> (Mathew, 1887) = <i>Papilio polydaemon</i> = <i>Papilio polypemon</i> = <i>Pachliopta polydorus polypemon</i> = <i>Papilio polydorus polydaemon</i> = <i>Atrophaneura polydorus polydaemon</i>	Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée, Shortland Island, Guadalcanal Îles Salomon
<i>Pachliopta polydorus polydorus</i> (Linnaeus, 1763)	<i>polydorus</i> (Linnaeus, 1763) = <i>Papilio polydorus</i> = <i>Papilio leobotes</i> = <i>Papilio iris navigator</i> = <i>Papilio polydorus volupitilis</i> = <i>Pachliopta polydorus</i> = <i>Pachlioptera polydorus</i> = <i>Papilio polydorus polydorus</i> = <i>Atrophaneura polydorus polydorus</i>	Pnc: <i>Aristolochia elegans</i> , <i>A. tagala</i> , <i>A. thozetii</i> , <i>A. deltantha?</i> Ambon, Ceram, Obi, Babar Indonésie
<i>Pachliopta polydorus queenslandicus</i> (Rothschild, 1895)	<i>queenslandicus</i> (Rothschild, 1895) = <i>Papilio polydorus queenslandicus</i> = <i>Atrophaneura polydorus queenslandicus</i>	Thursday Island, Torres Strait Island, Queensland Australie
<i>Pachliopta polydorus schoutensis</i> (Joicey & Talbot, 1924)	<i>schoutensis</i> (Joicey & Talbot, 1924) = <i>Papilio polydorus schoutensis</i> = <i>Atrophaneura polydorus schoutensis</i>	Schouten island Australie
<i>Pachliopta polydorus septentrionalis</i> (Rothschild, 1895)	<i>septentrionalis</i> (Rothschild, 1895) = <i>Papilio polydorus septentrionalis</i> = <i>Atrophaneura polydorus septentrionalis</i>	Bachan, Halmahera Moluques Indonésie
<i>Pachliopta polydorus tenimberensis</i> (Rothschild, 1895)	<i>tenimberensis</i> (Rothschild, 1895) = <i>Papilio polydorus tenimberensis</i> = <i>Atrophaneura polydorus tenimberensis</i>	Tanimbar Islands Indonésie
<i>Pachliopta polydorus thessalia</i> (Swinhoe, 1893)	<i>thessalia</i> (Swinhoe, 1893) = <i>Meneleides thessalia</i> = <i>Papilio polydorus thessalia</i> = <i>Atrophaneura polydorus thessalia</i>	Key Island Indonésie
<i>Pachliopta polydorus tsukadai</i> Fujioka, 1997	<i>tsukadai</i> Fujioka, 1997 = <i>Pachliopta polydorus varus</i> = <i>Atrophaneura polydorus varus</i>	Aru Indonésie
<i>Pachliopta polydorus utuanensis</i> (Ribbe, 1898)	<i>utuanensis</i> (Ribbe, 1898) = <i>Papilio polydorus var. utuanensis</i> = <i>Atrophaneura polydorus utuanensis</i>	Nouvelle Irlande, Duke-of-York island Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Pachliopta polydorus vulcanicus</i> (Rothschild, 1915)	<i>vulcanicus</i> (Rothschild, 1915) = <i>Papilio polydorus vulcanicus</i> = <i>Atrophaneura polydorus vulcanicus</i>	Vulcan Islands Australie
<i>Pachliopta polydorus wangaarensis</i> (Joicey & Talbot, 1924)	<i>wangaarensis</i> (Joicey & Talbot, 1924) = <i>Papilio polydorus wangaarensis</i> = <i>Atrophaneura polydorus wangaarensis</i>	Wangaar River, Geelvink Bay, Irian Jaya Indonésie
<i>Pachliopta polyphontes aipytos</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>polyphontes aipytos</i> (Fruhstorfer, 1908) = <i>Papilio polyphontes aipytos</i> = <i>Papilio polyphontes pedias</i> = <i>Atrophaneura polyphontes aipytos</i>	Peleng Îles Banggai, Taliabu, Mangole, Sanana Îles Sula, Kasiruta? Indonésie
<i>Pachliopta polyphontes bugius</i> (Ney, 1911)	<i>bugius</i> (Ney, 1911) = <i>Papilio polyphontes var. bugius</i> = <i>Atrophaneura polyphontes bugius</i>	Sud du Sulawesi Indonésie
<i>Pachliopta polyphontes polyphontes</i> (Boisduval, 1836)	<i>polyphontes</i> (Boisduval, 1836) = <i>Papilio polyphontes</i> = <i>Papilio polyphontes ingonus</i> = <i>Pachliopta polyphontes</i> = <i>Pachlioptera polyphontes</i> = <i>Papilio polyphontes phanocles</i> = <i>Atrophaneura polyphontes polyphontes</i>	Pnc: <i>Aristolochia</i> Sulawesi, Buton, Kabaena, Muna, Wowoni islands, Sangihe, Talaud Indonésie
<i>Pachliopta polyphontes rosea</i> (Oberthür, 1879)	<i>rosea</i> (Oberthür, 1879) = <i>Papilio polyphontes var. rosea</i> = <i>Papilio polyphontes</i> ab. <i>roseus</i> = <i>Atrophaneura polyphontes rosea</i>	Selayar Indonésie

Auteur: Dominiek PRUVOT	août 2018	
<i>Pachliopta polyphontes sejanus</i> (Fruhstorfer, 1908)	<i>sejanus</i> <i>= Papilio poypfontes sejanus</i> <i>= Papilio polyphontes thacus?</i> <i>= Atrophaneura polyphontes sejanus</i> (Fruhstorfer, 1908)	Bachan, Halmahera, Ternate, Morotai Moluques Indonésie
<i>Pachliopta schadenbergi micholtzi</i> (Semper, 1891)	<i>schadenbergi micholtzi</i> <i>= Papilio schadenbergi var. micholtzi</i> <i>= Menelaides schadenbergi var. micholtzi</i> <i>= Papilio schadenbergi micholtzi</i> <i>= Atrophaneura schadenbergi micholtzi</i> (Semper, 1891)	Camiguin de Luzon, Nord-est de Luzon Philippines
<i>Pachliopta schadenbergi schadenbergi</i> (Semper, 1891)	<i>schadenbergi</i> <i>= Papilio schadenbergi</i> <i>= Pachliopta schadenbergi</i> <i>= Atrophaneura schadenbergi schadenbergi</i> (Semper, 1891)	Centre et Nord-ouest de Luzon Philippines
<i>Pachliopta strandi elizabethae</i> Page & Treadaway, 1997	<i>strandi elizabethi</i> <i>= Atrophaneura strandi elizabethi</i> Page & Treadaway, 1997	Mt. Malindog, Aklan Panay, Guimaras Philippines
<i>Pachliopta strandi marinduquensis</i> Page & Treadaway, 1997	<i>marinduquensis</i> <i>= Atrophaneura strandi marinduquensis</i> Page & Treadaway, 1997	Binunga Marinduque Philippines
<i>Pachliopta strandi noelmohagani</i> Page & Treadaway, 2011	<i>noelmohagani</i> Page & Treadaway, 2011	
<i>Pachliopta strandi nuydaorum</i> Page & Treadaway, 1997	<i>nuydaorum</i> <i>= Atrophaneura strandi nuydaorum</i> Page & Treadaway, 1997	Tanay, Centre-ouest de Luzon Philippines
<i>Pachliopta strandi splendida</i> Schröder & Treadaway, 1984	<i>splendida</i> <i>= Pachliopta phlegon splendida</i> <i>= Atrophaneura strandi splendida</i> Schröder & Treadaway, 1984	Jao Asan, Sibuyan Philippines
<i>Pachliopta strandi strandi</i> (Bryk, 1930)	<i>strandi</i> <i>= Papilio strandi</i> <i>= Pachliopta strandi</i> <i>= Papilio annae</i> <i>= Pachliopta annae</i> <i>= Atrophaneura strandi strandi</i> (Bryk, 1930)	Mindoro Philippines
<i>Troides</i> Hübner, [1819]	<i>Troides = Amphrisius = Ripponia = Haugumia</i> Hübner, [1819]	
	<i>Sous-genre : Ripponia</i> Haugum, 1975	
	<i>Groupe des hypolitus</i>	
<i>Troides (Ripponia) hypolitus antiopa</i> Rothschild, 1908	<i>hypolitus antiopa</i> Rothschild, 1908	Morotai, Halmahera, Ternate Indonésie
<i>Troides (Ripponia) hypolitus bachanensis</i> Okanao & Okhura, 1978	<i>bachanensis</i> Okanao & Okhura, 1978	Bachan Indonésie
<i>Troides (Ripponia) hypolitus caelicola</i> Haugum & Low, 1982	<i>caelicola</i> Haugum & Low, 1982	Peleng, Poutil-besar Banggai isles Indonésie
<i>Troides (Ripponia) hypolitus cellularis</i> Rothschild, 1895	<i>cellularis</i> <i>= Papilio remus</i> <i>= Ornithoptera hippolytus var. celebensis</i> Rothschild, 1895	Sulawesi, Buton island, Kabaena Island, Talaud Island, Togian, Muna, Tukangbesi, Selayar, Sangihe island Indonésie
<i>Troides (Ripponia) hypolitus hypolitus</i> (Cramer, [1775])	<i>hypolitus</i> <i>= Papilio hypolitus</i> <i>= Papilio hypolitus hypolitus</i> (Cramer, [1775])	Buru, Seram, Ambon Moluques Indonésie
<i>Troides (Ripponia) hypolitus sulaensis</i> (Staudinger, 1895)	<i>sulaensis</i> <i>= Ornithoptera hippolytus var. sulaensis</i> <i>= Ripponia hypolitus sulaensis f.m. sulaensis</i> <i>= Ripponia hypolitus sulaensis f.m. flavoabdominalis</i> <i>= Ripponia hypolitus sulaensis f.m. alboabdominalis</i> <i>= Ripponia hypolitus sulaensis f.f. semimacula</i> (Staudinger, 1895)	Taliabu, Mangole, Sanana Sula Isles Indonésie
	<i>Sous-genre : Troides = Amphrisius = Haugumia</i> Hübner, [1819]	
	<i>Groupe des amphrysus</i>	
<i>Troides (Troides) amphrysus actinotia</i> (Jordan, 1908)	<i>amphrysus actinotia</i> <i>= Papilio amphrysus acinotia</i> <i>= Troides amphrysus andrewel</i> (Jordan, 1908)	Bontang Est de Kalimantan Borneo Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus amphrysus</i> (Cramer, [1779])	<i>amphrysus</i> <i>= Papilio amphrysus</i> <i>= Troides amphrysus</i> <i>= Haugumia amphrysus</i> <i>= Troides amphrysus amphrysus f.m. palabuana</i> <i>= Troides amphrysus amphrysus f.m. palabuanus</i> <i>= Troides amphrysus amphrysus f.m. splendens</i> <i>= Troides amphrysus amphrysus f.m. magnifica</i> <i>= Ornithoptera amphrysus var. palabuana</i> <i>= Troides amphrysus joanae</i> <i>= Troides amphrysus ab. palabuanus</i> (Cramer, [1779])	Java, Tabanang Bali Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus arkumene</i> Hayami, 1994	<i>arkumene</i> Hayami, 1994	Tioman Island, Aur island Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus astrea</i> Hayami, 1992	<i>astrea</i> Hayami, 1992	Banyak Island Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus chrysomelas</i> Parrot & Schmid, 1984	<i>chrysomelas</i> Parrot & Schmid, 1984	Ronai Mtn. Great Natuna island Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus hilbert</i> Hayami, 1992	<i>hilbert</i> Hayami, 1992	Karimata island Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus kecilensis</i> Schäffler, 1999	<i>kecilensis</i> Schäffler, 1999	Laut Kecil island Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus kuris</i> Kobayashi & Hayami, 1987	<i>kuris</i> Kobayashi & Hayami, 1987	Anambas island Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus naokoae</i> (Morita, 1996)	<i>naokoae</i> (Morita, 1996)	Langkawi island Malaisie
<i>Troides (Troides) amphrysus flavicollis</i> (Druce, 1873)	<i>flavicollis</i> <i>= Ornithoptera flavicollis</i> <i>= Troides flavicollis ab. nigricollis</i> <i>= Troides flavicollis ab. bruneicollis</i> <i>= Ornithoptera olympia</i> <i>= Ornithoptera flavicollis var. olympia</i> <i>= Troides amphrysus flavicollis ab.f. loc. olympia</i> <i>= Troides amphrysus flacicollis f.f. flavicollis</i> <i>= Toides amphrysus flavicollis f.m. splendens</i> <i>= Troides amphrysus flavicollis f.f. actinotia</i> <i>= Troides amphrysus flavicollis f.f. olympia</i> <i>= Troides amphrysus flavicollis f.f. arasada</i> <i>= Toides amphrysus flavicollis f.f. asarada</i> <i>= Toides amphrysus flavicollis f. nigricollis</i> <i>= Toides amphrysus flavicollis f. bruneicollis</i> (Druce, 1873)	Nord de Borneo Malaisie , Kalimantan Borneo, Natuna island, Banggi island Indonésie
<i>Troides(Troides) amphrysus niasicus</i> (Fruhstorfer, 1898)	<i>niasicus</i> <i>= Ornithoptera amphrysus niasicus</i> <i>= Toides amphrysus niasicus f. magnifica</i> (Fruhstorfer, 1898)	Île de Nias Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus perintis</i> Kobayashi, 1986	<i>perintis</i> <i>= Troides amphrysus tambelanensis</i> Kobayashi, 1986	Tambelan Besar Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus ruficollis</i> (Butler, [1877])	<i>ruficollis</i> <i>= Ornithoptera ruficollis</i> <i>= Troides amphrysus flavicollis ab. ruficollis</i> <i>= Troides amphrysus gardineri</i> <i>= Ornithoptera amphrysus euthydemus</i> <i>= Troides amphrysus centralis</i> <i>= Ornithoptera flavicollis ab. splendens</i> <i>= Troides amphrysus leowkonfahi</i> <i>= Troides amphrysus ruficollis f.f. poonkuanyaowi</i> <i>= Troides amphrysus ruficollis f.m. splendens</i> <i>= Troides amphrysus ruficollis f.m. palabuanus</i> <i>= Troides amphrysus ruficollis f.f. yapi</i> (Butler, [1877])	Sud du Myanmar , Thailande , Langkawi island, Péninsule malaise Malaisie , Singapour , Sumatra, Borneo Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus simeuluensis</i> Ohya, 1985	<i>simeuluensis</i> <i>= Troides amphrysus odeipus</i> Ohya, 1985	Simeulue island, Babi island Indonésie
<i>Troides (Troides) amphrysus vistara</i> (Fruhstorfer, 1906)	<i>vistara</i> <i>= Ornithoptera amphrysus vistara</i> <i>= Troides amphrysus merah</i> <i>= Troides amphrysus zeus</i> (Fruhstorfer, 1906)	Sipora island, Siberut, Simuk island, Batu Islands, Selat Mentawa islands group Indonésie
<i>Troides (Troides) andromache andromache</i> (Staudinger, 1892)	<i>andromache andromache</i> <i>= Ornithoptera andromache</i> <i>= Troides andromacha</i> <i>= Troides andromache andromache f.m. pseudomiranda</i> <i>= Troides andromache marapokensis</i> (Staudinger, 1892)	Mt. Kinabalu, Crocker Range, Siptang Sabah, Mt. Marapok Sarawak Nord de Bornéo Malaisie , Brunei
<i>Troides (Troides) andromache goramensis</i> Morita, 2000	<i>goramensis</i> Morita, 2000	Mt. Goram, Mt. Batak Sarawak Malaisie
<i>Troides (Troides) andromache nishikawai</i> Kobayashi, 1992	<i>nishikawai</i> Kobayashi, 1992	Mt. Saran, Ringas Kalimantan Ouest de Borneo Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT août 2018			
<i>Troides (Troides) cuneifera cuneifera</i> (Oberthür, 1879) <i>Troides (Troides) cuneifera paeninsulae</i> (Pendlebury, 1936) <i>Troides (Troides) cuneifera sumatranus</i> (Hagen, 1894) <i>Troides (Troides) miranda hayamii</i> Kobayashi, 1991 <i>Troides (Troides) miranda miranda</i> (Butler, 1869) <i>Troides (Troides) miranda neomiranda</i> Fruhstorfer, 1903	<i>cuneifera</i> <i>cuneifera</i> (Oberthür, 1879) = <i>Ornithoptera amphrissus</i> ab. <i>cuneifera</i> = <i>Troides amphrysus</i> <i>cuneifer</i> = <i>Troides cuneifer</i> = <i>Papilio ritsemæ</i> = <i>Ornithoptera ritsemæ</i> = <i>Ornithoptera ritsemæ</i> var. <i>tantalus</i> = <i>Troides cuneifera</i> <i>cuneatus</i> = <i>Troides cuneifera cuneifera</i> f.m. <i>cuneifera</i> = <i>Troides cuneifera cuneifera</i> f.m. <i>roepkei</i>	Java Indonésie , Kinabalu Mtn. Nord de Borneo Malaisie?	
	<i>paeninsulae</i> (Pendlebury, 1936) = <i>Papilio paeninsulae</i> = <i>Troides cuneifera</i> <i>peninsulae</i> = <i>Troides cuneifer</i> <i>paeninsulae</i>	Sud de la Thaïlande à Malaisie	
	<i>sumatranus</i> (Hagen, 1894) = <i>Ornithoptera ritsemæ</i> var. <i>sumatranus</i> = <i>Troides amphrysus</i> <i>sumatranus</i>	Nord et centre de Sumatra Indonésie	
	<i>miranda</i> <i>hayamii</i> Kobayashi, 1991 (Butler, 1869) = <i>Papilio miranda</i> = <i>Troides mirandus</i> = <i>Troides miranda miranda</i> f.f. <i>miranda</i> = <i>Troides miranda miranda</i> f.f. <i>nigrosuffusa</i>	Bintulu, Sibü, Mt. Serapi Sarawak Nord de Borneo Malaisie , Mt. Saran, Ringas Kalimantan Sud-ouest de Borneo Indonésie Sabah, Sarawak Nord de Bornéo Malaisie , Brunei	
Groupe des <i>haliphron</i> <i>Troides (Troides) criton criton</i> (C. & R. Felder, 1860) <i>Troides (Troides) criton critonides</i> (Fruhstorfer, 1903) <i>Troides darsius</i> (Gray, [1853]) <i>Troides (Troides) haliphron bellwoni</i> Neukirchen, 1993 <i>Troides (Troides) haliphron eleonoræ</i> Rumbucher & Schäßfler, 2004 <i>Troides (Troides) haliphron haliphron</i> (Boisduval, 1836) <i>Troides (Troides) haliphron naiaes</i> (Doherty, 1891) <i>Troides (Troides) haliphron purabu</i> Kobayashi, 1987 <i>Troides (Troides) plato</i> (Wallace, 1865) <i>Troides (Troides) riedeli</i> (Kirsch, 1885) <i>Troides (Troides) staudingeri ariadne</i> Rothschild, 1908 <i>Troides (Troides) staudingeri heptanonius</i> (Fruhstorfer, 1913) <i>Troides (Troides) staudingeri ikarus</i> Fruhstorfer, 1904 <i>Troides (Troides) staudingeri iris</i> (Röber, 1888) <i>Troides (Troides) staudingeri rikyu</i> Arima & Morimoto, 1991 <i>Troides (Troides) staudingeri staudingeri</i> (Röber, 1888) <i>Troides (Troides) vandepolli honrathiana</i> (Martin, [1892]) <i>Troides (Troides) vandepolli parrottei</i> Deslisle, 1989 <i>Troides (Troides) vandepolli vandepolli</i> (Snellen, 1890) Groupe des <i>helena</i> <i>Troides (Troides) celebensis celebensis</i> (Wallace, 1865) <i>Troides (Troides) celebensis selayarensis</i> Kobayashi & Koiiwaya, 1981 <i>Troides (Troides) helena antileuca</i> Rothschild, 1908 <i>Troides (Troides) helena bunguranensis</i> Ohya, 1982	<i>criton</i> <i>criton</i> (C. & R. Felder, 1860) = <i>Ornithoptera criton</i> = <i>Troides criton</i> ab. <i>bernhardus</i> = <i>Troides criton criton</i> ab.f. <i>oberthuerei</i> = <i>Troides criton</i> ab.f. <i>felderi</i> = <i>Troides criton criton</i> f.f. <i>androgyna</i> = <i>Troides criton criton</i> f.f. <i>neocriton</i> = <i>Troides criton criton</i> f.f. <i>oberthuerei</i> = <i>Troides criton criton</i> f.f. <i>neofelderi</i> = <i>Troides criton criton</i> f.f. <i>criton</i> = <i>Troides criton criton</i> f.f. <i>felderi</i> = <i>Troides criton criton</i> f. <i>pseudocriton</i> <i>critonides</i> (Fruhstorfer, 1903) = <i>Ornithoptera criton critonides</i> = <i>Troides criton critonides</i> f.f. <i>clara</i> = <i>Troides critonides</i> f.f. <i>cinna</i> = <i>Troides criton critonides</i> f.m. <i>hypactis</i> = <i>Troides criton critonides</i> f.m. <i>critonides</i> = <i>Troides criton critonides</i> f.f. <i>critonoides</i> <i>darsius</i> (Gray, [1853]) = <i>Papilio darsius</i> = <i>Ornithoptera cambyses</i> = <i>Troides amphimedon</i> = <i>Troides darsius</i> f.m. <i>clementinae</i> = <i>Troides darsius</i> f.m. <i>cambyses</i> = <i>Troides darsius</i> f.f. <i>donae</i> = <i>Troides darsius</i> f.f. <i>melanie</i> <i>haliphron bellwoni</i> Neukirchen, 1993 <i>eleonoræ</i> Rumbucher & Schäßfler, 2004 <i>haliphron</i> (Boisduval, 1836) = <i>Ornithoptera haliphron</i> = <i>Ornithoptera haliphron</i> m. var. <i>bauermannii</i> = <i>Troides haliphron haliphron</i> ab.m. <i>bauermannii</i> = <i>Troides haliphron haliphron</i> f.loc. <i>pistor</i> = <i>Troides haliphron haliphron</i> f.m. <i>bauermannii</i> = <i>Troides haliphron haliphron</i> f.f. <i>pallens</i> = <i>Troides haliphron haliphron</i> f.f. <i>palleus</i> = <i>Ornithoptera haliphron</i> ab. <i>pallens</i> = <i>Troides haliphron</i> ab.f. <i>pallens</i> <i>naiaes</i> (Doherty, 1891) = <i>Ornithoptera naiaes</i> = <i>Ornithoptera naiaes</i> var. <i>sambawana</i> = <i>Ornithoptera haliphron antiochus</i> = <i>Troides haliphron naiaes</i> f. loc. <i>kronos</i> = <i>Ornithoptera socrates</i> = <i>Troides haliphron pancasila</i> = <i>Papilio socrates?</i> = <i>Troides haliphron naiaes</i> f.loc. <i>socrates</i> = <i>Troides haliphron naiaes</i> f.m. <i>sambawana</i> <i>purabu</i> Kobayashi, 1987 = <i>Troides haliphron purabu</i> f.f. <i>staudiphron</i> = <i>Troides haliphron purabu</i> f.f. <i>pseudostaudingeri</i> = <i>Troides haliphron purabu</i> f.f. <i>schmidti</i> <i>plato</i> (Wallace, 1865) = <i>Ornithoptera plato</i> = <i>Papilio chitonia</i> = <i>Papilio nychonia</i> = <i>Troides plato</i> f.m. <i>chitonia</i> = <i>Troides plato</i> f.m. <i>nychonia</i> = <i>Troides plato</i> f.f. <i>delormei</i> <i>riedeli</i> (Kirsch, 1885) = <i>Ornithoptera riedeli</i> = <i>Troides riedeli</i> <i>staudingeri ariadne</i> Rothschild, 1908 = <i>Troides haliphron ariadne</i> <i>heptanonius</i> (Fruhstorfer, 1913) = <i>Ornithoptera haliphron heptanonius</i> <i>ikarus</i> Fruhstorfer, 1904 = <i>Troides haliphron ikarus</i> <i>iris</i> (Röber, 1888) = <i>Ornithoptera iris</i> = <i>Troides staudingeri iris</i> f.m. <i>trinkai</i> = <i>Troides staudingeri iris</i> f.m. <i>melanie</i> = <i>Papilio iris?</i> = <i>Troides haliphron iris</i> <i>rikyu</i> Arima & Morimoto, 1991 = <i>Troides haliphron rikyu</i> <i>staudingeri</i> (Röber, 1888) = <i>Ornithoptera staudingeri</i> = <i>Troides haliphron staudingeri</i> <i>vandepolli honrathiana</i> (Martin, [1892]) = <i>Ornithoptera honrathiana</i> = <i>Troides vandepolli honrathianus</i> <i>parrottei</i> Deslisle, 1989 <i>vandepolli</i> (Snellen, 1890) = <i>Papilio vandepolli</i> Groupe des <i>helena</i> <i>celebensis</i> <i>celebensis</i> (Wallace, 1865) = <i>Ornithoptera helena</i> loc.f. <i>celebensis</i> = <i>Papilio criton celebensis</i> = <i>Troides oblongomaculatus celebensis</i> <i>selayarensis</i> Kobayashi & Koiiwaya, 1981 <i>helena antileuca</i> Rothschild, 1908 = <i>Troides helena antileucus</i> <i>bunguranensis</i> Ohya, 1982	Morotai Island, Ternate island, Tidore Island, Halmahera island, Kasiruta, Sali Island, Bacan Island Indonésie Obi Island Indonésie Sri Lanka Lucipara Island Indonésie Buton Island Indonésie Kabia island, Centre, Sud et Sud-est du Sulawesi, Selayar island, Tanahjampea island, Kayuadi, Kalao island, Bonerate island, Kalaota, Karompa, Madu Indonésie Lombok, Wetar, Sumbawa, Sumba, Flores, Lantutuka, Adonara, Lomblen, Pantar, Solor?, Alor Indonésie Batuata Island Indonésie Timor island Indonésie Tanimbar isles Indonésie Îles de Romang Strait Indonésie Damar Island Indonésie Tanimbar island, Selaru island, Yamdena, Larat Indonésie Leti island, Moa isles, Kisar island?, Babri island, Wetar island Lakor Leti Group Indonésie Teun, Nila, Serua island Indonésie Sermatta Island., Loeng island, Babar island Indonésie Mt. Battak Nord et centre de Sumatra Indonésie Mt. Dempo Sud de Sumatra Indonésie Centre et ouest de Java Indonésie A été considéré comme hybride naturel de <i>Troides haliphron haliphron</i> et <i>T. helena hephaestus</i> A été considéré comme hybride naturel de <i>Troides haliphron pisto</i> et <i>T. oblongomaculatus thestius</i> Ujung Pandang, Patunuanasi à Putunasi, Putumau, Palopo Sud du Sulawesi Indonésie Selayar Island, Jampea island? Indonésie Kangean Island, Goa-Koenig island, Airkorkkab island, Pallat island, Saur island, Saubi island?, Sepanjang island?, Pangerungan Besar isles? Indonésie Bunguran Archipel Natuna Indonésie	

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018	
<i>Troides (Troides) oblongomaculatus oblongomaculatus</i> (Goeze, 1779)	<i>oblongomaculatus</i> = <i>Papilio oblongomaculatus</i> = <i>Papilio helena oblongomaculatus</i> = <i>Troides helena oblongomaculatus</i> = <i>Troides oblongomaculatus f. loc. asaria</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f. oblongomaculatus</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f.m. linos</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f.m. melania</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f. rubescini</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f. nigropuncta</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f. rusty</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f.f. ohzuoides</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f. melanides</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f. olympicus</i> = <i>Troides oblongomaculatus oblongomaculatus f.f. goezei</i>	(Goeze, 1779)	Boano Island, Ceram, Ambon, Haruku Island, Saparua Island, Nusa Laut Island, Ceram Laut island, Geser, Nusa, Misool Indonésie
<i>Troides (Troides) oblongomaculatus papuensis</i> (Wallace, 1865)	<i>papuensis</i> = <i>Ornithoptera helena loc.f. papuensis</i> = <i>Papilio amphimedon</i> = <i>Papilio obsoleta</i> = <i>Ornithoptera cellanigra</i> = <i>Ornithoptera papuensis ab. carolus</i> = <i>Toides oblongomaculatus ilonae</i> = <i>Troides oblongomaculatus ilonae f. obsoleta</i> = <i>Toides oblongomaculatus papuensis f. papuensis</i> = <i>Toides oblongomaculatus papuensis f.m. irregularis</i> = <i>Toides oblongomaculatus papuensis f.m. sordidus</i> = <i>Toides oblongomaculatus papuensis f.m. gresesmithi</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f. carolus</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f. rubra</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. papuana</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. melpomona</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. melpomona</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. radiata</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. cellanigra</i> = <i>Ornithoptera criton var. papuana</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. obsoleta</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. biroi</i> = <i>Troides oblongomaculatus papuensis f.f. jennyae</i> = <i>Papilio helena papuensis</i> = <i>Toides oblongomaculatus papuensis ab.f. papuanus</i>	(Wallace, 1865)	Kofiau Island, Baianta Island, Salawati island, Yapen island, Supiori Island, Biak, Karas Island, Hariti Island, Mambor Island, Mowirin Island, Akimuga, Babo, Barapasi, Fakafuru, Fakfak, Kobakma, Kokas, Manokwari, Marina Valen, Menti (Arlak), Merauke, Nabire, Napan, Ransiki, Sarmi, Timika, Wamena, Wapoga, Warkapi, Wasior Nouvelle Guinée Indonésie, Kairiru island, Vulcan island, Karkar island, Torres Strait isles, Astrolabe Bay Papouasie Nouvelle Guinée
<i>Troides (Troides) oblongomaculatus thestius</i> Staudinger, 1895	<i>thestius</i> = <i>Ornithoptera helena var. thestius</i> = <i>Troides oblongomaculatus thestius f. thestius</i> = <i>Troides oblongomaculatus thestius f.m. bernardus</i> = <i>Ornithoptera helena var. leda</i> = <i>Troides oblongomaculatus thestius f.f. leda</i> = <i>Troides oblongomaculatus thestius f.f. aetolis</i>	Staudinger, 1895	Selayar Island, Tanahjampea Island, Buton Island, Tukangbesi Island Indonésie
	Groupe des <i>aeacus</i>		
<i>Troides (Troides) aeacus aeacus</i> (C. & R. Felder, 1860)	<i>aeacus aeacus</i> = <i>Ornithoptera aeacus</i> = <i>Troides aeacus</i> = <i>Ornithoptera rhadamantus var. thomsonii</i> = <i>Ornithoptera aeacus f. praecox</i> = <i>Troides thibeticus</i> = <i>Troides aeacus thomsonii</i>	(C. & R. Felder, 1860)	Pnc: <i>Aristolochia griffithi</i> , <i>Thottea corymbosa</i> , <i>T. dependens</i> Népal , Nord-est de l' Inde , Bhoutan , Tibet , Nord-ouest du Myanmar , Nord de la Thaïlande , Laos , Cambodge , Vietnam , Sud de la Chine
<i>Troides (Troides) aeacus formosanus</i> Rothschild, 1899	<i>formosanus</i> = <i>Troides aeaeus kaguya</i> = <i>Troides aeacus formosanus f.m. kuroboshi</i> = <i>Troides aeacus f.m. maeoboshi</i>	Rothschild, 1899	Pnc: <i>Aristolochia kankauensis</i> , <i>A. elegans</i> Sud et Sud-est de Taiwan
<i>Troides (Troides) aeacus insularis</i> Ney, 1905	<i>insularis</i> Ney, 1905		Nord-est de Sumatra Indonésie
<i>Troides (Troides) aeacus malaiianus</i> Fruhstorfer, 1902	<i>malaiianus</i> = <i>Troides aeacus f. malaiianus</i>	Fruhstorfer, 1902	Sud de la Thaïlande , Malaisie
<i>Troides (Troides) aeacus szechwanus</i> Okano & Okano, 1983	<i>szechwanus</i> Okano & Okano, 1983		Sichuan, Hainan Chine
<i>Troides (Troides) dohertyi</i> (Rippon, 1903)	<i>dohertyi</i> = <i>Ornithoptera dohertyi</i> = <i>Prionoptera dohertyi</i> = <i>Papilio vordermani</i> = <i>Troides rhadamantus dohertyi</i> = <i>Troides fasciculatus</i> = <i>Troides dohertyi f. dohertyi</i> = <i>Troides dohertyi f. fasciculatus</i> = <i>Troides dohertyi f.f. futura</i>	(Rippon, 1903)	Pnc: <i>Aristolochia</i> Salebabu, Karakelong, Lirung, Kaburuang Kepulauan Talaud, Sangihe Island, Siau island? Indonésie
<i>Troides (Troides) magellanus cuyonensis</i> Deslisle, 2001	<i>magellanus cuyonensis</i> = <i>Troides magellanus magellanus f. loc. cuyonensis</i>	Deslisle, 2001	Cuyo island Philippines
<i>Troides (Troides) magellanus magellanus</i> (C. & R. Felder, 1862)	<i>magellanus</i> = <i>Ornithopus magellanus</i> = <i>Troides magellanus magellanus f.m. magellanus</i> = <i>Troides magellanus magellanus f.m. rhadamantoides</i> = <i>Troides magellanus magellanus f.m. apoensis</i> = <i>Troides magellanus magellanus f.f. leyteanus</i> = <i>Troides magellanus magellanus f.f. cebuensis</i> = <i>Haugumia magellanus</i> = <i>Haugumia magellanus magellanus</i>	(C. & R. Felder, 1862)	Pnc: <i>Aristolochia</i> sp. Babuyanes Group, Bohol, Busuanga, Calandagan, Camiguin de Mindanao, Camotes, Catanduanes, Cebu, Homonhon, Leyte, Luzon, Marinduque, Mindanao, Nord-est de Mindoro, Panaon, Polillo, Samar Philippines
<i>Troides (Troides) magellanus sonani</i> (Matsumura, 1931)	<i>sonani</i> = <i>Papilio magellanus sonani</i>	(Matsumura, 1931)	Lán Yü island ou Orchid island Sud-est de Taiwan
<i>Troides (Troides) minos</i> Matsumura, 1932	<i>minos</i> = <i>Papilio minos</i> = <i>Troides minos f.m. pasifae</i>	(Cramer, [1779])	Ouest de Ghat Range à Trivandrum, Est de Catha à Chennai Sud et Ouest de l' Inde , Côte occidentale de Sumatra Indonésie
<i>Troides (Troides) prattorum</i> (Joicey & Talbot, 1922)	<i>prattorum</i> = <i>Papilio prattorum</i>	(Joicey & Talbot, 1922)	Buru island Indonésie
<i>Troides (Troides) rhadamantus plateni</i> (Staudinger, 1888)	<i>rdadamantus plateni</i> = <i>Ornithoptera plateni</i> = <i>Troides rhadamantus plateni f.f. flavoradiata</i> = <i>Troides rhadamantus plateni</i> = <i>Troides plateni</i>	(Staudinger, 1888)	Cuyo group, Palawan, Balabac, Dumarán, Babuyan?, Batan?, Busuanga, Calamian Philippines
<i>Troides (Troides) rhadamantus rhadamantus</i> (Lucas, 1835)	<i>rdadamantus</i> = <i>Ornithoptera rhadamantus</i> = <i>Papilio nephereus</i> = <i>Troides rhadamanthus</i> = <i>Troides rhadamantus basilanicus</i> = <i>Troides rhadamantus basilanicus</i> = <i>Ornithoptera rhadamantus basilanicus</i> = <i>Ornithoptera rhadamantus belzanor</i> = <i>Ornithoptera rhadamantus hesiodus</i> = <i>Troides rhadamantus rhadamantus f. rhadamantus</i> = <i>Troides rhadamantus rhadamantus f.m. belzanor</i> = <i>Troides rhadamantus rhadamantus f.f. hesiodus</i>	(Lucas, 1835)	Pnc: <i>Aristolochia tagala</i> , <i>A. ramosi</i> , <i>A. pjilippensis</i> , <i>A. elegans</i> Bazilan, Jolo, Mindoro, Mindanao, Marinduque, Luzon Philippines
	Hybrides naturels		
<i>Troides (Troides) mixtum</i> (Joicey & Talbot, 1923)	<i>mixtum</i> = <i>Papilio prattorum f. mixtum</i>	(Joicey & Talbot, 1923)	Hybride naturel de <i>T. prattorum</i> et de <i>T. oblongomaculatus bouruensis</i> Buru island Indonésie
Trogonoptera Rippon, [1980]	Trogonoptera Rippon, [1980]		
<i>Trogonoptera brookiana akikoe</i> Morita, 1994	<i>brookiana akikoe</i> Morita, 1994		Tanahmasa island Indonésie
<i>Trogonoptera brookiana albescens</i> Rothschild, 1895	<i>albescens</i> = <i>Troides brookianus albescens</i> = <i>Trogonoptera brookiana albescens f.m. wongensis</i> = <i>Trogonoptera brookiana albescens</i> = <i>Trogonoptera brookiana gooil</i>	Rothschild, 1895	Pnc: <i>Aristolochia</i> Mt. Moulmein Myanmar , Thaïlande , Malaisie
<i>Trogonoptera brookiana appoloniae</i> Neukirchen, 1992	<i>appoloniae</i> Neukirchen, 1992		Siberut island Mentawai Indonésie
<i>Trogonoptera brookiana cardinaali</i> Haugum & Low, 1982	<i>cardinaali</i> Haugum & Low, 1982		Singkep island Sud du Lingga group Indonésie
<i>Trogonoptera brookiana haugumei</i> Parrott, 1991	<i>haugumei</i> Parrott, 1991		Ambalat, Kutai National Park, Bontang, Melak, Balikpapan, Banjarmasin, Ringas, Sintang Est de Kalimantan Borneo Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018		
Trogonoptera brookiana brookiana (Wallace, 1855)	brookiana (Wallace, 1855) = Ornithoptera brookiana = Troides brookianus = Trogonoptera brookea = Trogonoptera brookeanus = Trogonoptera brookianus = Trogonoptera brookiana = Ornithoptera brookiana ab. futurus = Trogonoptera brookiana brookiana f. futurus		ET	Sarawak Nord de Borneo Malaisie, Bornéo Indonésie, Balabac Islands Philippines
	jikoi Kobayashi, 1986			Tuangku Island, Banyak Island Indonésie
	mariae Neukirchen, 1993			île Batu Indonésie
	mollumar D'Abreira, Doggett & Parker, 1976 = Trogonoptera brookiana r. mollumar			Johor Malaisie
	natunensis Rothschild, 1908			Natuna Island Indonésie
	toshikii Kobayashi, 1991 = Trogonoptera brookiana apolloniae			Siberut, Kepulauan Mentawai Indonésie
	trogon (Vollenhoven, 1860) = Papilio trogon = Trogonoptera brookiana trogon f.m. walshi = Trogonoptera brookiana trogon f.m. walshoides = Trogonptera brookiana trogon f.f. eleanor = Trogonoptera brookiana trogon			Sumatra, Simeulue island, Sipura island Indonésie
	trojana (Honrath, 1886) = Ornithoptera trojana = Troides trojanus = Trogonoptera trojana		Pnc: Aristolochia	Palawan Bugsuk island? Philippines
	Ornithoptera Boisduval, [1832]			
	Ornithoptera = Ornithopterus = Schoenbergia = Straatmana = Aetheoptera = Priamoptera = Phalaenosoma			
Sous-genre : Schoenbergia = Phalaenosoma Pagenstecher, 1893				
Ornithoptera (Schoenbergia) arfakensis arfakensis (Joicey & Noakes, 1916)	arfakensis arfakensis (Joicey & Noakes, 1916) = Papilio paradisea arfakensis = Ornithoptera paradisea arfakensis = Ornithoptera arfakensis = Schoenbergia arfakensis = Ornithoptera arfakensis arfakensis f.m. confluenta = Ornithoptera arfakensis arfakensis f.m. oculis aureus = Ornithoptera arfakensis arfakensis f.m. aurilivoides = Ornithoptera arfakensis arfakensis f.m. defayetti = Ornithoptera arfakenss arfakensis f.f. pseudomeridionalis = Troides arfakensis arfakensis = Schoenbergia arfakensis arfakensis			Mt Arfak Irian Jaya Indonésie
	occidentalis Morita & Takenaka, 1998 = Ornithoptera paradisea occidentalis = Troides arfakensis occidentalis = Schoenbergia arfakensis occidentalis			Sorong Irian Jaya Indonésie
Ornithoptera (Schoenbergia) chimaera charybdis Van Eecke, 1915	chimaera charybdis Van Eecke, 1915 = Papilio chimaera dracaena = Troides chimaera dracaena = Ornithoptera chimaera charybdis f.m. charybdis = Ornithoptera chimaera charybdis f.m. sagittiflens = Ornithoptera chimaera charybdis f.m. aurata = Ornithoptera chimaera charybdis f.m. confluenta = Ornithoptera chimaera charybdis f.m. polyconfluenta = Ornithoptera chimaera charybdis f.m. quinquemaculata = Troides chimaera charybdis = Schoenbergia chimaera charybdis			Berau Peninsula, Weyland Mts., Sudirman Mts. Irian Jaya Indonésie
	chimaera (Rothschild, 1904) = Troides chimaera = Schoenbergia chimaera = Ornithoptera chimaera chimaera f.m. chimaera = Ornithoptera chimaera chimaera f.m. aurata = Ornithoptera chimaera chimaera f.m. dioni = Ornithoptera chimaera chimaera f.f. herminea = Ornithoptera chimaera chimaera f.m. confluenta = Ornithoptera chimaera chimaera f.f. excellens = Troides chimaera chimaera = Schoenbergi chimara chimaera			Nord-est de l'Irian Jaya Indonésie Owen Stanley, Bismarck Range Nord et Est de la Papouasie Papouasie-Nouvelle-Guinée
Ornithoptera (Schoenbergia) chimaera flavidor (Rothschild, 1913)	flavidor (Rothschild, 1913) = Troides chimaera flavidor = Troides chimaera draco = Ornithoptera chimaera draco = Ornithoptera chimaera flavidor f.m. flavidor = Ornithoptera chimaera flavidor f.m. aurata = Schoenbergia chimaera flavidor			Péninsule Huon Papouasie- Nouvelle-Guinée
Ornithoptera (Schoenbergia) goliath atlas (Rothschild, 1908)	goliath atlas (Rothschild, 1908) = Troides goliath atlas = Ornithoptera goliath atlas f.f. albiflora = Ornithoptera goliath atlas f.m. letiranti = Ornithoptera goliath atlas f.f. subalbus = Schoenbergia goliath atlas			Enarotali, Etna Bay, Fakfak, Jayawijaya Mts., Katimin, Kobowre Mts., Manokwari, Mapi, Lake Panial), Tembagapura, Wamena, Wandammen Peninsula, Yamur Lake Nouvelle Guinée, Geelvink Bay, Sarera Bay Indonésie
Ornithoptera (Schoenbergia) goliath goliath Oberthür, 1888	goliath Oberthür, 1888 = Ornithoptera arruana ab. f. goliath = Ornithoptera arruana goliath = Ornithoptera goliath = Troides priamus poseidon ab.f. goliath = Schoenbergia goliath = Troides goliath goliath			Waigeu, Nouvelle-Guinée, Goodenough island Indonésie
Ornithoptera (Schoenbergia) goliath procus (Rothschild, 1914)	procus (Rothschild, 1914) = Troides procus = Ornithoptera goliath procus f.m. nigroocellatus = Ornithoptera goliath procus f.m. confluenta = Ornithoptera goliath procus f.m. jeromei = Ornithoptera goliath procus f.m. goudreaulti = Ornithoptera goliath procus f.f. albopuncta = Papilio procus = Ornithoptera goliath procus			Ceram Indonésie
Ornithoptera (Schoenbergia) goliath samson Niepelt, 1913	samson Niepelt, 1913 = Ornithoptera goliath joiceyi = Schoenbergia goliath samson = Ornithoptera goliath samson f. samson = Ornithoptera goliath samson f. saïs. joiceyi = Ornithoptera goliath samson f.f. flavomaculata = Troides goliath samson		Deux formes saisonnières f. joiceyi et f. samson	Arfak Mts.: Anggi Lakes, Bikela, Manokwari, Meni, Minyambow, Mt. Mebo, Sirijo, Berau Peninsula Nouvelle Guinée Indonésie
Ornithoptera (Schoenbergia) goliath sorongensis Morita & Sugiyama, 1998	sorongensis Morita & Sugiyama, 1998 = Troides goliath sorongensis = Schoenbergia goliath sorongensis			Sorong Irian Jaya Indonésie
Ornithoptera (Schoenbergia) goliath supremus Oberthür, 1888	supremus (Röber, 1896) = Troides supremus = Ornithoptera goliath elisabethae-reginae = Ornithoptera goliath titan = Ornithoptera goliath titan f.m. confluenta = Ornithoptera goliath titan f.m. gottsi = Ornithoptera goliath huebneri = Ornithoptera goliath kkorienis = Ornithoptera goliath supremus f.m. aurifer = Ornithoptera goliath supremus f.f. schmidi = Troides goliath supremus = Schoenbergi goliath supremus			Jayapura, Mist Camp, Péninsule Huon, Nord-est de l'Irian Jaya Indonésie à Bismarcks, Est de Sepik et Morobe Provinces, Aseki, Goodenough Island Papouasie- Nouvelle-Guinée
Ornithoptera (Schoenbergia) goliath ukihidei Hanafusa, 1994	ukihidei Hanafusa, 1994 = Ornithoptera goliath ukihidei f. edouardei = Troides goliath ukihidei = Schoenbergia goliath ukihidei			Yapen Island Indonésie
Ornithoptera (Schoenbergia) meridionalis meridionalis (Rothschild, 1897)	meridionalis meridionalis (Rothschild, 1897) = Troides paradisea meridionalis = Schoenbergia meridionalis = Ornithoptera meridionalis meridionalis f.f. odileae = Troides meridionalis meridionalis = Schoenbergia meridionalis meridionalis			Est de Sepik Province, Sud des Highlands Province, Morobe Province, Central Province, Gulf Province? Et Milne Bay Province Papouasie-Nouvelle-Guinée
Ornithoptera (Schoenbergia) meridionalis tarunggarensis Joicey & Talbot, 1927	tarunggarensis Joicey & Talbot, 1927 = Troides meridionalis tarunggarensis = Schoenbergia meridionalis tarunggarensis			Wanggar River à Weyland Mts. Irian Jaya Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018	
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea borchii</i> Haugum & Low, 1974	<i>paradisea borchii</i> = <i>Ornithoptera paradisea borchii f.m. aurifluoides</i> = <i>Ornithoptera paradisea borchii f.f. auriflua</i> = <i>Troides paradisea borchii</i> = <i>Schoenbergia paradisea borchii</i>	Haugum & Low, 1974	Prince-Alexander Range, Jayapura, Ouest à Est de Sepik Province Irian Jaya, Kairiru island Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea chrysanthemum</i> Kobayashi & Koiwaya, 1979	<i>chrysanthemum</i> = <i>Troides paradisea chrysanthemum</i> = <i>Schoenbergia paradisea chrysanthemum</i> = <i>Ornithoptera paradisea chrysanthemum f.loc. ornatum</i> = <i>Ornithoptera paradisea chrysanthemum f.loc. sabinae</i>	(Kobayashi & Koiwaya, 1979)	Manokwari, Arkak Mts. Irian Jaya Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea detanii</i> Schäffler, 2001	<i>detanii</i> = <i>Troides paradisea detanii</i> = <i>Schoenbergia paradisea detanii</i>	Schäffler, 2001	Timika, Snow Mts. Sud de l'Irian Jaya Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea demeter</i> So & Sato, 1998	<i>demeter</i> = <i>Troides paradisea demeter</i> = <i>Schoenbergia paradisea demeter</i>	So & Sato, 1998	Lac Kutubu, Sud des Highlands Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea flavescens</i> (Rothschild, 1897)	<i>flavescens</i> = <i>Troides paradisea flavescens</i> = <i>Schoenbergia paradisea flavescens</i>	(Rothschild, 1897)	Kiruri Etna, Etna Bay Ouest de l'Irian Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea galatea</i> Sugiyama, 2000	<i>galatea</i> Sugiyama, 2000		Salawati island Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea paradisea</i> Staudinger, 1893	<i>paradisea</i> = <i>Ornithoptera paradisea</i> = <i>Schoenbergia schoenbergi</i> = <i>Troides schönbergi</i> = <i>Ornithoptera schönbergi</i> = <i>Troides paradiseus</i> = <i>Schoenbergi paradisea</i> = <i>Ornithoptera paradisea paradisea f. paradisea</i> = <i>Ornithoptera paradisea paradisea f.m. aurifluoides</i> = <i>Ornithoptera paradisea paradisea f.f. punctata</i> = <i>Ornithoptera paradisea paradisea f.f. caliginosa</i> = <i>Troides paradisea paradisea</i> = <i>Schoenbergia paradisea paradisea</i> = <i>Ornithoptera paradisea ab. auriflua</i> = <i>Troides paradiseus f. caliginosa</i>	Staudinger, 1893	Huon Peninsula à Finisterre Range et Astrolabe Bay Nord-est de la Nouvelle Guinée Papouasie- Nouvelle-Guinée
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) paradisea wondiboiensis</i> Deslille, 2008	<i>wondiboiensis</i> Deslille, 2008		District Wasior, Wondiboi Mts. Irian Jaya Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) rothschildi</i> Kenrick, 1911	<i>rothschildi</i> = <i>Ornithoptera rothschildi f.m. oceanus</i> = <i>Ornithoptera rothschildi f.m. kenricki</i> = <i>Ornithoptera rothschildi f.f. kirschoides</i> = <i>Ornithoptera rothschildi f.m. subulstris</i> = <i>Ornithoptera rothschildi f.m. fabricei</i> = <i>Ornithoptera rothschildi f.f. illustris</i> = <i>Ornithoptera rothschildi f.f. mariejeanneae</i> = <i>Troides rothschildi</i> = <i>Schoenbergia rothschildi</i>	Kenrick, 1911	Andang, Anggi Lakes, Hingk, Ikumabow, Mt. Koberai, Minyambow, Sirijo, Warmassin Arfak Mts. Irian Jaya Nouvelle Guinée Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus cytherea</i> Kobayashi & Koiwaya, 1980	<i>tithonus cytherea</i> = <i>Ornithoptera tithonus cytherea f.m. nicolasi</i> = <i>Troides tithonus cytherea</i> = <i>Schoenbergia tithonus cytherea</i>	Kobayashi & Koiwaya, 1980	East Kobowre Mts., Enarotali, Lake Tigi, Tembagapura, Jayawijaya Mts Irian Jaya Nouvelle Guinée Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus dominici</i> Schäffler, 2001	<i>dominici</i> = <i>Ornithoptera tithonus dominici f.loc. erwini</i> = <i>Troides tithonus dominici</i> = <i>Schoenbergia tithonus dominici</i>	Schäffler, 2001	Mt. Irau, Mt. Kwoka Tamrau Mts., Irian Jaya Nouvelle Guinée Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus makikoeae</i> Morita, 1998	<i>makikoeae</i> = <i>Troides tithonus makikoeae</i> = <i>Schoenbergia tithonus makikoeae</i>	Morita, 1998	Timika Irian Jaya Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus misoolana</i> Deslisle, 1985	<i>misoolana</i> = <i>Troides tithonus misoolana</i> = <i>Schoenbergia tithonus misoolana</i>	Deslisle, 1985	Misool Island Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus misresiana</i> (Joicey & Noakes, 1915)	<i>misresiana</i> = <i>Papilio tithonus misresiana</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresian f. misresiana</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.m. lowi</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.m. ichwani</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.m. crepusculum</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.f. rubicunda</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.m. confluenta</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.m. aurata</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.m. desilei</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.m. gaucheti</i> = <i>Ornithoptera tithonus misresiana f.f. minima</i> = <i>Troides tithonus misresiana</i> = <i>Schoenbergia tithonus misresiana</i>	(Joicey & Noakes, 1915)	Anggi Lakes, Bikela, Demaisi, Lake Gigi, Memti, Meni, Minyambow, Mt. Misresi, Arfak Mts. Irian jaya Nouvelle Guinée Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus tithonus</i> de Haan, 1840	<i>tithonus</i> = <i>Ornithoptera tithonius</i> = <i>Ornithoptera tithonus</i> = <i>Schoenbergia tithonus</i> = <i>Ornithoptera tithonus prominens</i> = <i>Papilio tithonus tithonus</i> = <i>Ornithoptera tithonus tithonus</i> = <i>Schoenbergia tithonus tithonus</i>	de Haan, 1840	Salawati Island, Sorong, Katimin, Klamono, Fakfak, Mt. Aigah, Berau Bay, Kamrau Bay, Yamur Lake, Wondiwoi Mts., Wasior, Djalalan River, Wanggar River, Mimika, Timika, lower Utakwa River ouest de l'Irian Jaya Nouvelle Guinée Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus waigeuensis</i> (Rothschild, 1897)	<i>waigeuensis</i> = <i>Troides tithonus waigeuensis</i> = <i>Schoenbergia tithonus waigeuensis</i>	(Rothschild, 1897)	Île Waigeu Indonésie
<i>Ornithoptera (Schoenbergia) tithonus wasiorensis</i> Deslille, 2007	<i>wasiorensis</i> Deslille, 2007		Wondiboi Range, Manokwari district, Wasior sub-district Irian Jaya Indonésie
	Sous-genre : <i>Ornithoptera</i> = <i>Ornithopterus</i> = <i>Priamoptera</i>	Boisduval, [1832]	
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) aesacus</i> (Ney, 1903)	<i>aesacus</i> = <i>Troides aesacus</i> = <i>Troides priamus f. aesacus</i> = <i>Ornithoptera obiana</i> = <i>Ornithoptera obiensis</i> = <i>Ornithoptera arruana obiana</i> = <i>Ornithoptera aesacus f.m. maculatusaurum</i> = <i>Ornithoptera aesacus f.m. nadiae</i> = <i>Ornithoptera aesacus f.f. tenebricosa</i> = <i>Ornithoptera aesacus f.f. purpurea</i> = <i>Ornithoptera aesacus f.f. masaeae</i>	(Ney, 1903)	Île d'Obi, Moluques Indonésie
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) croesus croesus</i> Wallace, 1859	<i>croesus croesus</i> = <i>Ornithoptera croesus</i> = <i>Ornithoptera croesus wallacei</i> = <i>Ornithoptera croesus wallacei f.m. biareomaculata</i> = <i>Ornithoptera croesus wallacei f.m. andreae</i> = <i>Ornithoptera croesus croesus f.m. croesus</i> = <i>Ornithoptera croesus croesus f.m. lydoides</i> = <i>Ornithoptera croesus sananaensis</i> = <i>Troides croesus croesus</i>	Wallace, 1859	Île Bachan, Île Mandioli, Sanana Îles Sula Indonésie
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) croesus helios</i> Kobayashi & Hayami, 1992	<i>helios</i> Kobayashi & Hayami, 1992		Kasiruta island Indonésie
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) croesus lydius</i> (C. & R. Felder, 1865)	<i>lydius</i> = <i>Papilio lydius</i> = <i>Troides lydius</i> = <i>Troides croesus lydius</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f. lydius</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. berchmansi</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. nigra</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. boutoni</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. watsoni</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. olivei</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. pannis</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. perroni</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.m. laplantei</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.f. nudus</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.f. fusca</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.f. jeanne-d'arcae</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.f. reducta</i>	(C. & R. Felder, 1865)	Halmahera island, Ternate island, Tidore island, Doi island Indonésie
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) croesus toeantei</i> Parrott & Schmid, 1984	<i>toeantei</i> = <i>Ornithoptera croesus lydius f.f. morotaiensis</i> = <i>Ornithoptera croesus toeantei f.m. carinae</i> = <i>Ornithoptera croesus toeantei f.f. agatheae</i> = <i>Troides croesus toeantei</i>	Parrott & Schmid, 1984	Île Morotai Indonésie
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) priamus admiralitatis</i> (Rothschild, 1915)	<i>priamus admiralitatis</i> = <i>Ornithoptera priamus admiralitatis f.m. moinieri</i> = <i>Troides priamus admiralitatis</i>	(Rothschild, 1915)	Îles de l'Amirauté Papouasie- Nouvelle-Guinée

Auteur: Dominick PRUVOT		août 2018				
Ornithoptera (Ornithoptera) priamus poseidon Doubleday, 1847	= <i>Papilio nigropunctata</i> = <i>Papilio paradoxa</i> = <i>Papilio decora</i> = <i>Papilio obscura</i> = <i>Papilio papuensis</i> = <i>Papilio radiata</i> = <i>Ornithoptera papuensis</i> ab. <i>radiata</i> = <i>Papilio ornata</i> = <i>Papilio albiplaga</i> = <i>Troides akakeoides</i> = <i>Troides pseudotroides</i> = <i>Ornithoptera latimarginata</i> = <i>Ornithoptera michkoae</i> = <i>Ornithoptera titanoides</i> = <i>Troides priamus poseidon</i> ab.m. <i>cronius</i> = <i>Troides priamus poseidon</i> ab.f. <i>archideus</i> = <i>Papilio archideus</i> = <i>Papilio pegasus</i> = <i>Ornithoptera arruana</i> ab. <i>kirschii</i> = <i>Troides priamus poseidon</i> ab. <i>brunneus</i> = <i>Papilio boreas</i> = <i>Ornithoptera nivalis</i> = <i>Troides priamus poseidon</i>					
	<i>Ornithoptera (Ornithoptera) priamus priamus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>priamus</i> = <i>Papilio priamus</i> = <i>Papilio panthous</i> = <i>Ornithoptera priamus priamus</i> f.m. <i>divina</i> = <i>Ornithoptera priamus priamus</i> f.m. <i>priamus</i> = <i>Ornithoptera priamus priamus</i> f.m. <i>viridocellularis</i> = <i>Ornithoptera priamus priamus</i> f.m. <i>fasciata</i> = <i>Ornithoptera priamus</i> f.f. <i>addenda</i> = <i>Ornithoptera priamus priamus</i> f.f. <i>harukensis</i> = <i>Ornithoptera priamus priamus</i> f.f. <i>pseudobrunneus</i> = <i>Ornithoptera priamus priamus</i> f. loc. <i>sclavoi</i> = <i>Troides priamus priamus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pnc: <i>Aristolochia deltantha</i> , <i>A. praevenosa</i> , <i>A. tagala</i> , <i>A. indica</i> ?	Ambon, Ceram, Haruku, Saparua Moluques Indonésie	
Ornithoptera (Ornithoptera) priamus pronomus (Gray, [1853])	<i>pronomus</i> = <i>Papilio pronomus</i> = <i>Troides priamus pronomus</i>			(Gray, [1853])	Cape York, Nord du Queensland Nord de l' Australie	
	<i>Ornithoptera (Ornithoptera) priamus richmondia</i> (Gray, [1853])	<i>richmondia</i> = <i>Papilio richmondia</i> = <i>Amphrisius priamus</i> australs = <i>Ornithoptera priamus richmondia</i> m. f. <i>reducta</i> = <i>Ornithoptera priamus richmondii</i> = <i>Troides priamus richmondus</i> = <i>Ornithoptera richmondia</i> = <i>Troides priamus richmondia</i>	(Gray, [1853])		Maryborough Sud du Queensland à Richmond River Nord des Nouvelles Galles du Sud Australie	
Ornithoptera (Ornithoptera) priamus teucrus (Joicey & Talbot, 1916)	<i>teucrus</i> = <i>Papilio priamus teucrus</i> = <i>Ornithoptera priamus teucrus</i> f.m. <i>aurora</i> = <i>Ornithoptera priamus teucrus</i> f.m. <i>barbarossa</i> = <i>Troides priamus teucrus</i>			(Joicey & Talbot, 1916)	île de Biak, Supion island Indonésie	
	<i>Ornithoptera (Ornithoptera) priamus urvillianus</i> Guérin-Ménéville, 1830	<i>urvillianus</i> = <i>Papilio urvillianus</i> = <i>Papilio priamus burkei</i> = <i>Ornithoptera priamus urvillianus</i> f.m. <i>flavomaculata</i> = <i>Ornithoptera urvilliana</i> ab. <i>flavomaculata</i> = <i>Ornithoptera priamus urvillianus</i> f.m. <i>viridescens</i> = <i>Ornithoptera priamus urvillianus</i> f.m. <i>radiata</i> = <i>Ornithoptera priamus urvillianus</i> f.f. <i>fuscapallida</i> = <i>Ornithoptera urvillianus</i> = <i>Ornithoptera urvilliana</i>	Guérin-Ménéville, 1830	Pnc: <i>Aristolochia parvenosa</i> , <i>A. indica</i> , <i>A. deltantha</i> , <i>A. elegans</i>	Nouvelle Irlande, Nouveau Hanovre Papouasie-Nouvelle-Guinée à Sud des Îles Salomon	
Sous-genre : Straatmana Deslisle, 2007						
<i>Ornithoptera (Straatmana) alexandrae</i> (Rothschild, 1907)	<i>alexandrae</i> = <i>Troides alexandrae</i> = <i>Ornithoptera alexandrae</i> f.m. <i>alexandrae</i> = <i>Ornithoptera alexandrae</i> f.m. <i>atavis</i> = <i>Ornithoptera alexandrae</i> f.f <i>devis</i> = <i>Aetheoptera alexandrae</i> = <i>Straatmana alexandrae</i>	(Rothschild, 1907)	Pnc: <i>Aristobchia</i>	Kumusi River, Popondetta Plain, Sud-est de la Papouasie Papouasie-Nouvelle-Guinée		
Sous-genre : Aetheoptera Rippon, 1894						
<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae archeri</i> Calderara, 1984	<i>victoriae archeri</i> = <i>Ornithoptera victoriae archeri</i> f.m. <i>niclasi</i> = <i>Troides victoriae archeri</i> = <i>Aetheoptera victoriae archeri</i>			Calderara, 1984	Nord et Ouest de l'île Choiseul Îles Salomon	
<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae epiphanes</i> Schmid, 1970	<i>epiphanes</i> = <i>Troides victoriae epiphanes</i> = <i>Aetheoptera victoriae epiphanes</i> = <i>Aetheoptera victoriae epiphanes</i> f.m. <i>brossardi</i> = <i>Aetheoptera victoriae epiphanes</i> f.m. <i>julesi</i> = <i>Aetheoptera victoriae epiphanes</i> f.m. <i>belai</i>			Schmid, 1970	île San Cristobal Îles Salomon	
	<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae isabellae</i> (Rothschild & Jordan, 1901)	<i>isabellae</i> = <i>Papilio victoriae isabellae</i> = <i>Aetheoptera victoriae isabellae</i> = <i>Troides victoriae isabellae</i>			(Rothschild & Jordan, 1901)	île Santa Isabel Îles Salomon
<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae maramasikensis</i> Morita, 2000	<i>maramasikensis</i> = <i>Troides victoriae maramasikensis</i> = <i>Aetheoptera victoriae maramasikensis</i>			Morita, 2000	île Maramasike Îles Salomon	
<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae reginae</i> Salvin, 1888	<i>reginae</i> = <i>Ornithoptera reginae</i> = <i>Ornithoptera victoriae reginae</i> f.m. <i>rubesco</i> = <i>Ornithoptera victoriae reginae</i> f.m. <i>brossardi</i> = <i>Ornithoptera victoriae reginae</i> f.m. <i>gabrielii</i> = <i>Ornithoptera victoriae regina</i> f.f. <i>polychroma</i> = <i>Troides victoriae reginae</i> = <i>Aetheoptera victoriae reginae</i>			Salvin, 1888	île Malaita Îles Salomon	
	<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae regis</i> (Rothschild, 1895)	<i>regis</i> = <i>Troides victoriae regis</i> = <i>Ornithoptera victoriae resplendens</i> = <i>Ornithoptera victoriae buinensis</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>gabrielii</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f. <i>brabanti</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>alexisi</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>laniell</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>infanta</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>ponceletanus</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>flamea</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>sanguinea</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f.m. <i>niclasi</i> = <i>Ornithoptera victoriae regis</i> f. <i>ponceleti</i> (gynand.) = <i>Aetheoptera victoriae regis</i>			(Rothschild, 1895)	Buka island?, Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée , Choiseul Îles Salomon
<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae rubianus</i> (Rothschild, 1904)	<i>rubianus</i> = <i>Troides victoriae rubianus</i> = <i>Ornithoptera victioae rubianus</i> f.m. <i>noellann</i> = <i>Ornithoptera victioae rubianus</i> f.m. <i>niclasi</i> = <i>Ornithoptera victioae rubianus</i> f.f. <i>gisoensis</i> = <i>Aetheoptera victoriae rubianus</i>			(Rothschild, 1904)	Rubiana island, Rendova island, Kolombangara island, Ranongga island? Îles Salomon	
<i>Ornithoptera (Aethoptera) victoriae victoriae</i> (Gray, 1856)	<i>victoriae</i> = <i>Papilio victoriae</i> = <i>Aetheoptera victoriae</i> = <i>Ornithoptera victoriae victoriae</i> f.m. <i>brossardi</i> = <i>Ornithoptera victoriae victoriae</i> f.m. <i>niclasi</i> = <i>Ornithoptera victoriae victoriae</i> f.m. <i>gousseyi</i> = <i>Troides victoriae victoriae</i> = <i>Aetheoptera victoriae victoriae</i>			(Gray, 1856)	Guadalcanal island, Florida island, Tulahi island Îles Salomon	
Hybrides naturels						
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) allottei</i> (Rothschild, 1914)	<i>allotiei</i> = <i>Troides allottei</i> = <i>Papilio allottei</i> = <i>Ornithoptera allottei</i>			(Rothschild, 1914)	Hybride naturel de <i>O. priamus urvilleanus</i> et de <i>O. victoriae</i>	Bougainville Papouasie-Nouvelle-Guinée
<i>Ornithoptera (Ornithoptera) akakeae</i> Kobayashi & Koiiwaya, 1978	<i>akakeae</i> = <i>Troides akakeae</i>			Kobayashi & Koiiwaya, 1978	Hybride naturel de <i>O. priamus poseidon</i> et de <i>O. rothschildi</i>	Arfak Mts., Irian Jaya Indonésie

Auteur: Dominick PRUVOT	août 2018	
Battus Scopoli, 1777	Battus = Laertias = Ithoballus = Battuosa Scopoli, 1777	
	Sous-genre : Battus Scopoli, 1777	
	Groupe des philenor	
Battus (Battus) devilliersii (Godart, 1823)	devilliersii (Godart, 1823) Pnc: <i>Aristolochia elegans</i> = <i>Papilio devillers</i> = <i>Battus devillers</i> = <i>Battus devillersi</i>	Cuba, Andros Nord et Sud Bahamas
Battus (Battus) philenor acauda (Oberthür, 1879)	philenor acauda (Oberthür, 1879) = <i>Papilio acauda</i> = <i>Laertias acauda</i> = <i>Papilio corbis</i> = <i>Papilio nezahuacoyotl</i>	Nouveau Mexique USA, Yucatan Sud-est du Mexique
Battus (Battus) philenor hirsuta (Skinner, 1908)	hirsuta (Skinner, 1908) Pnc: <i>Aristobchia californica</i> = <i>Papilio philenor hirsuta</i> = <i>Papilio philenor hirsuta tr.f. inghami</i>	Centre et Nord de la Californie USA
Battus (Battus) philenor insularis Vásquez, 1957	insularis Vásquez, 1957	Iles Revillagigedo Colima Ouest du Mexique
Battus (Battus) philenor orsua (Godman & Salvin, 1889)	orsua (Godman & Salvin, 1889) = <i>Papilio orsua</i> = <i>Papilio philenor orsua</i>	Tres Marias Islands, Nayarit Ouest du Mexique
Battus (Battus) philenor philenor (Linnaeus, 1771)	philenor (Linnaeus, 1771) Pnc: <i>Aristolochia macrophylla</i> = <i>Papilio philenor</i> = <i>Laertias philenor</i> = <i>Papilio astinuous</i> = <i>Papilio philenor</i> var. <i>obsoleta</i> = <i>Papilio philenor philenor</i> ab. <i>wasmothii</i> = <i>Papilio serpentariae</i> = <i>Laertias philenor</i> ab. <i>obsoleta</i> = <i>Laertias philenor wasmothi</i>	V-X Sud de l'Ontario, Nouvelle Angleterre Canada, Floride, Nebraska, Texas, Arizona, Californie, Oregon USA, Mexique
Battus (Battus) zetides (Munroe, 1971)	zetides (Munroe, 1971) Pnc: <i>Aristolochia bilabiata</i> , <i>A. montanata</i> = <i>Papilio zetides</i> = <i>Papilio zetes</i> = <i>Battus zetes</i>	Haïti, République dominicaine
	Groupe des polydamas	
Battus (Battus) polydamas antiquus (Rothschild & Jordan, 1906)	polydamas antiquus (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio polydamas antiquus</i>	sous-espèce éteinte Île d'Antigua Antigua-et-Barbuda
Battus (Battus) polydamas atahualpa Racheli & Pischedda, 1987	atahualpa Racheli & Pischedda, 1987 = <i>Battus poldamas atahualpa</i> = <i>Battus streckerianus atahualpa</i>	Abancay, Apurimac Pérou
Battus (Battus) polydamas cebrones (Dalman, 1823)	cebriones (Dalman, 1823) = <i>Papilio cebriones</i> = <i>Battus polydamas xenodamas</i> = <i>Ithobalus xenodamas</i> = <i>Papilio eurydamas</i>	Martinique France
Battus (Battus) polydamas christopheranus (Hall, 1936)	christopheranus (Hall, 1936) = <i>Papilio polydamas chrystopheranus</i>	Saint Kitts-et-Nevis, Montserrat Royaume-Uni
Battus (Battus) polydamas cubensis (Dufrane, 1946)	cubensis (Dufrane, 1946) = <i>Papilio polydamas cubensis</i> = <i>Pharmacophagus polydamas cubensis</i>	Île de Cuba et Île de la Jeunesse Cuba
Battus (Battus) polydamas dominicus (Rothschild & Jordan, 1906)	dominicus (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio polydamas dominicus</i>	Dominique
Battus (Battus) polydamas grenadensis (Hall, 1930)	grenadensis (Hall, 1930) = <i>Papilio polydamas grenadensis</i>	Grenade, Sud des Îles Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Battus (Battus) polydamas jamaicensis (Rothschild & Jordan, 1906)	jamaicensis (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio polydamas jamaicensis</i>	Jamaïque
Battus (Battus) polydamas lucayus (Rothschild & Jordan, 1906)	lucayus (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio polydamas lucayus</i>	Nassau et Nouvelle Providence Bahamas, Floride(migateur) Sud-est des USA
Battus (Battus) polydamas lucianus (Rothschild & Jordan, 1906)	lucianus (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio polydamas lucianus</i>	Sainte- Lucie
Battus (Battus) polydamas neodamas (Lucas, 1852)	neodamas (Lucas, 1852) = <i>Papilio neodamas</i> = <i>Papilio polydamas neodamas</i>	Guadeloupe et Marie-Galante France
Battus (Battus) polydamas peruanus (Fuchs, 1954)	peruanus (Fuchs, 1954) = <i>Papilio polydamas peruanus</i> = <i>Battus streckerianus peruanus</i>	Pérou
Battus (Battus) polydamas polycrates (Hopffer, 1865)	polycrates (Hopffer, 1865) = <i>Papilio polycrates</i> = <i>Papilio polydamas polycrates</i>	Haïti, République Dominicaine
Battus (Battus) polydamas polydamas (Linnaeus, 1758)	polydamas (Linnaeus, 1758) Pnc: <i>Aristolochia veraguensis</i> = <i>Papilio polydamas</i> = <i>Laertias polydamas</i> = <i>Battus polydamus</i> = <i>Papilio anguicidas</i> = <i>Papilio polydamas polydamas</i>	E T Mexique à Guyane française, Brésil
Battus (Battus) polydamas psittacus (Molina, 1782)	psittacus (Molina, 1782) Pnc: <i>Aristolochia chilensis</i> , <i>A. pearsei</i> = <i>Papilio psittacus</i> = <i>Papilio archidamas</i> = <i>Battus archidamas</i> = <i>Papilio bias</i> = <i>Papilio lindenii</i>	Nord-est du Chili, Mendoza Ouest de l'Argentine?
Battus (Battus) polydamas renani Lamas, 1998	renani Lamas, 1998 Pnc: <i>Aristolochia weberbaueri</i> ? = <i>Battus streckerianus renani</i>	Campo Armino, Huancavelica Pérou
Battus (Battus) polydamas streckerianus (Honrath, 1884)	streckerianus (Honrath, 1884) Pnc: <i>Aristolochia streckerianus</i> = <i>Papilio streckerianus</i> = <i>Papilio mathani</i> = <i>Battus streckerianus streckerianus</i>	Pérou
Battus (Battus) polydamas thymus (Rothschild & Jordan, 1906)	thymus (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio polydamas thymus</i> = <i>Papilio cnejus</i> ?	Porto Rico, Île Culebra, Saint Thomas, Îles Vierges USA et Royaume-Uni
Battus (Battus) polydamas vincentius (Rothschild & Jordan, 1906)	vincentius (Rothschild & Jordan, 1906) = <i>Papilio polydamas vincentius</i>	Île de Saint-Vincent Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Battus (Battus) polydamas weyrauchi Lamas, 1998	weyrauchi Lamas, 1998 = <i>Battus strecherianus weyrauchi</i>	Santa Ana, Rio Urubamba Cuzco Pérou
	Sous-genre : Battuosa Möhn, 1999	
	Groupe des madyes	
Battus (Battuosa) madyes adloni (Ehrmann, 1926)	madyes adloni (Ehrmann, 1926) = <i>Papilio madyes adloni</i> = <i>Battuosa madyes adloni</i>	Centre de l'Equateur
Battus (Battuosa) madyes buechei Lamas, 1998	buechei Lamas, 1998 = <i>Battuosa madyes buechei</i>	Chinchao, Huanuco Centre du Pérou
Battus (Battuosa) madyes callangaensis Möhn, 2001	callangaensis Möhn, 2001 = <i>Battuosa madyes callangaensis</i> = <i>Papilio madyes crispus</i>	Callanga, Cuzco Pérou
Battus (Battuosa) madyes chlorodamas (Guenée, 1872)	chlorodamas (Guenée, 1872) = <i>Papilio chlorodamas</i> = <i>Papilio madyes chlorodamas</i> = <i>Papilio madyes</i> var. <i>marsyas</i> = <i>Battuosa madyes chlorodamas</i>	Chanchomayo Sud-est du Pérou
Battus (Battuosa) madyes frankenbachi Möhn, 2001	frankenbachi Möhn, 2001 = <i>Battuosa madyes frankenbachi</i>	Abancay, Apurimac Sud du Pérou
Battus (Battuosa) madyes lojaensis Möhn, 1999	lojaensis Möhn, 1999 = <i>Battuosa madyes lojaensis</i>	Loja Sud de l'Equateur
Battus (Battuosa) madyes madyes (Doubleday, 1846)	madyes (Doubleday, 1846) Pnc: <i>Aristolochia macrophylla</i> , <i>A. serpentaria</i> , <i>A. californica</i> , <i>A. longiflora</i> = <i>Papilio madyes</i> = <i>Battus madyas</i> = <i>Battuosa madyes madyes</i>	Bolivie
Battus (Battuosa) madyes magnimacula (Joicey & Talbot, 1925)	magnimacula (Joicey & Talbot, 1925) = <i>Papilio philetas magnimacula</i> = <i>Battus philetas magnimacula</i> = <i>Battuosa madyes magnimacula</i>	Nord du Pérou
Battus (Battuosa) madyes montebanus (Dyar, 1913)	montebanus (Dyar, 1913) = <i>Papilio madyes montebanus</i> = <i>Battus madyes inca</i> = <i>Battuosa madyes inca</i> = <i>Battuosa madyes montebanus</i>	Macchu Picchu, Cizco Sud du centre du Pérou
Battus (Battuosa) madyes philetas (Hewitson, 1869)	philetas (Hewitson, 1869) = <i>Papilio philetas</i> = <i>Battus philetas</i> = <i>Battuosa madyes philetas</i>	Sud de l'Equateur

Auteur: Dominick PRUVOT août 2018		
<i>Battus (Battuosa) madyes plinius</i> (Weymer, 1890)	<i>plinius</i> = <i>Papilio plinius</i> = <i>Papilio philetas</i> f. <i>fabius</i> = <i>Battuosa madyes plinius</i>	(Weymer, 1890) Nord du Pérou
<i>Battus (Battuosa) madyes tucumanus</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	<i>tucumanus</i> = <i>Papilio madyes tucumanus</i> = <i>Battuosa madyes tucumanus</i>	(Rothschild & Jordan, 1906) Tucuman, Bueyes Nord-ouest de l'Argentine
	Groupe des <i>belus</i>	
<i>Battus (Battuosa) belus aureochloris</i> Brown, 1994	<i>belus aureochloris</i> = <i>Battuosa belus aureochloris</i>	Brown, 1994 Serra de Carajas Parà Brésil
<i>Battus (Battuosa) belus belemus</i> (Bates, 1864)	<i>belemus</i> = <i>Papilio belemus</i> = <i>Papilio belus belemus</i> = <i>Battuosa belus belemus</i>	(Bates, 1864) Parà, Amazonas Brésil , Guyane française
<i>Battus (Battuosa) belus belus</i> (Cramer, [1777])	<i>belus</i> = <i>Papilio belus</i> = <i>Papilio numitor</i> = <i>Papilio amulius</i> = <i>Papilio caburi</i> = <i>Papilio belus belus</i> = <i>Battuosa belus belus</i>	(Cramer, [1777]) Pnc: <i>Aristolochia</i> Essequibo et Mazaruni Rivers, Bartica Guyana, Suriname
<i>Battus (Battuosa) belus cochabamba</i> (Weeks, 1901)	<i>cochabamba</i> = <i>Papilio cochabamba</i> = <i>Papilio belus cochabamba</i> = <i>Papilio belus ab. gastoni</i> = <i>Battuosa belus cochabamba</i>	(Weeks, 1901) Pérou, Nord de Cochabamba Bolivie
<i>Battus (Battuosa) belus varus</i> (Kollar, 1850)	<i>varus</i> = <i>Papilio varus</i> = <i>Papilio belus varus</i> = <i>Papilio belus belus</i> f. <i>f. amazonis</i> = <i>Papilio heteropterus</i> = <i>Papilio belus chalcus</i> = <i>Battus belus chalcus</i> = <i>Battuosa belus varus</i>	(Kollar, 1850) Guerrero Ouest du Mexique, Costa Rica, Guatémala, Venezuela, St. Magdalena Colombie, Pérou, Amazonas Brésil
<i>Battus (Battuosa) crassus crassus</i> (Cramer, 1777)	<i>crassus</i> = <i>Papilio crassus</i> = <i>Papilio crassus</i> f. <i>ambigua</i> = <i>Papilio crassus</i> f. <i>flavus</i> = <i>Battuosa crassus crassus</i>	(Cramer, 1777) Pnc: <i>Aristolochia cymbifera</i> , <i>A. esperanzae</i> , <i>A. gigantea</i> , <i>A. macroura</i> , <i>A. veraguensis</i> , <i>A. odora</i> , <i>A. didyma</i> , <i>A. brasiliensis</i> Pérou, Suriname, Amazonas, Rio de Janeiro Brésil, Misiones Nord de l'Argentine
<i>Battus (Battuosa) crassus hirundo</i> (Röber, 1925)	<i>hirundo</i> = <i>Papilio crassus hirundo</i> = <i>Battus hirundo</i> = <i>Battuosa crassus hirundo</i>	(Röber, 1925) Rio Songo Nord de la Bolivie
<i>Battus (Battuosa) crassus lepidus</i> (C. & R. Felder, 1861)	<i>lepidus</i> = <i>Papilio lepidus</i> = <i>Battuosa crassus lepidus</i>	(C. & R. Felder, 1861) Costa Rica à Est du Venezuela, Ouest de la Colombie, Ouest de l'Equateur
<i>Battus (Battuosa) crassus paraensis</i> (Brown, 1994)	<i>paraensis</i> = <i>Papilio crassus paraensis</i> = <i>Battuosa crassus paraensis</i>	(Brown, 1994) Parà Brésil
<i>Battus (Battuosa) eracon</i> (Godman & Salvin, 1897)	<i>eracon</i> = <i>Papilio eracon</i> = <i>Papilio eracon</i> f. <i>ochracea</i> = <i>Battus eracon</i> ab. <i>incolorus</i> = <i>Battuosa eracon</i>	(Godman & Salvin, 1897) Pnc: <i>Aristolochia tentaculata</i> Jalisco, Colima, Michoacán Ouest du Mexique
<i>Battus (Battuosa) ingenuus</i> (Dyar, 1907)	<i>ingenuus</i> = <i>Papilio igenuus</i> = <i>Papilio belus</i> var. <i>ingenuus</i> = <i>Papilio latinus</i> = <i>Papilio belus</i> var. <i>chrysomaculatus</i> = <i>Papilio belus</i> f. <i>chrysomaculatus</i> = <i>Papilio belus camposia</i> = <i>Battus belus chalcus</i> f. <i>ochracea</i> = <i>Battus chalcus ingenuus</i> = <i>Battuosa ingenuus</i>	(Dyar, 1907) Pnc: <i>Aristolochia constricta</i> Sud-est du Mexique à Est du Venezuela, Macas Equateur, Trinidad
<i>Battus (Battuosa) laodamas copanae</i> (Reakirt, 1863)	<i>laodamas copanae</i> = <i>Papilio copanae</i> = <i>Papilio laodamas copanae</i> = <i>Papilio chrysodamas</i> = <i>Papilio chromealus</i> = <i>Battus laodamas copanae</i> f. <i>ochracea</i> = <i>Battus laodamas</i> f. <i>media</i> = <i>Battus laodamas copanae</i> f. <i>iopanae</i> = <i>Battuosa laodamas copanae</i>	(Reakirt, 1863) Sud et Est du Mexique, Belize, Guatémala, Honduras
<i>Battus (Battuosa) laodamas iopas</i> (Godman & Salvin, 1897)	<i>iopas</i> = <i>Papilio iopas</i> = <i>Papilio laodamas procas</i> = <i>Papilio laodamas procas</i> f. <i>ochracea</i> = <i>Battuosa laodamas iopas</i>	(Godman & Salvin, 1897) Nord et Ouest du Mexique
<i>Battus (Battuosa) laodamas laodamas</i> (C. & R. Felder, 1859)	<i>laodamas</i> = <i>Papilio laodamas</i> = <i>Battus laodamas</i> = <i>Battuosa laodamas laodamas</i>	(C. & R. Felder, 1859) Pnc: <i>Aristolochia tentaculata</i> Santa Fé de Bogta Colombie, Sud-ouest du Venezuela
<i>Battus (Battuosa) laodamas rhipidius</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>rhipidius</i> = <i>Battuosa laodamas rhipidius</i> = <i>Battus laodamas rhipidius</i>	Rothschild & Jordan, 1906 Carillo Costa Rica, Panama
<i>Battus (Battuosa) lycidas</i> (Cramer, [1777])	<i>lycidas</i> = <i>Papilio lycidas</i> = <i>Papilio erymanthus</i> = <i>Papilio lycidas</i> f. <i>adlatus</i> = <i>Battus lycides</i> = <i>Battuosa lycidas</i>	(Cramer, [1777]) Pnc: <i>Aristolochia huberiana</i> Sud-est du Mexique à Nord de la Bolivie, Venezuela, Trinidad, Guyana, Suriname, Guyane française, Parà Brésil
<i>Battus (Battuosa) polystictus galenus</i> (Fruhstorfer, 1907)	<i>polystictus galenus</i> = <i>Papilio polystictus galenus</i> = <i>Papilio polystictus janira</i> = <i>Battuosa polystictus galenus</i>	(Fruhstorfer, 1907) Nova Friburgo Minas Gerais, São Paulo, Espirito Santo, Petropolis Rio de Janeiro Brésil
<i>Battus (Battuosa) polystictus polystictus</i> (Butler, 1874)	<i>polystictus</i> = <i>Papilio polystictus</i> = <i>Papilio polystictus polystictus</i> = <i>Battuosa polystictus polystictus</i>	(Butler, 1874) Pnc: <i>Aristobchia brasiliensis</i> , <i>A. fimbriata</i> , <i>A. triangularis</i> Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Sud du Brésil, Paraguay, Uruguay, Misiones, Corrientes, Buenos Aires Argentine

